















# DISSERTATIONES ACADEMICAЕ

VPSALIAE HABITAE

S V B

PRAESIDIO


CAROL. PETR. THVNBERG

EQVITE AVRAT. REG. ORD. DE WASA

MED. DOCT. PROFESS. MED. ET BOTAN. REG. ET ORD.  
ACAD. CAESAR. NAT. CVRIOS. REG. SCIENT. LONDIN.  
HOLM. SOC. SCIENT. VPSAL. PHILAD. PATR. HOLM.  
BEROL. NAT. SCRVT. PARIS. HAFNIENS. ET HALENS.  
HIS. NAT. LVNDENS. HARLEM. AMSTELOD. ZELAND.  
NIDROS. TICINENS. IENENS. LINN. LONDIN. PHYSIC.  
GOETTING. MEDIC. PARIS. ET MATRIFENS. MEDIC.  
ET NAT. STVD. EDIMB. MEMBRO OECON. FINLAND.  
NEC NON ACAD. SCIENT. PARIS. MONSPEL. AGRICVLT.  
PARIS. MED. LONDIN. SCANDINAV. ILORENTIN.  
ET BATAV. IND. OR. CORRESP.

VOLVMEN TERTIVM.


CVM TAB. XII. ARNEIS.



GOTTINGAE

APVD HENRICVM DIETERICH.

1801.



---

# DISSERTATIONES ZOOLOGICAE

IN

TERTIO VOLVMINE

CONTENTAE.

1.	De Muraena et Ophichto.	—	Pag.	1
2.	De Insectis Suecicis.	P. 1.	—	13
3.	— — —	P. 2.	—	37
4.	— — —	P. 3.	—	60
5.	— — —	P. 4.	—	66
6.	— — —	P. 5.	—	76
7.	— — —	P. 6.	—	86
8.	— — —	P. 7.	—	95
9.	— — —	P. 8.	—	109
10.	— — —	P. 9.	—	115

)( 2

11.

11.	Novae Insectorum Species.	P. 1.	Pag. 124
12.	— — —	P. 2.	— 150
13.	— — —	P. 3.	— 173
14.	— — —	P. 4.	— 189
15.	— — —	P. 5.	— 205
16.	— — —	P. 6.	— 226
17.	Characteres Generum Insectorum.	—	249
18.	De Falcone canoro.	—	— 264

---

---

# EXPLICATIO FIGVRARVM.

---

## T A B. I. et II.

(Ad Dissertationem primam pertinet.)

Muraena *annulata*.

Muraena *fasciata*.

Muraena *nebulosa*.

Muraena *picta*.

## T A B. III.

(Ad Insecta Suecica. P. 1.)

*Animadv.* Fig. 23, 24 et 25 in Tab. sequente  
sunt repraesentatae.

Fig. 1. Noctua *triangularis*. —

— 2. Noctua *evidens*. —

— 3. Noctua *pyramidata*.

- Fig. 4.      *Geometra pulverata.*  
— 5.      *Geometra maculata.*  
— 6.      *Geometra pictoria.*  
— 7.      *Geometra vespertaria.*  
— 8.      *Geometra oblongata.*  
— 9.      *Geometra violata.*  
— 10.      *Geometra furrata.*  
— 11.      *Geometra obliquata.*  
— 12.      *Geometra cuspidata.*  
— 13.      *Pyralis atralis.*  
— 14.      *Pyralis sulphuralis.*  
— 15.      *Pyralis nemoralis.*  
— 16. et 17.      *Pyralis ocellaris.*  
— 18.      *Tortrix Gyllenhaliana.*  
— 19.      *Tortrix Westriniana.*  
— 20.      *Tortrix litterana.*  
— 21.      *Tortrix Osbeckiana.*  
— 22.      *Tortrix coronana.*  
— 23. }  
— 24. }      *Tortrix Bierkandrella.*  
— 25.      *Tortrix punctana.*



## T A B. I V.

(Ad Insecta Succica. P. 7.)

- Fig. 1. *Tinea aridella.*  
— 2. *Tinea abruptella.*  
— 3. *Tinea hamella.*  
— 4. *Tinea forficella.*  
— 5. *Tinea nemorella.*  
— 6. *Tinea 6-guttella.*  
— 7. *Tinea auripunctella.*  
— 8. *Tinea Gyllenhalella.*  
— 9. *Tinea viduella.*  
— 10. *Tinea virgella.*  
— 11. *Tinea atomella.*  
— 12. *Tinea fungella.*  
— 13. *Tinea laterella.*  
— 14. *Tinea oculella.*

## T A B. V.

(Ad Insecta Suecica. P. 2.)

- Fig. 1. Tortrix *pensiana*.  
— 2. Tortrix *groendaliana*.  
— 3. Tortrix *fimbriana*.  
— 4. Tortrix *hirundana*.  
— 5. Tortrix *rhenana*.  
— 6. Papilio *lappona*.  
— 7. Bombyx *lapponica*.  
— 8. 8. Papilio *Embla*.  
— 9. Tortrix *halliana*.  
— 10. Noctua *lapponica*.  
— 11. 11. Papilio *Norna*.  
— 12. Noctua *melaleuca*.  
— 13. Noctua *leucoptera*.  
— 14. Papilio *Frey*a.

## T A B. V I.

(Ad Infecta Suecica. P. 4.)

- Fig 1.      *Bombyx signata.*  
— 2.      *Bombyx fusca.*  
— 3.      *Noctua templi.*  
— 4.      *Phalaena fuscaria.*  
— 5.      *Phalaena sordaria.*  
— 6.      *Phalaena circularia.*  
— 7.      *Phalaena zonata.*  
— 8.      *Phalaena abruptaria.*  
— 9.      *Phalaena angularia.*  
— 10.      *Phalaena arundinata.*  
— 11.      *Phalaena corylata.*  
— 12.      *Phalaena flavofasciata.*  
— 13.      *Phalaena pupillata.*

## TAB. VII.

(Ad nova Infecta. P. I.)

- Fig. 1.      *Anobium bifasciatum.*  
 — 2.      *Anobium capense.*  
 — 3.      *Anobium ruficolle.*  
 — 4.      *Dermestes marginatus.*  
 — 5.      *Dermestes maculatus.*  
 — 6.      *Dermestes bipustulatus.*  
 — 7.      *Dermestes interruptus.*  
 — 8.      *Dermestes bifasciatus.*  
 — 9.      *Lucanus capensis.*  
 — 10.      *Coccinella Psi.*  
 — 11.      *Coccinella 8-maculata.*  
 — 12.      *Coccinella gibba.*  
 — 13.      *Coccinella japonica.*  
 — 14.      *Coccinella fimbriata.*  
 — 15.      *Coccinella trinotata.*  
 — 16.      *Coccinella grandis.*  
 — 17.      *Coccinella indica.*  
 — 18.      *Coccinella oculata.*  
 — 19.      *Coccinella similis.*  
 — 20.      *Coccinella borealis.*  
 — 21.      *Coccinella capensis.*

Fig. 22.

- Fig. 22. *Coccinella pusilla.*  
 — 23. *Coccinella distincta.*  
 — 24. *Coccinella flexuosa.*  
 — 25. *Coccinella repanda.*  
 — 26. *Coccinella flavicollis.*  
 — 27. *Coccinella undulata.*  
 — 28. *Coccinella lunata.*  
 — 29. *Coccinella Crux.*  
 — 30. *Coccinella Commā.*  
 — 31. *Coccinella lineata.*  
 — 32. *Coccinella laevis.*  
 — 33. *Coccinella rivosā.*  
 — 34. *Coccinella dentata.*  
 — 35. *Coccinella hirta.*  
 — 36. *Coccinella 20-pustulata.*  
 — 37. *Coccinella 8-guttata.*  
 — 38. *Cicendela grandis.*  
 — 39. *Cicendela japonica.*  
 — 40. *Cicendela tridentata.*  
 — 41. *Cicendela Catena.*  
 — 42. } *Varietates.*  
 — 43. }  
 — 44. *Hemerobius grandis.*

## T A B. VIII.

(Ad nova Insecta. P. 2.)

- Fig. 1. *Cimex diopthalmus.*  
— 2. *Cimex grandis.*  
— 3. *Cimex guttigerus.*  
— 4. *Cimex spinifex.*  
— 5. *Cimex clavatus.*  
— 6. *Cimex jaculus.*  
— 7. *Cimex muricatus.*  
— 8. *Cimex unipunctus.*  
— 9. *Cimex transversus.*  
— 10. *Cimex humeralis.*  
— 11. *Cimex subulatus.*  
— 12. *Cimex Comma.*  
— 13. *Cimex Fullo.*  
— 14. *Cimex tibialis.*  
— 15. *Cimex chinensis.*  
— 16. *Cimex Anchora.*  
— 17. *Cimex fimbriatus.*  
— 18. *Cimex variegatus.*  
— 19. *Cimex costatus.*

TAB.

## TAB. IX.

(Ad nova Infecta. P. 13.)

- Fig. 1. *Cimex hasticornis.*  
— 2. *Cimex culicis*  $\beta$ . *crocatus.*  
— 3. *Cimex superstitiosus.*  
— 4. *Cimex purpureus.*  
— 5. *Cimex Angur*,  $\gamma$ .  
— 6. *Cimex Angur*,  $\delta$ .  
— 7. *Cimex caffer.*  
— 8. *Cimex angustatus.*  
— 9. *Cimex ocellatus.*  
— 10. *Mantis lobata.*  
— 11. *Elater festivus.*  
— 12. *Elater 6-guttatus.*  
— 13. *Hispa capensis.*  
— 14. *Mordella nasuta.*  
— 15. *Panorpa capensis.*  
— 16. *Panorpa japonica.*  
— 17. *Attelabus gemmatus.*  
— 18. *Attelabus indicus.*



## T A B.   X.

(Ad nova Insecta. P. 4.)

- Fig. 1.      *Carabus thoracicus.*  
— 2.      *Carabus fimbriatus.*  
— 3.      *Carabus 6-guttatus.*  
— 4.      *Carabus trilineatus.*  
— 5.      *Carabus lunatus.*  
— 6.      *Carabus prasinus.*  
— 7.      *Carabus bilineatus.*  
— 8.      *Carabus fasciatus.*  
— 9.      *Myrmeleon luteum.*  
— 10.      *Myrmeleon capense.*



## T A B. X I.

(Ad nova Insecta. P. 5.)

- Fig. 1. *Cassida purpurea.*  
— 2. *Cassida reticulata.*  
— 3. *Cassida furcata.*  
— 4. *Cassida 20-maculata.*  
— 5. *Cassida 4-maculata.*  
— 6. *Cassida bimaculata.*  
— 7. *Cassida lunata.*  
— 8. *Buprestis vittata.*  
— 9. *Buprestis elegans.*  
— 10. *Buprestis oculata.*  
— 11. *Buprestis ruficollis.*  
— 12. *Buprestis marginata.*  
— 13. *Buprestis cornata.*  
— 14. *Buprestis suturalis.*  
— 15. *Buprestis cassira.*  
— 16. *Buprestis 6-guttata.*  
— 17. *Buprestis 10-guttata.*  
— 18. *Buprestis bifasciata.*  
— 19. *Buprestis trifasciata.*  
— 20. *Gryllus capensis.*  
— 21. *Gryllus spumosus.*

## T A B. XII.

(Ad nova Insecta. P. 6.)

Fig. 1.	<i>Meloe tripunctatus</i> $\beta$ .
— 2.	<i>Meloe impar</i> .
— 3.	<i>Meloe bicolor</i> .
— 4.	<i>Meloe bimaculatus</i> .
— 5.	<i>Meloe 14-punctatus</i> .
— 6.	<i>Meloe 10-punctatus</i> .
— 7.	<i>Meloe 4-punctatus</i> .
— 8.	<i>Meloe 3-punctatus</i> $\gamma$ .
— 9.	<i>Meloe coecus</i> .
— 10.	<i>Meloe coecus</i> $\alpha$ .
— 11.	<i>Meloe cichorei</i> .
— 12.	<i>Meloe trifasciatus</i> .
— 13.	<i>Meloe capensis</i> .
— 14.	<i>Meloe lunatus</i> .
— 15.	<i>Meloe oculatus</i> .
— 16.	<i>Meloe pustulatus</i> .
— 17.	<i>Meloe 16-guttatus</i> .
— 18.	<i>Meloe 10-guttatus</i> .
— 19.	<i>Meloe 4-fasciatus</i> .
— 20.	<i>Meloe undatus</i> .

---

Error typographicus.

In Vol. II. p. 105. loco *J. pulmaria* leg. *plumaria*.

---

DISSERTATIO  
DE  
M U R A E N A  
ET  
OPHICHTHO.

D. 27. JUN. 1789.

RESP.  
JONAS NICOL. AHL.

PROOEMIUM.

**I**ntentiori rerum universarum faciem oculo in-  
tuentes, expressa ubique summae Sapientiae  
vestigia detegimus. Mirandis varia spectaculis  
ditissima natura, rerum imprimis animatarum  
multitudine, ordine et venustate, pectora stu-  
poris sensu perfundit. Nullo non tempore  
naturam penitus noscere ejusque adyta pene-  
trare tentatum est, dissimili tamen successu.  
Dissidia enim inter eos orta, qui in ordinem  
naturae divitias systematicum redigere tentarunt,  
effecerunt, ut, quae facilitate in suas delicias  
homines alliceret amoenissima scientia, tricis  
potius implicata, ingenia molestiarum impatien-  
tia retundere visa sit.

*Vol. III.*

A

Recen-

Recentiorum vero observationibus debet scientia, quod istis expedita impedimentis, in summum, quo jam gloriatur, fastigium evehi potuerit, licet in quibusdam illius partibus, permulta amplius restent enodanda, et post hac restitura sint, quamdiu inexhausti naturae fontes, curiosis mortalium animis novas perscrutandi occasiones praebébunt.

Mirum sane non videbitur, si a perfectione longius distare reperiatur vastissimi incolarum Oceani cognitio, quorum maxima pars, in altumquam penetrando recessu, sine dubio ad sera usque tempora, hominum curas et oculos fallat.

Perquisitius explorato piscium interno habitu et progenerandi ratione, lucem Ichthyologia primum respicere cepit; hinc, licet difficilius genera piscium distinguamus, quo pauciores iis facultates et notae, respectu aliorum animalium, concessae, quoque propius sibi invicem accedere et confundi videantur, eos tamen, qui hucusque nobis obvenērunt, dilucide satis dignoscere valuimus, fundamenta, in ordinibus et plerisque generibus disponendis, e pinnarum situ et natura petentes.

Genus illud, quod in System. Nat. LINN. nomine *Muraenae* insignitur, habitu, oeconomia et propagandi modo medium quasi tenet inter Amphibia et pisces. propius tamen ad hos, ob branchiarum structuram, accedit.

Exercitationis gratia hoc specimen editurus, in examinandis speciebus, sub hoc genere comprehensis, quarundam a ceteris tantum reperi discrimen, ut in duo illas distinguere genera necessarium fuerit; gaudent scilicet pinnis pectoralibus aliae, aliae nullis.

Anti-

Antiquorum Muraena pinnas non habet pectorales; ad illam igitur, novas quasdam, ab illustr. Dom. PRAESIDE, in India Orientali, detectas species retuli, ceteris autem nomen *Ophichthus* imposui, tuoque favore L. B. fretus, juvenilem hunc laborem mihi tuae censurae submittere volui.

## I. MURAENA.

### CHARACTER GENERICUS:

*Animal apodum, pinnis ventralibus pectoralibusque nullis.*

*Membrana branchiostega decemradiata, connata.*

*Aperturae branchiarum remotae, laterales, solitariae.*

## 2. OPHICHTHUS.

### CHARACTER GENERICUS:

*Animal apodum, pinnis ventralibus nullis.*

*Membrana branchiostega decemradiata, connata.*

*Aperturae branchiarum remotae, laterales, solitariae, ante pinnas pectorales.*

### NOTAE COMMUNES horum duorum Generum:

*Omnes instruuntur dentibus numerosis, acutis.*

*Omnes itaque delectantur cadaveribus, quadrupedum, piscium, insectorum et aliorum animalium carne; rarius vegetabilibus.*

*Omnes pinnas habent dorsalem et analem, hasque nonnullae coadunatas cum cauda pinnata.*

*Omnibus corpus teretiusculum vel parum compressum, imprimis versus caudam.*



## NOTAE SPECIALIORES:

*Aliis* cauda apterygia, *aliis* pinnata.

*Aliis* tentacula vel cirri, plures vel pauciores.

*Aliis* pinnae radiatae, *aliis* submembranaceae.

## DIFFERENTIAE A COGNATIS:

*Differunt a Caecilia*: ore maxilloso, operculis, aperturis. pinnis.

*a Sirene*: Aperturis vel spiraculis nudis, absque artubus.

*Muraena Coeca*: LINN. Aperturis lateralibus.

*Gymnoto*: dorso pinnato.

*Trichiuro*:

*Carapone*: } Operculis connatis, cauda non

*Ammodyte*: } acuminata, ceteris.

*Reliquis*: }

Obs. I. *Muraena Coeca*, LINN. Syst. Nat. p. 426.

*a nullo praeterea commemorata, piscis adhuc obscurus est, nec bene ad Muraenae genus vel Ophichthi, ob aperturas branchiarum, sub collo collocatas, referri potest.*

2. *Conger indicus maculosus*, Willugb. tab. G. f. 1. adhuc ignota species, *Muraenae* tamen generis, ut videtur, est.

## MURAENA.

I. *M. HELENA*: cinereo-fusca, maculis inaequalibus punctatis.

Synonyma: *M. Helena* Linn. S. N. p. 425.

*Bloch. de Piscib. P. 2. p. 31. Tab. 153.*

*Houtuyn Natuurl. Hist. I. Del. 7. St. p. 83. tab. 57. f. 1. 2. a)*

*Murae.*

a) Vesicam natatoriam huic adscribit Houtuyn.

*Muraena maculata nigra, et viridis; Catesby. Natur. Hist. p. 20. 21. Tab. 20. 21. huc pertinere videntur.*

Italica: *Mourene* sive *Morena* et *Fluta*; Germanica: *Mur-Aal*, s. *Muur-Aal*. Hollandica: *Moer-Aal*.

*Habitat* in Mari Mediterraneo, vulgaris. In India Orient. et in Bahama Americis.

A multis Hellados et Latii Auctoribus ut piscis delicatissimus commemoratur. Servos, morti dicatos, in piscinas ejiciebant, cujus funestum habemus exemplum in servo quodam Pollionis, qui, levissimum ob crimen, in pabulum abire Muraenarum damnatus est *b*). Ad littora petrosa capitur; allicitur cancris pressis, vel sanguine in aquam ejecto; piscibus vel carne hamo impositis, postea capitur; aqua autem dum extrahitur piscis, prudenter praecauendum est, ne cauda lapides circumvolvatur, quo casu prius dilaceratur, quam loco evellitur. Captus, mutilatione vel pressione caudae necatur.

Obs. *Specimini, a D. Praefide ex India orientali allato, cirri sunt breves et pinnae absque radiis manifestis.*

2. *M. NEBULOSA: cinerea, maculis ocellaribus radiantibus nigris.*

*Habitat* in Orientali India.

*Corpus* teres, parum compressum, sesquispithameum, digiti crassitie, postice attenuatum et magis compressum, albidum vel flavescenti-cinereum, undique nigromaculatum: maculis ocellaribus, transversis, radiantibus, lineolis flexuosis et subreticulatis.

A 3

Caput

*b*) Plin. XI. Cap. 23.

*Caput conico-attenuatum.*

*Maxillae aequales: superioris nares lineares, tentaculis duobus ante nares, brevibus.*

*Aperturae branchiarum laterales, oblongae, pollicem a capite remotae.*

*Pinnae pectorales nullae. Dorsalis ante medium incipiens, cum Anali conjungitur. Caudalis caudam ambiens, cum dorsali et anali conjuncta.*

*Anus in medio corpore.*

*Cauda valde compressa, obtusa.*

3. *M. PICTA: cinerea, maculis, ocellis, lunulis punctisque ferrugineis.*

*Habitat in Indiae Orientalis aquis.*

*Corpus teres, prope caudam compressum, digiti crassitie, vix pedale, cinereo-albidum, undique pictum ocellis, lunulis, maculis punctisque fusco-ferrugineis, ex lineolis duplicatis conflatis.*

*Caput antice angustatum.*

*Maxillae subaequales, superiore bidentaculata.*

*Aperturae branchiarum laterales, lineares, pollicem a capite remotae.*

*Pinnae pectorales nullae. Dorsalis pone caput incipiens caudam ambit et cum anali conjungitur. Caudalis itaque cum dorsali et anali connexa, caudam ambit.*

*Anus in medio corpore.*

*Cauda valde compressa, obtusa, ultimo apice acutiusculo.*

4. *M. ANNULATA: caerulea annulis fuscis.*

*Habitat in Indiae Orientalis aquis.*

*Corpus, statura Petromyzonis fluviatilis, tere-  
tiusculum, parum compressum, bispithamaeum  
vel paulo ultra, crassitie digiti minimi, cae-  
rule-*



rufescens, annulis 31 fuscis, 4 circiter lineas latis; fascia prima caput inter nares et oculos occupat, et ceterae ad caudam, cujus apex reliquo corpori concolor, continuantur.

*Maxillae* subaequales, dentatae. Palatum dentatum. Lobus utrinque in maxilla superiori infra nares.

*Nares* vix tubulosae.

*Aperturae branchiarum*: foramina pone fasciam tertiam, pollicari a capite distantia.

*Pinnae* pectorales nullae. *Dorsalis*, colore corporis et similiter annulis corporis interrupta, incipit a collo et ad caudam sensim attenuando progreditur, sic ut juxta annulum a cauda secundum evanescat. *Anal*is simillima dorsali, regionem inter anum et caudam occupat, eo tamen discrimine, ut ad fasciam a cauda quintam non perspicitur. *Caudalis* nulla; sed apex *caudae* compressus, attenuatus.

*Anus* pone annulum a capite 15mum.

*Linea lateralis* in medio corpore excavata ad annulum a capite 10mum demum conspicua, ad caudae apicem extenditur.

5. M. FASCIATA: *caerulescens fasciis maculisque fuscis.*

*Habitat* in Indiae Orientalis aquis.

*Corpus* teres, parum compressum, bipedale, digiti crassitie, caerulescens, fasciatum fasciis circiter triginta fuscis, semiunguicularibus, pollicari spatio remotis, saepe annularibus et cum oppositis lateris oppositi coalitis. Has inter fascias maculae rotundatae fuscae, vel solitariae vel per paria sparsae.

*Caput* compressum, acutum, gula parum dilatata.

*Maxilla* superior longior, bidentaculata.

*Aperturae branchiarum* ad latera, pollicari spatio a capite remotae ante fasciam tertiam.

*Pinnae pectorales* nullae. *Dorsalis* incipiens in ipso capite ante apicem caudae definit, uti etiam *Analisis*. *Caudalis* nulla, sed apex caudae parum compressus, apterygius.

*Anus* in medio corpore.

*Linea lateralis* recta, postice magis perspicua.

## OPHICHTHUS.

1. *O. OPHIS*: *cauda apterygia*; corpore tereti, maculato.

*Habitat* in Europaeo mari et Indico.

*Synonyma*: *Muraena Ophis*: Linn. Syst. Nat. p. 425.

*Serpens marinus maculosus*: Willoughb. Append. p. 19. Tab. G. 9.

Houtuyn Natuurl. Hist. I. D. 7. St. p. 87.

Bloch. P. 2. p. 35. tab. 154. *pulcherrimam ejus exhibet figuram*. Hollandis: *Zee-serpent*.

2. *O. SERPENS c)*: *cauda apterygia*; corpore tereti.

*Habitat* in Mari Europaeo Australiori.

*Synonyma*: *Veteribus Serpens maximus*.

Hollandis *Zee-slang*.

*Muraena serpens* Linn. S. N. p. 425.

*Corpus* teres, attenuatum, cauda tereti, apterygia.

Obs. *Miserum* adeo exemplar in Mus. Upsal., ante siccatum, iam in Spiritu vini servatur, ut nulli characteres exinde certi erui possint. *Arctedi*, pinnas pectorales, rad. 16. huic adscribit.

*Cauda*

\*) Exemplar 5 pedes longum Romae se vidisse asserit Willoughby. *M. Ophi* maxime affinis.

*Cauda vix compressa, valde attenuata est. corpus teres compressiusculum. Maxilla inferior longior.*

3. O. CINEREUS: *cauda apterygia; corpore compresso, cinereo, immaculato.*

*Habitat in India Orientali.*

*Corpus teretiusculum vel parum compressum, versus caudam vix attenuatum, digiti minoris crassitie, quadripedale, cinereum, immaculatum.*

*Caput parum antice attenuatum.*

*Maxilla inferior longior.*

*Aperturæ branchiarum statim pone branchias connatas, pollicari fere spatio tamen a capite remotæ, transversæ, lunatæ.*

*Pinnæ pectorales pone aperturas branchiarum, rotundatæ, minutæ. Dorsalis incipiens supra pinnas pectorales, definit ante caudæ apicem, quem non ambit. Analis incipit spithamaeo a capite spatio, continuans ad caudam, intra quam finitur.*

*Cauda apterygia, rotundata, obtusiuscula.*

4. O. MYRUS: *cauda pinnata; corpore compresso, cinereo, immaculato, pinna dorsali margine nigra.*

*Habitat in Mari Mediterraneo.*

*Synonyma: Muraena Myrus: LINN. Syst. Nat. p. 426.*

*Vaar-Aal: Houtuyn Nat. Hist. I. D. 7. St. p. 101.*

*Obs. caro tenera et delicata est huius piscis.*

5. O. CONGER: *cauda pinnata; corpore compressiusculo, linea laterali albo-punctata, pinna dorsali margine nigra.*

*Habitat in Oceano Europæo, Anglico, Orientali.*

Synonyma: *Muraena Conger*: LINN. S. N. p. 426.

*Konger*: Houtuyn Natuurl. Hist. I. D. 7. St. p. 103. *figuram* tradit Bloch. P. 2. p. 37. tab. 155.

Graecis: *Conger*, *Congros*, *Gongros*. Romanis: *Bronco*. Anglis: *Congel Eel*. Gallis: *Congre*.

Obs. Caro veteribus in cibo laudatur; etiam nostratibus, praesertim frixa. Albissima est, dulcis, concoctu difficilis. Ad 4 vel 5 ulnarum magnitudinem accrescit haec species.

6. O. ANGUILLA: cauda pinnata; corpore compressiusculo, unicolore.

Habitat in Europae aquis, etiam lutosi.

Synonyma: *Muraena Anguilla*: LINN. Syst. Nat. p. 426.

Houtuyn Nat. Hist. I. D. 7. St. p. 91.

Apud Arted. in Descript. Spec. p. 66. exactissima ejus reperitur descriptio.

Varia ejus nomina sunt: *Pakling*, *Anguilla*, *Ål*, *Aal*, *Eel*, *Ahl*, *Angville*.

Omniū vulgarissima est haec species; e Frieslandia enim 100.000 librae, ad Angliam, per annos exportantur. Apud nos usus eius Oeconomicus haud est exiguus, tum respectu carnis, tum cutis tenacissimae, et ad saccos farinae et ligaturas instrumentorum trituratoriorum conficiendas, aptissimae.

Vitus ejus animalis est d): imprimis cadaveribus, putredine correptis, delectatur; vegetabilia tamen interdum in escam adhibet. Accidit enim, ut, terra rore madida, ex aqua tempore

d) Salmonem Eperlanum et Cyprinum Aphyam aliis delicatiores ei esse observavi.



pore nocturno exeat, agrosque, piscis obfitos, visitet e).

Multorum et terrestrium et aquatilium animalium *migratio* cognita est: a defectu alimenterum, vel ab alia an proveniat causa, dictu adhuc est difficile. Ejusmodi morem Anguillas sequi observatum est; tempore enim autumnali eoque nimbofo, ad ostia fluviorum gregatim se congerunt, et per amnes in alios emigrant lacus, fuga, piscatorum retibus, ad angustiora fluviorum loca, interpositis, saepius eis interdicta.

Anguillam, *vivos progignere fortus*, recentiores asserunt observationes f). Multas licet dissecuerim nec ova nec foetus inveni. Sub canicula sine dubio parit; hocce enim tempore rarissime capitur; sed in caveis, ad littora maris aqua non profunda conspicuis, sese occultat, capite tamen e fovea extenso. Vita difficile orbatur g), piscem, circa renes pone anum collocatos, nisi contuderis; cute enim detracta visceribusque ablatis, se non solum movet, verum etiam caput truncatum, quidquid maxillis exponitur, vi mirifica comprimit.

Copio-

e) Simul cum patre meo, ad lacus cujusdam litus, jucundissimum vidi spectaculum: ripam scilicet appellentibus, stupenda nobis occurrebat anguillarum multitudo, celerrima ad aquam properans fuga. — Anguillas *leguminibus pisi* repletas dissecui, aliaque vice, *Anguem fragilem* nuper devoratum, in ventriculo reperi, ut aliorum hac in re omittam observationes, quae omnes comprobant, longiori temporis spatio extra aquam eas cominorari posse.

f) Fahlberg in Aët. Holm. 1750. p. 200.

g) *Tenacissimae* omnino vitae est: ab hominibus, equis et avibus vivam deglutitam esse, et, maxima licet gaudere triturandi et solvendi vi ventriculum eorum cognitum sit, eam tamen ex illis vivam exiisse, exempla docent.

Copiosissima ejus *captura* Septembri et Octobri mensibus per varias instituitur methodos: in *retia*, circum arcus, in formam conicam, posita, (*Suet. Ryssfor*) irrepit, exitumque non inveniens, capitur: tempore nocturno et tenebricoso, ope *ignis* et *fuscinac*, eam piscandi mos est; vel caelo sereno horisque antemeridianis, in aquis non altis, *iisdem* transligitur *instrumentis*: Anguillae, in profundiori aqua, captandae causa, amplior, asseribus paratur *vista*, cujus latera plura admittunt foramina, introitui hujus piscis adaptanda; his aperturis intus obtenduntur pelles ovinae. Injiciuntur in eandem cancri, carnes, pisces, aliave: horum odore prolectata, facile haec foramina permeat, egressum vero, propter coria obvelata, imperivium deprehendit. Alius quoque est talium *cistarum* construendi modus: contignantur inaequali magnitudine in amnibus: solo, per gradus, perticis arcte constructo, parietibusque interdum rarioribus, ut aqua, per crepidinem sensim angustatam, huic immissa, effluere possit: *lumbricis piscibusque minoribus*, *hamulo impositis*, tempestate praesertim pluviosa, qua maxime vorax est, allicitur *h)*, ut alia illam piscandi inventa reticeam.

Anguilla, tali modo capta, tum *recens* ob pinguedinem delicatissima est, tum *sale condita*, vel ramulorum juniperi et ligni quercini *fumo indurata*, maxima ejus copia consumitur.

*h)* Hunc in finem, funis, saepe plures centenas ulnas longus, adhibetur. Hami, funiculis ulnam circiter longis, annexi, funique longiori alligati, aliquot ulnarum intervallis sejunguntur. Totus denique apparatus, lapidibus deprimendus, fundo aquae, una serie, immergitur.

---

DISSERTATIO  
DE  
INSECTIS SUECICIS.

PARS I.

D. II. DEC. 1784.

RESP.

JOHANNES BORGSTROEM.

---

PROOEMIUM.

**I**nter alia scientiarum et in primis Historiae Naturalis Patriae incrementa, quibus hoc quod vivimus saeculum superbit, scientiae quoque Zoologicae studium jure referendum videtur, quod felici opera celebrium virorum, Artedii, Linnaei, De Geerii, Clerkii, aliorumque civium, optime meritorum, id attigit fastigii, ut paucae admodum sint Regiones, in quibus animalia indigena aut sollicite magis detecta aut accuratius descripta inveniamus, quam in nostra Patria. Omnibus tamen numeris absolutum animalium Svecicorum Catalogum expectare non licet, cum quotannis indefessis Naturae scrutatoribus novae sese offerant species, vel extra Patriam dudum cognitae, vel antea omnino ignotae. In primis inter exsanguia illa  
et

et visum nostrum facile fugientia Insecta, recentioribus annis vidimus ab australibus regionibus varia allata huc individua jure hodie civitatis donata; et alia, forsan nostro climati soli propria, sed a nullo antea auctore examinata, recentior detexit aetas et investigandi studium. Fauna Svecica, liber inter plurimos immortalis Linnaei vere aureus, prima vice numeris suis absoluta prelum reliquisse videbatur; sed iterum mille animalibus aucta prodiit; jamque, viginti tribus annis elapsis vel mille aliis speciebus adaugeri posset.

Amplum itaque in hac palaestra mihi foret spatium, teneras exercendi vires; verum cum fructus tanti laboris vix paucis sperandus sit annis, haud ingratum saltem Curioso in carissima Patria Entomologo fore duxi, si quasdam Insectorum species, in Svecia nuper lectas, descriptas sisterem atque delineatas; eo majorem apud hujus nobilissimi studii aemulos initurum gratiam confidens, quod pulchriori ex ordine Elegantissimorum Lepidopterorum et Phalaenarum numerosissima gente, speciminum selectum fecerim.

\* \* \*

*Bombyx dispar: alis deflexis, masculis griseo fuscoque nebulosis; femineis albidis; lituris nigris.*

Habitat in Uplandia.

*Caput album antennis nigris, parum pectinatis.*

*Thorax albus fascia antica et puncto medio nigro.*

*Alae anticae supra albae fasciis quinque nigris, undulato-dentatae cum puncto inter secundam et tertiam et plurimis terminalibus nigris.*

*Subtus*



Subtus fasciis obsoletioribus. *Posticae* supra albae, subtus fusco-fasciatae.

*Abdomen* fusco-albidum, versus anum purpureum.

*Pedes* barbati, nigri annulis albis.

*Bombyx* grisea: *alis incumbentibus cinereo-ferrugineis: fasciis duabus fuscis.*

Habitat in Uplandia.

Magnitudine *P. pinguinalis*, tota subnuda, cinereo-ferruginea.

*Antennae* duplici ordine pectinatae, fuscescentes.

*Thorax* antice et lateribus sanguineo-fasciatus.

*Alae* incumbentes, tenuissime squamosae, subnudae, diaphanae, cinereo-ferrugineae: fasciis duabus nigris, undulatis, una ante et altera pone medium; alia fascia obsoletissima in medio, vix ad interiorem marginem extensa. Subtus omnes alae pallidiores puncto nigro in medio.

*Abdomen* et *femora* cinerea, *pedibus* fusco-annulatis.

*Femora* antice sanguinea.

*Noctua* pyramidea: *cristata alis deflexis fuscis: strigis tribus undatis pallidis, posticis ferrugineis.*

Habitat in Uplandia, et in Svecia Australi.

*Noctua* pyramidea. Fabric. Sp. Inf. T. 2. p. 232.

Magnitudine *N. sponsae*.

*Caput* fuscum palpis recurvis.

*Antennae* setaceae, fuscae.

*Thorax* subcristatus, fuscus, immaculatus.

*Alae* deflexae; *anticae* supra cinereo-fuscae fasciis tribus vel quatuor pallidis, flavescentibus vel albidis, undulatis, una in basi minima cum puncto albo incluso, alia ante medium postice nigro-marginata, tum ocellum album pupilla nigra, pone medium tertia fascia

fascia antice nigro-marginata intra marginem, et in ipso margine dentato fascia quarta et quinta, obsoleta. Subtus cinereae fascia fusca. *Posticae* supra brunneae, extus magis fuscae; subtus cinereae fascia et puncto nigro. *Abdomen* cinereum subtus fasciis nigris.

Noctua evidens: *larvis alis incumbentibus griseis: strigis quatuor fuscis.*

Noctua quercus Fabric. Sp. Inf. T. 2. p. 214. an? Habitat in Hallandia P. Osbeck.

Magnitudine N. *trapetzmæ*, tota grisea seu flavescens punctis minutissimis, vix conspicuis nigris adspersa, oculis nigris.

*Alae anticae* incumbentes, supra fasciis quatuor, tenuibus, nigris, prima in ipsa basi vix observanda, secunda ante medium obliqua, tertia in medio recta, quarta pone medium extus curvata. Puncta nulla ordinaria. Subtus fascia unica et punctum nigrum; uti et in posticis.

Noctua triangularis: *cristata alis deflexis fuscis: triangulo fasciaque dentata flavo-marginatis.*

Habitat in Hallandia P. Osbeck, in Uplandia Westrin.

Magnitudo, statura et facies N. *typicae*.

*Thorax* cristatus, cinereo-fuscus, antice nigro-trifasciatus.

*Alae* deflexae, fuscae: *anticae* supra pallido nigroque undulatae et reticulatae. In medio alae versus marginem exteriorem macula magna triangularis, vix ad inferiorem marginem extensa, flavo-marginata. Pone hanc fascia dentata. postice flavo marginata. Ipse margo albo-nigroque dentatus. Intra marginem ordo punctorum, circiter septem, nigrorum, lunarium, antice flavo-marginatorum.

Stig-

Stigmata ordinaria nulla distincta. Subtus ferrugineo-fuscae, immaculatae uti et inferiores supra. Subtus inferiores ferrugineae arcu punctoque fusco.

*Pedes albo-maculati.*

Noctua typhae: *cristata alis incumbentibus canis fusco-striatis, margine postico nigro-punctato.*

Habitat in Typhae angustifoliae culmis; lecta in Westrogothiae horto Praedii Comitiss. Ekeblad, Mariaedahl dicti.

*Larva* grisea, nuda absque pilis, 12 lineas longa, in pupam abiens intra culmos typhae mense Julio, et in imaginem completam mense Augusto. Cl. Bierkander.

Magnitudine *P. pinguinalis*, tota cinerea seu cana, glabra.

*Antennae setaceae.*

*Thorax* immaculatus, hirsutus, cristatus.

*Alae* incumbentes, rotundatae. *Anticae* fusco-striatae striis obsoletis subramosis; intra marginem posticum ordo punctorum octo nigrorum. Subtus concolores punctis marginalibus vix conspicuis. *Posticae* supra immaculatae, subtus puncto in medio nigro.

*Geometra thymiaria: pectinicornis alis viridibus: striga obsoleta fusca albaque.*

*P. Thymiaria* Fabric. Sp. Inf. T.2. p.241.

Habitat in Hallandia, P. Osbeck.

Duplo minor *G. papilionaria* et viridior.

*Antennae pectinatae, cinereae.*

*Alae anticae* rotundatae, saturate virides: in medio lunula et pone medium fascia fusca obsoleta; intra marginem posticum fascia alba, undata, obsoleta. *Posticae* supra albae. Omnes subtus cinereae fascia fusca.

*Geometra corylaria: pectinicornis alis fuscis: fascia maculari media margineque postico flavo-maculato.*

Habitat in Hallandiae corylo P. Osbeck.

Magnitudine fere *G. papilionariae*, tota fusca.

*Antennae* pectinatae, thoracis longitudine.

*Alae* omnes rotundatae, integrae, planae.

*Anticae* fascia in medio latissima, in margine externo incipiens et latior, marginem internum non tangens. Juxta apicem macula et in margine postico maculae quinque. *Posticae* supra macula oblonga obsoleta in medio et sex in margine postico. Subtus omnes concolores.

*Variat* forsan sexu: colore fasciarum et macularum flavo et aurantiaco; fascia media integra et ex maculis constante: macula apicis magna et minutissima.

Roesel. Inf. T. 3. p. 17. t. 3. an?

*Geometra vespertaria: pectinicornis alis flavis: strigis duabus, posteriore limbum obscurum terminante.*

*Phalaena vespertaria.* Fabric. Sp. Inf. T. 2. p. 249.

Habitat in Svecia australi. Winbom Theol. Adj.

Media, tota flava seu aurantiaca.

*Alae* rotundatae, parum dentatae. *Anticae* fascia tenui curva, cum margine purpureo circum constituyente purpureum. Punctum in medio purpureo-fuscum. Fascia lata subabrupta purpurea marginem posticum terminat. Omnes subtus et *Posticae* supra puncto minimo in medio et margine postico purpureo notantur. *Variat* quoque alis tenuissime punctatis.

*Geometra dentaria: pectinicornis alis subfalcatis dentatis pallidis: strigis duabus puncto margineque ferrugineis.*

Pha-



*Phalaena dentaria?* Fabric. Sp. Inf. T. 2. p. 245.  
Magnitudine *G. falcatariae* vel paulo minor,  
tota pallide lutea.

*Antennae* pectinatae.

*Alae anticae* falcatae, dentatae dentibus duobus majoribus; fasciae duae ferrugineae, tenues in medio, anterior obliqua, posterior undata. Punctum minutum inter fascias versus exteriorem marginem. Margo posticus ferrugineus. *Posticae* supra et omnes subtus pallidiores puncto fusco.

*Geometra cultraria: pectinicornis alis subfalcatis luteis: fascia punctoque saturatioribus.*

*Phalaena cultraria.* Fabric. Sp. Inf. T. 2. p. 243.  
Statura et magnitudine *G. falcatariae*, tota luteo-ferruginea.

*Antennae* alterius sexus setaceae.

*Alae* omnes luteo-ferrugineae, et subtus immaculatae; *Anticae* subfalcatae; supra omnes fascia saturatiore in medio, versus exteriorem marginem latiore et puncto fusco minime notata.

*Geometra deleataria: pectinicornis alis viridialbis: fasciis tribus lineolaque apicis nigra.*

Habitat in Hallandia. P. Osbeck.

Magnitudo media seu *G. Vavariae*.

*Antennae* pectinatae, fuscae.

*Alae* albo virescentes: fascia prima prope basin nigra, curva; secunda et tertia in medio, dentato-undatae, in margine interno concurrentes. Linea obliqua nigra in ipso apice. Subtus pallidiores area punctoque nigro.

*Geometra pictaria: pectinicornis alis cinereis pulverulentis: fasciis duabus circumflexis punctoque nigris.*

Habitat in Hallandia P. Osbeck; Uplandia Ekelund.

Magnitudine G. *vavariae*, tota fusco-cinerea et punctis minutissimis nigris irrorata.

*Antennae* alterius sexus pectinatae, alterius setaceae, ferratae.

*Alae anticae* bifasciatae: fascia altera prope basin curva, altera intra marginem valde undulata et circumflexa nigra. Margo posticus nigropunctatus. Punctum nigrum inter fascias et interdum flavedo conspersa. *Posticae* arcu punctoque nigro.

*Geometra fagaria*: *pectinicornis* alis cinereis pulverulentis: fasciis duabus dentatis punctoque nigris.

Habitat in Hallandia. P. Osbeck.

Magnitudine media, tota cinerea seu albida punctis minutissimis nigris irrorata.

*Antennae* pectinatae, cinerae.

*Alae anticae* supra fasciis duabus nigris, altera prope basin dentata, altera infra marginem, valde undulata et quasi e punctis nigris concatenata. Punctum in medio oblongum. In ipso margine puncta minutissima vix conspicua nigra. *Posticae* et omnes subtus fascia postica et puncto nigro.

*Geometra scopularia*: *pectinicornis* alis albidis: fasciis quatuor undatis nigris.

Magnitudine G. *vavariae*, tota cinereo-alba.

*Antennae* alterius sexus setaceae.

*Alae anticae* fasciis quatuor undatis nigris absque puncto; subtus hae fasciae obsoletiores. *Posticae* puncto fasciaque unica nigris. Subtus omnes arcu punctoque nigris. Puncta marginis alarum nulla.

Geo-



*Geometra 4-fasciaria; pectinicornis alis cinereis: fasciis quatuor obsoletis fuscis.*

De Geer Inf. T. 2. p. 357. t. 6. f. 4.

*Phalaenaplumbaria?* Fabric. Sp. Inf. T. 2. p. 258.

Habitat Upsaliae. In Westrogothia Leonh. Gyllenahl.

Media alis cinereo-albis, nitentibus.

*Antennae* alterius sexus pectinatae apice setaceo alterius setaceae totae.

*Alae anticae* fasciis quatuor fuscis albae adjectis, unde videntur saepe quasi fasciae quatuor albae pellucidae margine altero nigro: prima fascia prope basin, secunda juxta hanc, utraque undulata; tertia pone medium, undata, saturatior; quarta prope hanc intra marginem undulata. Punctum oblongum fuscum inter secundam et tertiam fasciam, versus marginem externum. *Posticae* pallidiores, immacolatae. Omnes subtus pallide fuscae punctae nigro.

*Geometra vittata: seticornis alis purpurascens: vitta pallida.*

Magnitudine *P. purpuralis*, tota fusco-purpurascens, alis omnibus in media vitta pallida recta.

*Geometra immaculata: seticornis alis omnibus viridibus immaculatis.*

Habitat Upsaliae.

Major pnullo *G. viridata*.

*Antennae* setaceae, supra niveae, subtus cinereae.

*Alae* omnes rotundatae, integrae, saturate virides, immacolatae utrinque, sed subtus pallidiores.

*Thorax et abdomen* supra viridia.

*Abdomen* subtus et *pedes* cinerei.

*Geometra maculata: pectinicornis alis omnibus flavis: nigro maculatis.*

*Phalaena macularia*. Lin. Syst. Nat. T. I. p. 862.

*Phalaena maculata*. Fabric. Sp. Inf. T. 2. p. 264.

Habitat in Hallandia. P. Osbeck.

Media alis rotundatis flavis seu aurantiacis: maculae oblongae et inaequales per totam superficiem alarum omnium utrinque fuscae.

*Antennae* setaceae, fuscae.

*Corpus* fuscum.

*Geometra pulverata*: *seticornis alis aurantiacis nigro-pulverulentis: puncto atro.*

Magnitudine *G. crataegatam* superat.

*Antennae* setaceae, caput, thorax, abdomen, pedes fusca.

*Alae* rotundatae, integrae, ciliatae. *Anticae* supra fusco-ferrugineae, pulvere nigro dense adpersae, puncto in medio et maculis marginalibus aliquot nigris obsoletis. Subtus concolores, sed pallidiores. *Posticae* supra aurantiacae, parum nigro pulverulentae, puncto in medio magno nigro. Subtus obscuriores, magis nigro-pulverulentae, puncto et fascia obsoleta nigra.

*Geometra brunneata*: *seticornis alis ferrugineis: fasciis quatuor fuscis abruptis.*

Habitat Upsaliae.

Magnitudine *G. chaerophyllatae*, tota ferrugineo-pulverulenta.

*Antennae* alterius sexus parum pectinatae, alterius setaceae.

*Alae* integrae, rotundatae. *Anticae* utrinque fasciis quatuor; *Posticae* duabus fuscis. Supra hae fasciae abruptae, nec omnes transversae, interdum obsoletae et vix conspicuae.

*Geometra similata*: *seticornis alis ferrugineis: fasciis quatuor transversis fuscis.*

Inter

Inter minores, magnitudine *P. purpuralis*, tota ferruginea.

*Antennae* setaceae.

*Alae* omnes integrae, rotundatae, ciliatae, fasciis quatuor undatis transversis fuscis suprs et subtus notatae, licet color et fasciae subtua sint saturatiores.

Similis *G. brunneatae*, sed duplo minor et fasciae heic transversae, undulatae.

*Geometra flavicata: seticornis alis flavis: fasciis quatuor duplicatis saturatioribus.*

Habitat in Hallandia. *P. Osbeck.*

Inter minores magnitudine *P. purpuralis*.

*Antennae* setaceae et totum corpus flavum.

*Alae* rotundatae integrae, omnes pallide flavae.

*Anticae* strigis quatuor parium, *Posticae* duorum parium, undulatis, aurantiacis seu saturate flavis. *Anticae* puncto nigro in medio et *posticae* basi albae. Subtus concolores.

*Geometra crenata: seticornis alis dentatis ferrugineis: fascia strigisque undulatis nigris.*

Habitat in Hallandia: *P. Osbeck.*

Major *G. chenopodiata*, tota fusco-ferruginea.

*Alae anticae* supra fascia lata ab apice per medium ad apicem alae oppositae ducta, nigra. Strigae ante hanc paucae. pone illam plurimae undulatae nigrae. Margo posticus crenulatus. *Posticae* supra basi pallidae, dein totae tectae strigis undulatis nigris, margine dentato. Subtus omnes cinereae puncto et strigis obsoletis fuscis.

*Geometra cuspidata: seticornis alis flavis: fascia fusca dentata apicisque linea nigra.*

Habitat Upsaliae.

Minor *G. populata*, tota lutea seu aurantiaca.

*Antennae* setaceae.

*Alae anticae* supra fascia in basi obsoleta curva fusca; in medio fascia lata fusca seu purpurascens-fusca, antice crenata, postice dentata dente unico majore et magis exserto; in ipso apice linea fusca obliqua ut in *G. populata*. Subtus striga et linea apicis obsoleta. *Posticae* pallide flavae, immaculatae.

*Geometra variata: seticornis alis albis: fasciis tribus dentatis fuscis flavo-maculatis.*

Habitat Upsaliae; in Hallandia. P. Osbeck.

Media seu *G. chenopodiata* paulo minor.

*Antennae* setaceae, cinereae.

*Alae* rotundatae, integrae. *Anticae* albae nigro flavoque fasciatae: fascia prima in basi dentata; secunda in medio maculam albam includentem, extus latior, dentata dente uno maximo exserto: tertia in apice e pluribus strigis composita et linea apicis nigra obliqua ut in *G. populata*. C nigrum obsoletum in media ala. *Posticae* pone sordide albae, immaculatae. Omnes subtus sordide albae strigis obsoletis. Flavedo sordida in primis ante fasciam apicis.

Variat valde haec species.

*Geometra obliquata: seticornis alis albis: fasciis duabus obliquis, lineola apicis punctoque fuscis.*

Habitat Upsaliae.

Magnitudine *P. purpuralis*, tota cinereo-albida. *Antennae* setaceae.

*Alae* rotundatae, integrae. *Anticae* supra fascia in basi tenui obsoleta; alia ante et alia post medium a margine externo versus dorsum obliqua, cum puncto intermedio nigro. In apice lineola nigra continuata in fasciam obliquam



quam obsoletam, intra quam alia obsoleta parallela. *Posticae* fasciis pluribus geniculatis fuscis.

*Geometra reticulata: seticornis alis anticis fuscis albo-reticulatis, posticis albis fusco-fasciatis.*

Habitat in Hallandia. P. Osbeck.

Media magnitudine G. *vavariae*.

*Antennae* setaceae, cinereae.

*Alae anticae* rotundatae, supra fuscae, strigis albis curvis; undulatis, confluentibus reticulatae. *Posticae* albidae strigis fuscis, in primis postice. Subtus omnes pallidiores, concolores.

*Corpus et pedes* cinerei.

*Geometra nebulata: seticornis alis cinereis: fasciis duplicatis undatis k nigro inscriptis.*

Media seu magnitudine G. *prunatae*.

*Antennae* setaceae, cinereae.

*Alae* rotundatae, integrae. *Anticae* supra cinereo-albidae, fasciis confertis circiter sex parium, undulato-dentatis, fuscis; in media ala lineola nigra et pone hanc k nigrum minimum obsoletum. *Posticae* albae, prope marginem posticum strigarum fuscarum undularum pari et intra ipsum marginem striga nigra. In medio alae rudimentum strigae, obsoletum saepe. Subtus omnes sordide albae undulis obsoletis fuscis.

*Geometra trifasciata: seticornis alis albis: fasciis duabus latis compositis strigis undulatis.*

Habitat in Hallandia. P. Osbeck.

Media seu magnitudine G. *chenopodiatae*.

*Antennae* setaceae, fuscae.

*Alae* rotundatae, integrae. *Anticae* supra albidae, seu fascia lata alba in basi et alia latior

in medio, cui e nigrum inscriptum. Ante medium fascia lata obliqua et alia in apice latior, composita e quatuor strigis dentato-undulatis fuscis. *Posticae* albae, versus apicem strigis tribus obsoletis fuscis. Omnes subtus sordide albae puncto in medio et postice strigis tribus obsoletis fuscis.

Similis *G. nebulatae*, sed distincta fasciis albis.

*Geometra furcata: seticornis alis cinereis: fascia simplici bifida et trifida fuscis.*

Habitat Upsaliae - Westrin.

Magnitudine *G. chenopodiatae*.

*Antennae* setaceae, fuscae.

*Alae* integrae, rotundatae; *anticae* cinereae, nigro-pulverulentae et fasciatae: fascia tenuis in ipsa basi et alia prope hanc simplex: in medio fascia lata versus marginem externum bifida: in angulo ani fascia lata triplicem ramum exserens: Subtus canae fasciis obsoletis. *Posticae* utrinque canae puncto et arcu vix visibili.

*Geometra violata: seticornis alis albis: limbo fascia terminali nigro-ferrugineo-violaceoque undulata.*

*G. succenturiata* paulo major.

*Antennae* setaceae, nigrae.

*Alae* rotundatae, integrae, niveae: fasciae duae tenues obsoletae ante medium fuscae. Limbus marginis postici late fasciatus lituris confluentibus, valde undulatis; nigris et ferrugineis, includentibus fasciam e maculis caeruleis. Subtus concolores sed magis obsolete.

*Geometra oblongata: seticornis alis niveis: macula fusca punctum nigrum includente.*

Magnitudo et facies *G. nymphaeatae*.

*Antennae* setaceae, fuscae.

*Thorax* et *abdomen* albida.

*Alae*



*Alae oblongae, basi angustatae, rotundatae, integrae, omnes niveae: Anticae supra in margine externo punctis tribus prope basin nigris minutis: in medio macula majuscula fusca, anticè punctum nigrum lunatum includente; pone hanc fascia curva fusca et alia undulata intra marginem. Margo albus punctis septem fuscis. Posticae puncto in medio minuto et fascia duplici undulata fusca intra marginem nigro maculatum. Subtus alae sordide albae, concolores.*

*Pyralis sacralis: alis pallide flavescens: striga obliqua purpurea.*

*Phalaena sacraria Linn. Syst. Nat. T. I. p. 863. Fabric. Sp. Inf. T. 2. p. 252.*

*Magnitudo et facies omnino P. forficatis; tota pallide flavescens et immaculata praeter fasciam purpurascens, oblique ab apice alae ad medium dorso ductam.*

*Alae inferiores albae, immaculatae.*

*Pyralis ocellaris: alis cinereis: fascia curva maculaque ocellari fusca.*

*Palpi breves. Antennae setaceae.*

*P. forficatis paulo minor, alis magis obtusis et inflexis apice, tota cinereo-flavescens. In alis anticis fascia obsoleta, tenuissima, fusca paulo intra apicem, versus marginem anteriorem curvata: ante hanc macula purpureo-fusca puncto atro. Ab hac macula interdum litura tenuissima fusca versus marginem interiorem ducta. Alae posticae immaculatae.*

*Differt a P. forficatis: 1) linea obliqua non ad apicem alae, sed versus marginem anteriorem directa. 2) alis obtusis. 3) alis inferioribus fuscis.*

Varie-

Varietas hujus forte sexus, duplo minor e Japonia.

*Pyralis nemoralis: palpis recurvatis, alis griseis: strigis tribus fuscis; intermedia flexuosa.*

*Phalaena nemoralis.* Fabric. Sp. Insect. T. 2. p. 271. Syst. Entom. p. 642.

Kleeman Inf. T. I. tab. 38. f. 9. 10. an?

*Alae flavo-cinereae: fascia secunda tenuissima, valde flexuosa; tertia lunaris latior. Fascia tenuissima fusca intra cilia marginis.*

*Pyralis fardialis: alis fuscis immaculatis.*

Habitat circum Upsaliam.

Magnitudine *P. purpuralis* tota ferrugineo-fusca, immaculata.

*Antennae setaceae.*

*Pyralis minialis: alis sanguineis: striga serrata ordineque punctorum nigrorum.*

Habitat in Hallandia. P. Osbeck.

Magnitudine *P. glaucinalis*, tota sanguinea.

*Antennae setaceae.*

*Alae forficatae; Anticae* margine externo producto, saturatius rubro ante medium fascia tenuissima, obsoleta, fusca; pone medium fascia tenuis, valde serrato-undulata, obliqua, nigra. Intra marginem posticum ordo punctorum circiter sex nigrorum, transversorum.

*Posticae* immaculatae.

*Pedes* punctis paucis nigris, uti et punctum nigrum in ipsa costa alae.

Quandoque extimus margo alae prope costam niger.

*Pyralis sulphuralis: alis superioribus flavis: lineis duabus, punctis quinque, fasciisque duabus nigris.*

Habitat in australioribus Sveciae provinciis. Struve.

Magni-

Magnitudine *P. purpuralis*, [flava fasciis punctisque nigris. Mea potius nigra lineis fasciisque luteis.

*Antennae* setaceae et *thorax* niger.

In *alis anticis* linea flava juxta marginem anteriorem a costa ad medium dorsi. Intra marginem fascia undulata flava et alia in ipso margine recta; in exteriori margine liturae tres circumflexae, cohaerentes, flavae. *Posticae* supra fuscae, subtus flavae, fasciis duabus punctoque fuscis.

*Pyralis atralis*: *alis atris*: *maculis duabus niveis*.

*Phalaena atralis*. Fabric. Sp. Inf. p. 275. Syst.

Entomol. p. 645.

Habitat in Finlandia, Borgoe.

Magnitudine *P. glaucinalis*.

*Antennae* setaceae.

*Lingua* spiralis, ferruginea.

*Thorax* niger linea utrinque aurantiaca.

*Alae* omnes atrae, margine postico albicante, maculisque in singulo duabus niveis rotundis, majusculis, et in anticis adhuc tertia minutissima vix observanda.

*Abdomen* nigrum cingulis albis.

*Pedes* albi.

*Pyralis nivealis*: *alis griseo-fuscis*: *maculis duabus costalibus albis*, corpore niveo.

*Phalaena nivealis*. Fabric. Sp. Inf. p. 274.

Magnitudine *P. purpurem* parum superans.

*Antennae* fuscae, setaceae, subannulatae.

*Palpi* breves, fusci.

*Lingua*, corpus, pedes, *alae posticae* subtus niveae.

*Alae anticae* albidae, fusco-irroratae; in margine exteriori fasciae abbreviatae fuscae duae, et maculae duae seu tres albae. Paulo intra marginem fascia obsoleta undulata fusca et alia

alia in margine punctis nigris. Subtus alae hae uti et inferiores supra fuscae. *Alae posticae* punctis marginalibus distinctis et plurimis minutissimis fuscis per paginam sparsis.

*Pyralis punctalis*: *alis ferrugineis*: *striga flavescente*, *margine exteriori albo-punctato*.

*Phalaena punctalis*. Fabric. Sp. Insect. p. 275. Syst. Entom. p. 644.

Magnitudine *P. forficalis*, tota fusco-ferruginea. *Antennae* pectinatae, *palpis* duplo longiores.

*Alae anticae* fascia flavescenti-fusca paulo intra marginem, etiam subtus conspicua: in margine exteriori puncta minima alba, circiter 5 vel 7. *Posticae* fuscae immacolatae.

*Tortrix fagana*: *alis viridibus*: *strigis tribus obliquis albis*, *antennis pedibusque fulvis*.

*Pyralis fagana*. Fabric. Sp. Inf. p. 276.

Roef. inf. Tom. 4. tab. XXII. f. 4, 5.

Habitat Upsaliae Nic. Westrin.

*Caput*, *thorax*, *abdomen*, *alaeque* virides.

*Antennae*, *pedes*, *margines alarum anticarum* rufescentes.

*Thorax* villosus - subcristatus.

*Strigae* tres obliquae albiae in alis anticis.

Similis admodum *T. prasinanae*, sed differt eo, quod illi:

*Alae anticae* virides *strigis* duabus albis.

*Alae posticae*, *abdomen* et *pedes* albi.

*Tortrix coronana*: *alis nigris*: *fascia obliqua dentata rubra*.

Habitat in Westrogothia, Cl. Bjerkander.

Magnitudo et facies *T. heracleanae*, fusca tota.

*Alae anticae* supra nigrae, nitidae margine externo et in primis postico ciliatae. Antemedium fascia obliqua, ferruginea, albo-marginata.



ginata, antrorsum dentata, margines non tangens. Subtus pallidiores, unicolores. *Posticae* alae ciliatae cinereae utrinque.

*Fascia* alarum cruribus anteriora spectat et coronam omnino refert.

*Tortrix purpurana*: *alis purpureis*: *fasciis duabus margineque ciliari flavis*.

Magnitudine *T. holmianae*.

*Antennae* setaceae, corpore paulo breviores.

*Alae anticae* saturate purpureae, margine postico ciliari flavo: maculae duae flavae in margine exteriori, e quibus transit striga transversa tenuissima flava, quae maculas has in margine opposito conjungit. *Posticae* saturate purpureae margine postico ciliari et fascia unica flava. Subtus alae omnes coloratae ut in pagina superiori.

*Pedes* flavescentes.

*Abdomen* purpurascens.

*Tortrix montiniana*: *alis purpureis*: *macula dorsali marginalique trigona flavis*.

Habitat in Hallandia. P. Osbeck.

Magnitudine *T. holmianae*.

*Caput*, *thorax*, et *antennae* flavescentes.

*Alae anticae* supra purpurascens, macula dorsali communi et alia in margine exteriori trigona flava. Margo posticus ciliatus, flavus. Subtus flavescens, immaculatae. *Posticae* albidae immaculatae.

*Pedes* albi.

*Tortrix Osbeckiana*: *alis antice albis*: *arcu nigro*; *postice ferrugineis*: *fasciis fuscis scabris*.

Habitat in Hallandia. Pastor Doctor Osbeck.

Upsaliae Nicol. Westrin.

Magnitudine *T. Laeflingianae*.

*Caput* et *antennae* fuscae.

Tho.

*Thorax* albus.

*Alae anticae* a basi ad medium albae puncto utrinque unico minimo nigro et arcu communi nigro, cruribus retrorsum spectantibus, e squamis elevatis scabris; postice ferrugineae: fasciis fuscis obliquis, undulatis e squamulis elevatis scabris. Subtus *alae anticae* et *posticae* totae fuscae, obsolete subundulatae.

*Differt* ab *P. asperana* Fabricii: alarum anticarum arcu et punctis.

*Tortrix scriptana*: *alis ferrugineis nigro-irroratis, postice lineolis quatuor nigris, lituris marginalibus, albis nigrisque.*

Magnitudo, facies et similitudo summa *T. arcuanae*, tota ferruginea, nigro-irrorata.

*Alarum anticarum* margo exterior variis lituris albis nigrisque alternis obliquis notatur. Intra marginem posticum litura plumbeo argentea, curva et lineae quatuor, breves, nigrae, parallelae.

*Pedes* flavescentes, nigro maculati.

*Tortrix scabrana*: *alis cinereis fusco-subfasciatis scabris, margine exteriori exciso.*

*Pyralis scabrana*: Fabric. Sp. Inf. p. 284.

Magnitudine *T. Loeftlingianae*, supra albido-cinerea, subtus fusca margine omni albo.

*Alae anticae* minus scabrae, quam in *T. litterana*, fasciis duabus fuscis, altera in medio arcuata cruribus antrorsum spectantibus, altera infra apicem obliqua undulata. abrupta. Intra ipsum marginem fascia tenuissima, fusca, obsoleta.

*Tortrix litterana*: *alis virescentibus: squamis elevatis scabris.*

*Pyralis squamana*: Fabric. Sp. Inf. p. 284. Syst. Entomol. p. 651.

Pyra-



*Pyrälis litterana* Fabric. Sp. Inf. p. 284. Syst. Entomol. p. 646.

Magnitudine T. *Loeflingianae*, supra tota virescens, squamis elevatis scabra. Subtus fusca, laevis.

*Variet. a.* Puncta duo versus thoracem, in alis anticis et in medio versus marginem exteriorem puncta alia duo nigra.

— *b.* Alae anticae albido-virescentes absque punctis nigris.

*Tortrix stroemiana*: *alis cinereo-fuscis: maculis duobus dorsalibus albis.*

*Pyrälis stroemiana.* Fabric. Sp. Inf. p. 280.

Habitat in Sveciae, in primis australioribus Provinciis. In Hallandia, Osbeck. In Westrogothia, Bjerkander. In Uplandia, Joh. Mart. Ekelund.

Inter minores hujus generis, tota cinerea, nigro-irrorata.

*Caput et thorax albidus.*

*Alae anticae* basi versus interiorem marginem parum albicantes; in medio versus marginem internum macula utrinque alba, sub quadrata, postice versus anum fascia cinerea obliqua. Margo exterior variis maculis bifidis notatur.

*Alae posticae fuscae.*

*Pedes albi, nigro-maculati.*

Interdum macula alba anterior et media communicant.

*Tortrix Westriniana*: *alis flavis: fascia bifida punctisque duobus ferrugineis.*

Habitat Upsaliae et alibi.

Magnitudo et facies T. *Lecheanae*.

*Caput villosum, testaceum.*

*Palpi apice bifidi, villosi, brevissimi.*

*Antennae ferrugineae, corpore triplo breviores.*

*Thorax ferrugineus, villosus.*

*Vol. III.*

C

*Alae*

*Alae anticae* obtusissimae, luteae, nitidae; supra prope basin macula oblonga, in punctum manifestum terminata et margo ferrugineus: in medio alae a margine externo ad angulum ani fascia obliqua, lata, versus marginem externum et versus angulum ani bifida, in medio conjuncta lineola nigra: in ipso alae apice litura minima et fasciae aliquot tenuissimae, undulatae, ferrugineae. Subtus fuscae margine luteo. *Posticae* fuscae apice lutescente.

*Abdomen et pedes* flavescentes.

*Tortrix Gyllenhahlian*: *alis niveis, macula bascos communi fusca apicisque triangulari ferruginea.*

Habitat in Westrogothia, Bjerkander et Leonhard Gyllenhahl.

Magnitudo et similitudo *T. Moderianae*.

*Caput, palpi, thorax, pedes, abdomen* argentea.

*Antennae* albo nigroque annulatae, corpore dimidio breviores.

*Alae anticae* obtusae; supra niveae macula communi in interiori margine, subrotunda, fusco-ferruginea, obsoleta: a medio margine exteriori ad angulum ani fascia obliqua ferruginea, quae cum marginali conjuncta triangulum album in externo margine includit. Litura una vel duae in fascia postica plumbeo-argentea, vix observanda. Subtus uti et *posticae* utrinque fuscae: margine ciliato, pallido.

*Tortrix retusana*: *alis luteis retusis, linea dorsali capiteque albis.*

Habitat Upsaliae.

Magnitudine *T. heracleanae*.

*Caput* niveum oculis nigris.

*Palpi*

*Palpi porrecti, flavescentes, breves.*

*Antennae albo nigroque annulatae, longitudine dimidia corporis.*

*Thorax flavus dorso albo.*

*Alae deflexae; anticae forficatae et retuso-subfalcatae, supra luteae, testaceo tenuissime reticulatae, linea in basi et margine tenuiori angustissima alba. Posticae fuscae margine omni albo, ciliato.*

*Tortrix ferrugana: alis ferrugineis puncto albo. Similis priori magnitudine et statura; sed caput, thorax et alae anticae ferrugineae.*

*Palpi brevissimi, porrecti.*

*Antennae fuscae, corpore triplo breviores.*

*Alae anticae retusae, unicolores, puncto in medio minimo, quasi e squama erecta, albedo. Posticae fuscae, margine albido, ciliato.*

*Tortrix punctana: alis cinereis fusco-fasciatis, punctis distinctis nigris.*

*Magnitudine T. hamanae.*

*Caput cinereum palpis brevibus cinereis.*

*Antennae fusco cinereae, corpore triplo breviores.*

*Thorax antice fascia nigra.*

*Alae anticae obtusissimae, cinereae fasciis tribus vel quatuor fuscis, undulatis, obsoletis: prope basin fascia obliqua e punctis tribus in singula ala; in medio inter fascias puncta duo nigra, interiore minori; ipse margo nigropunctatus. Subtus fuscae immaculatae. Posticae utrinque albae margine postico nigro.*

*Abdomen et pedes albi.*

*Tortrix lunana: alis cinereis: fasciis duabus fuscis lunatis, antennis pectinatis.*

*Parva, magnitudine T. Bergmannianae.*

*Caput, thorax, corpus, pedes et antennae pectinatae, fuscae.*



*Alae anticae* deflexae, obtusae, cinereae, fusco tenuissime irroratae, fasciis duabus nigris: altera in medio alarum, utrinque attenuata, lunata cruribus anteriora spectantibus; altera intra apicem, margine externo dilatata. *Posticae* supra fuscae. *Alae* omnes subtus cinereae, nigro-irroratae.

*Tinea Bjerkindrella*: *alis fuscis nigro-undulatis: punctis sparsis argenteis.*

Habitat in Kinnekulle Westrogothiae.

*Larva* viridis, lateribus flavescentibus, tres lineas longa: caput brunneum; primi articuli prope caput punctis duobus nigris, reliqui tres punctis in triangulum positis. *Larva* deorsum flexa et filo pendens sese demittit. *Edit Inulam salicinam*, cujus folia cum caule connectit. Rete eodem modo ac *T. Evonymella* fabricat; ante metamorphosin sub terra se condit. *Pupa* mense Julio et post quatuordecim circiter dies *Imago* eodem mense prodit. Comminister Bjerkander, Observator indefessus et bene meritus.

Magnitudo et statura omnino *T. strobilellae*.

*Antennae* filiformes, albo nigroque annulatae; corpore dimidio breviores.

*Palpi* recurvi, fusci.

*Thorax* fuscus, auro renitens.

*Alae anticae* convolutae, obtusae, fuscae fasciis variis nigris, auratis: puncta plurima, sparsa, argentea; in basi duae oblongae et tertium minimum; tria in medio transversa et unum pone hoc prope exteriorem marginem; alae intra apicem quasi impressae, punctis circiter quinque circum lacunam in orbem dispositis.

*Caput* et *pedes* albi punctis fusco-argenteis.

*Abdomen* fuscum.

2.

---

DISSERTATIO  
DE  
INSECTIS SUECICIS.  
PARS II.

D. IO. DEC. 1791.

RESP.

PETRUS ERICUS BECKLIN.

PROOEMIUM.

**P**rodiit editio prior Faunae Suecicae LINNEI anno 1746, 926 continens species insectorum; altera, quae edita fuit 1761, emendata et ab auctore ipso aucta ac locupletata fuit speciebus adhuc 795, sic ut circa illud tempus 1691 species insectorum suecicorum fuerint cognitae et maximam partem descriptae. Hicce vero numerus sensim auctus fuit in Operibus aliis Illustr. LINNEI, ut in Systemate Animalium 1767 edito, ubi recensentur sequentes incolae Suecicae, scilicet:

*Scarabaeus plagiatus.*

*Ptinns imperialis.*

*Silpha succinea.*

*fusca.*

*atomaria.*

C 2

Coc-

*Coccinella* 6-punctata.

10-guttata.

*Chrysomela* minutissima.

fastuosa.

*Attelabus* melanurus.

*Cerambyx* depfarius.

*Leptura* alni.

*Elater* dermestoides.

*Tenebrio* depressus.

minutus.

linearis.

*Scarites* clavicornis.

*Staphylinus* cantharellus.

piceus.

*Cimex* semiflavus.

laniarius.

superciliosus.

melanocephalus.

ferrugineus.

*Phaiaena* dipsacea.

Brunnichana.

Podaella.

Scopolella.

occullella.

*Hemerobius* paganus.

*Phryganea* marginata.

*Cynips* inanita.

*Tenthredo* nigra.

vafra.

*Sirex* pygmaeus.

*Ichneumon* fomentator.

formicatus.

atomus.

*Sphex* palmipes.

ephippia.

*Chrysis* bidentata.

Chry-



*Chrysis succinea.**Apis Fabriciana.**Tipula esicornis.**annulata.**virens.**viridula.**culiciformis.**minutissima.**Musca trilineata.**furta.**subsultans.**cucullaria.**terrestris.**combinata.**4-punctata.**Conops subcoleoptrata.**Podura minuta.**vaga.**Aranea 4-lineata.*

Et in appendice tertii Tomi seu Systematis Mineralium, anno 1768 impresso:

*Curculio trifolii.**Tenebrio festinans.**Hemerobius cruciatus.**Aranea tigrina.*

Longe tamen absuit, ut numerus Insectorum Suecicorum jam fuit absolutus. Detecta enim fuerunt multa alia individua, ante non visa; et quo magis crescit Entomologiae studium, eo plures quotannis e latebris suis in lucem producuntur novae species. Generosiss. Dom. Baro et Maresch. DE GEER non paucas memorat species, in elegantissimo suo opere Entomologico. Illust. Entomolog. Prof. FABRICIUS varias prae-

terea

terea species Insectorum, in Suecia repertorum  
recenset, ut in Systematae Entomologico 1775  
impresso:

*Hister brunneus.*  
*Byrrhus aeneus.*  
*Opatrum minutum.*  
*Coccinella impunctata.*  
                   13-maculata. \*)  
*Curculio scabriculus.*  
                   tristis,  
                   punctatus.  
                   obscurus,  
*Elater striatus.*  
*Elaphrus rupestris.*  
*Hydrophilus 2-punctatus.*  
*Dytiscus depressus.*  
*Scarites clavicornis, Teneb. minutus L.*  
*Cimex sylvaticus.*  
                   clavipes.  
*Bombyx laeta.*  
*Noctua oculea.*  
                   tristis,  
*Phalaena maculana.*  
                   laetana.  
                   rivellana.  
                   strigana.  
                   depressana.  
*Alucita dentella,*  
                   lucella,  
                   flavella,  
*Ephemera marginata.*  
*Phryganea analis.*  
                   pilosa,

Ten-

\*) *Coccinella ridularis* minime in Suecia reperitur, sed habitat in Cap. bonae spei Africes.

*Tenthredo obscura.*

*pavida.*

*opaca.*

*Ichneumon debellator.*

*variegator.*

*falcator.*

*agilis.*

*cursitans.*

*pedestris.*

*Andraena hemorrhoidalis.*

*Nomada cingulata.*

*Formica tuborum.*

*Tipula fasciata.*

*cincta.*

*Rhagio clavipes.*

*Empis cinerea.*

In Speciebus Insectorum 1781 editis:

*Opatrum gibbum.*

*tibiale.*

*Dytiscus 6-pustulatus.*

*inaequalis.*

*Staphylinus nitidulus.*

*Phalaena fuliginaria.*

*Tenthredo lateralis.*

Inque Mantissa insectorum 1787 edita:

*Scarabeus arenarius.*

*Dermestes pallipes.*

*lunatus.*

*Bostrichus elongatus.*

*Sphaeridium luteum.*

*Bruchus varius.*

*Ips humeralis.*

*nigra.*

*Tritoma glabra.*

*Cistela morio.*

*Curculio lythri.*

*ilicis.*

*fraxini.*

*tremulae.*

*jota.*

*Rhinomacer attelaboides.*

*Leptura pubescens.*

*Malachius viridis.*

*Buprestis flavomaculata.*

*Gyrinus bicolor.*

*Carabus picipes.*

*agilis.*

*Staphylinus melanocephalus.*

*Cimex ferrugatus.*

*pallens.*

*vagans.*

*Noctua vaccinii.*

*occulta.*

*strigilis.*

*Phalaena fulvata.*

*obscurata.*

*Pyralis niveana.*

*borana.*

*paykulliana.*

*abietana.*

*populana.*

*Tinea pectinella.*

*obscura.*

*Phryganea discoidea.*

*Ichneumon compressus.*

*Musca erythrocephala.*

*dauci.*

Celeber. Dom. Praeses in Entomologia non minus, quam in aliis Historiae Naturalis partibus

bus optime meritis, in Novis Actis Upsaliensibus, Vol. 4, species quadraginta circum Upsaliam plerumque inventa describit. Et in Dissertationibus, quæ Ejus sub præsidio divulgatae sunt, tam de Insectis suecicis, quam de Musæo Academico non paucae describuntur et recensentur indigena insecta, quæ nuperius intra Patriæ fines inventa fuerunt. In Dissertatione nimirum de Insectis Suecicis P. I. Species 55 enumerantur; et in Partibus Musæi Academici 43 species, patriam nostram inhabitantes, commemorantur. Celeb. Acad. Aboënsis Professor Dominus BONSDORF in Dissertatione de Genere Curculionis species plures novas Sueciæ, nonnullas quoque Dom. Mag. QUENSEL in sua Dissertatione Lundini habita notas reddiderunt; atque Monographiæ Nob. Dom. PAYKULL Staphylinos circiter 43, atque Carabos circiter 47 describunt. Præter insecta illa, quæ in Actis Novis Holmenfis ab anno 1780 usque ad præsens tempus descripta sistuntur, inter quæ reperiuntur:

*Lucanus parallelipipedus.*

*piceus.*

*Serropalpus striatus.*

*Curculio napobrassicae.*

*Anobium atrum.*

*Elater segetis.*

*Noctua telifera.*

*Tinea rubiella.*

*betulinella.*

*sagitella.*

*labyrinthella.*

*Ichneumon labyrinthellæ.*

*Oestrus trompo.*

*Musca napobrassicae.*

*avenæ.*

Novis-



Novissima Systematis animalium Linnaei editio, studio Illustr. GMELIN 1788 et seqq. non edita modo, sed summiopere aucta et emendata; varia insuper insecta memorat, quae Sueciam inhabitare dicuntur, qualia sunt:

*Curculio dryades.*

*Calopus pygmaeus.*

*Elater melanophthalmus.*

*Gryllus cinereus.*

*Coccus uva.*

*Noctua querceti.*

*alpium.*

*Musca hypoleon.*

*Aranea 8-punctata.*

Tot novis intra Sueciae limites detectis Insectis, facile crederes, numerum illorum jam esse completum. pluraque posthac detegenda frustra quaeri. Tantum vero abest, ut omnia adhuc detecta sint; ut potius quotidie nova quaedam indagentur. Contigit mihi in Collectione publica, quam Celeb. D. Praeses non modo Academiae huic liberaliter dono obtulit, sed quam etiam quotidie auget et amplificat indefesso, ingentem Insectorum, in Patriae variis provinciis repertorum, numerum perspicere. Haec insecta vel omnino sunt ante ignota, vel etiam dudum ante apud exteros inventa et descripta. Atque haec exsanguia animalcula. longe plurima, opera indefessa Amicorum et Discipulorum Celeb. Dn. Praesidis in variis regionibus collecta fuerunt, quorum nomina laude digna enumerari heic merentur. Sic Animalcula haec minutiora in *Hallandia* investigavit venerandus Senex Dn. OSBECK; in *Westrogothia* Past. BJERKANDER, Dn. PENTZ, et Entomologorum Sue-

Sueciae facile primarius Dominus Capitaneus LEONH. GYLLENHAL; in *Westmannia* Dn. D. HALL; in *Blekingia* indefessus D. RHEN; in *Vermelandia* D. Licenciatus HOLMER et Dn. NÖREN; in *Ostrogothia* D. WESTRIN; in *Gestrícia* D. PRINTZ; in *Finlandia* D. HAST et Mag. TÖRNER; in *Norlandia* et *Laponia* Prof. WINBOM, Mag. LILJEBLAD, RUTSTRÖM, QUENZEL, Dom. EKHOLM; circa *Stockholmiam* Dr. STRUVE, D. DELEN et SCHÖNHERR; in *Smolandia* Mag. LILJEBLAD et WAHLBOM; qui omnes cum Cel. D. Praeside sua communicare voluerunt, detecta, quae sensim publici juris erunt facienda. Meum vero erit, tantum ex Lepidopterorum ordine pulchras nonnullas Species descriptas sistere atque tuo B. L. scrutinio mitiori subicere.

\* \* \*

PAPILIO ISIS. P. D. F. *alis integris ferrugineis supra immaculatis, subtus anticis fascia alba ocelloque solitario, posticis arcu albo ocelloque sesquialtero.*

*Habitat* in Suecia Dom. DELEN, alii; in Roslagia GEDNER.

*Alae* integrae, supra ferrugineae seu ferrugineo-fuscae, unicolores absque ocellis. Subtus *anticae* ferrugineae fascia abbreviata alba pone medium, et pone hanc ocellus solitarius; *posticae* fuscae fascia undata alba in medio et intra marginem ocellus pupillatus cum adjecto puncto albido coeco.

*Simillimus* P. *panphilo*, sed duplo fere major et in pluribus distinctus.

PAPILIO MATUTINA. P. N. ph. *alis fulvis: fasciis flavis nigrisque, posticis septem-punctatis.*  
Habi-

*Habitat* in Suecia Dom. AFZELIUS, GROEN-  
DAL, alii.

*Caput* hirtum uti et *Corpus* et *alae* basi supra.

*Antennae* albo nigroque annulatae, capitulo  
nigro, apice ferrugineo.

*Palpi* porrecti, lanceolati, ferruginei.

*Alae* omnes fulvae. *Anticae* supra basi nigrae,  
tum flavae fere ad apicem venis nigris; in  
disco flavo fasciae nigrae duae et fasciae duae  
ferrugineae nigro-marginatae. *Margo* posticus  
niger; intra marginem ordo macularum  
triangularium flavescens, tunc fascia den-  
tata nigra. *Posticae* supra basi et interius  
nigrae, ceterum fulvae macula baseos, fascia  
maculari media et maculis marginalibus septem  
triangularibus flavescens. *Margo* niger;  
intra maculas triangulares fascia dentata nigra,  
et intra hanc ordo punctorum septem, sub-  
ocellarium nigrorum. Subtus omnes sub-  
concolores, sed pallidiores margine postico  
flavo, et basi fulvae maculis luteis nigro-  
marginatis.

*Abdomen* supra nigrum, subtus flavescens.

*Pedes* flavescens.

*Variat* magnitudine.

Similis *P. maturinae*, sed distinctus ordine pun-  
ctorum imprimis.

Similis quoque Fig. ENGRAMMELLE, Papil. d'Eu-  
rope Tab. 17, sed diversus

PAPILIO PHOEBE. FABRIC. Mant. Inf. Vol. 2.  
pag. 58.

ENGRAMMELLE. Pap. d'Europ. p. 249. tab. 61.  
fig. 88. a b. bis.

Diffinguitur a *P. Delia*, cui simillimus, punctis  
nullis nigris in anticis supra, quodque paulo  
major.

Opti-



Optime noscitur punctis quatuor in posticarum  
basi subtus nigris.

PAPILIO DELIA. FABRIC. Mant. Inf. Vol. 2. p. 60.

ENGRAMMELLE. Pap. d'Europ. p. 69. tab. 19.

fig. 32. c. d. e. f.

PAPILIO DICTYNNA. FABRIC. Mant. Vol. 2. p. 59.

ENGRAMMELLE. Pap. d'Europ. p. 252. tab. 62.

fig. 31. a. b. bis. Suppl. 3. p. 320. tab. 4.

fig. 31. k.

Valde similis *P. Athuliae*, a qua vix diversa, nisi  
quod fusca et minor.

PAPILIO DAPHNE. FABRIC. Mant. Inf. Vol. 2.

pag. 64.

ENGRAMMELLE. Pap. d'Europ. p. 56. tab. 15.

fig. 20. a. b. c.

Habitat in Suecia et in Lapponia. LILJEBLAD.

PAPILIO FRIGGA. P. n. ph. *alis fulvis nigro-*  
*maculatis, posticis subtus basi purpureis: fascia*  
*dentata maculari argentea serieque duplici*  
*punctorum.*

Habitat in Lapponiae sylvis, locis uligino-  
sis Salice Lapponum repletis, LIBJEBLAD;  
QUENZEL.

Magnitudine *P. Ligeae*.

Caput, Thorax, Abdomen supra hirsuta, fer-  
rugineo-nigra.

Palpi porrecti, lanceolati, hirti, ferruginei, lon-  
gitudine capitis.

Lingua involuta, ferruginea.

Antennae filiformi-articulatae, ferrugineae, ni-  
gro-annulatae; capitulo nigro, apice brunneo.

Alae omnes supra fulvae, nigro-venosae; *An-*  
*ticae* basi fuscae, margine interiori hirtae,  
ultra medium nigro-fasciatae fasciis subqui-  
nis dentatis sub-connexis; ipse margo albi-  
dus nigro-punctatus: intra marginem fascia  
nigra,

nigra, intra hanc fascia e punctis septem nigris nervos interjectis. *Posticae* nigro-venosae, basi cinereo-hirsutae, ultra medium nigrae maculis duabus fulvis; ipse margo albidus: intra illum ordo punctorum sex nigrorum in ipsis venis: intra haec puncta fascia nigra transversa subinterrupta, et intra hanc fascia vel ordo punctorum sex vel septem atrorum nervos interjectorum. Subtus alae *Anticae* paginae superiori concolores; *posticae* totae purpureae, basi tamen ultra medium saturatius et parum villosae. Prope basin et marginem exteriorem macula oblonga argentea purpuream includens; cum hac connectitur fascia dentata curva e maculis dissimilibus novem argenteis, saepe pulvere ferrugineo irroratis. Margo denticulatus, albidus; intra illum inter nervos nigricantes ordo punctorum septem minutissimorum nigrorum et intra hunc ordo punctorum sex, quorum quatuor intermedia argenteo-pupillata.

*Abdomen* subtus, et tibiae lutescentes.

PAPILIO PALES. FABRIC. Mant. Inf. Vol. 2. p. 63.

ENGRAMMELLE. Pap. d'Europ. p. 244. tab. 60. fig. 21. bis a. b. c. d.

*Habitat* in Suecia var.  $\alpha$ . cum descriptione P.

*Pales* FABRIC. exacte conveniens. var.  $\beta$  in Norlandia et Smolandia. Locis paludosis D. Mag. LILJEBLAD, var.  $\gamma$ . in Lapponia D. Mag. QUENZEL.

Var.  $\beta$  magis hirsuta supra, alis anticis intra marginem posticum late fusco-maculatis; alae posticae supra punctis majoribus cum marginalibus confluentibus

Var.  $\gamma$ . alae posticae supra basi fere usque ad marginem posticum nigrae et minus hirsutae.

PAPI-



**PAPILIO FREIJA.** P. n. ph. *Alis fulvis nigro-maculatis, posticis subtus ferrugineis: fasciis duabus maculisque plurimis nigris albisque.* *Habitat* in Vestrobothnia juxta flumina locis graminosis D. Mag. LILJEBLAD et in Lapponia D. Mag. QUENZEL.

*Magnitudine* P. *Ligeae*, totus fulvus, alis posticis saturatioribus.

*Caput, Palpi, Antennae, Thorax, Abdomen, Pedes* ut in P. *Disa*.

*Alae* omnes supra fulvae seu ferrugineae, nigro-venosae. *Anticae* basi fuscae, hirtae; infra basin maculae duae atrae, tum fascia dentata, inde fascia undato-dentata versus exteriorem marginem bifida; pone hanc versus marginem exteriorem litura; pone hanc ordo punctorum septem nervos interjectorum, deinde fascia dentata et tandem fascia marginalis intra ipsum marginem albidum. *Posticae* basi versus marginem interiorem hirsutae, ultra medium nigrae maculis duabus minutis ferrugineis; pone medium fascia punctorum sex inter nervos versus marginem internum sensim majorum. Ipse margo niger ciliis albis; intra marginem fascia dentata nigra. Subtus *anticae* paginae superiori concolores, sed fasciis et maculis magis obsoletis et maculis albis marginalibus albicantibus magis exstantibus. *Posticae* nigro-quadrifasciatae fasciis undulato-dentatis; fascia prima infra basin, brevis, prope marginem exteriorem; secunda ante medium marginem nullibi attingens, includens maculam albam puncto nigro notatam; tertia pone medium, curvata, a margine ad marginem extensa; quarta intra marginem posticum dentata, maculas septem albas trian-

gulares includens. Inter fasciam tertiam et quartam ordo punctorum nigrorum sex. Praeterea maculae quatuor albae baseos, et plures triangulares atque quadrato-cruciformes inter fascias nigras priores; pone fasciam tertiam nigram fascia alba e maculis lunaribus.

*Similis* supra *P. Disae*, subtus diversissimus et pulcherrime variegatus.

*Sexus* magnitudine variat.

PAPILIO NORNA. P. n. g. *Alis cinereo flavescens*, *posticis subtus fusco-marmoratis*.

*Habitat* in Lapponia,  $\alpha$ .  $\beta$ . juxta alpes LILJE-  
BLAD, RUTHSTRÖM, et EKHOLM;  $\gamma$ . QUENZEL.

*Triplex* occurrit varietas. Omnes alae supra fordide flavescens margine omni fusco, posticarum maculis triangularibus. *Anticae* subtus concolores margine extimo et apice irrotatae. *Posticae* subtus nigro alboque marmoratae, fascia tamen lata dentata in medio et margine magis obscuris.

*Caput*, *Palpi* et *Corpus* hirsuta, nigra.

*Antennae* fusco-flavescens.

Var.  $\alpha$ . alae *anticae* supra punctis nigris sesquitertiis, subtus ocellis tribus minutis; *posticae* supra puncto, subtus ocello unico.

Var.  $\beta$ . alae *anticae* supra punctis duobus, subtus ocellis totidem; *posticae* absque punctis et ocellis.

Var.  $\gamma$ . alae *anticae* et *posticae* utrinque absque punctis et ocellis.

*Alae* tenues, semipellucidae, rotundatae, subdentatae, omnes pallidae, flavescens margine antico et postico nigris.

*Similis* quidem ENGRAMELLE Pap. d'Europ. p. 258. tab. 64. fig. 38. a. b. bis; differt, vero alis, imprimis subtus dissimilibus.

**PAPILIO DISA.** P. n. g. *Alis fuscis, anticis fascia ferruginea quadripunctata; posticis subtus cinereis: fascia lata arcuque nigris.*

*Habitat in Lapponia.* Magist. QUENZEL. P. Gefion Qv. Aët. Holm.

*Antennae subtus albo annulatae.*

*Palpi, Caput, et totum Corpus nigrum, hirtum.*

*Alae anticae utrinque fuscae; intra apicem fascia, margines non attingens, ferruginea, in qua puncta quatuor caeca nigra, quorum duo extima approximata. Posticae supra fuscae, immacolatae; subtus cinereo-griseae: fascia in medio curva, lata, dentata, fusca; margo nigricans; inter marginem posticum et fasciam latam arcus undulatus, transversus, niger.*

*Differt manifeste a P. Lappona et Embla, quibus similis.*

**PAPILIO LAPPONA.** P. n. g. *Alis fuscis, anticis fascia rufa: punctis quatuor nigris; posticis supra fuscis, subtus griseis: fascia dentata fusca.*

*Habitat juxta kengis Vestrobothniae D. Mag. RUTHSTRÖM; in Lapponiae sylvis LILJEBLAD, EKHOLM; in Lapponia QUENZEL. P. Gefion. Qv. Aët. Holm.*

**ENGRAMMELLE** Papillions d'Europe p.259. tab.64. fig.42. a. b. c. d. bis. Suppl.3. p.321. tab.4. fig.42. a. b. quint. valde similis, vix idem.

*Antennae fuscae, basi albae, clava oblonga lutea compressa.*

*Caput et Palpi porrecti, villosi, nigri.*

*Alae rotundatae, sub-integrae, supra omnes fuscae, anticae supra fascia lata, abbreviata, ferruginea in qua puncta quatuor nigra, tertio obsoleto; posticae punctis unico vel tribus nigris, saepe obsoletis intra marginem. Subtus*



*anticae* ferrugineae marginibus apiceque griseis punctisque quatuor nigris; *posticae* cinereae fascia dentato undulata latiori punctisque intra marginem tribus, nigris, saepe obsoletis. *Corpus* supra nigrum, subtus cinereum.

*Varietas* triplex occurrit:

α. fascia rubra latiori nigro-marginata.

β. puncto in posticis alis unico.

γ. punctis quatuor in posticis supra.

**PAPILIO EMBLA.** P. n. g. *Alis fuscis: supra ocellis quatuor; subtus anticis quadri-ocellatis, posticis quadripunctatis maculisque duabus albis.*

*Habitat* in lucis Vestrobothniae subhumidis, horis vespertinis. LILJEBLAD

*Antennae* fuscae, albo-annulatae.

*Palpi* portecti, hirsuti, fusci uti et *corpus totum.*

*Alae* rotundatae, vix dentatae, omnes utrinque fuscae; *Anticae* supra infraque fascia marginem non attingente lutea, in qua ocelli quatuor, quorum extimus albo-bipupillatus, intimis caecis. *Posticae* supra ocellis quatuor luteis, pupilla nigra, subtus punctis quatuor minimis nigris; in medio fere alae macula albida et alia marginalis obsoleta.

*Magnitudine* P. *Ligeae*, cui simillimus uti et similis p. *Blandinae*, satis tamen ab omnibus distinctus.

**PAPILIO ADONIS.** P. p. r. *Alis integris fusco-caeruleis: striga marginali, subtus cinereis: punctis ocellaribus; posticis macula centrali alba.*

*Papilio Adonis.* FABRIC. Mant. Inf. Vol. 2. p. 75. ENGRAMMELLE Pap. d'Europ. p. 173. t. 39. fig. 82.

*Habi*

*Habitat in Suecia* D. Demonstr. AFZELIUS.

Valde affinis P. *Idae*. Lin.

PAPILIO CORYDON. P. p. r. *Alis integris caeruleiscentibus margine nigro, posticarum ocellari; subtus cinereis: punctis ocellaribus lunulisque fulvis.* FABRIC. Mant. Inf. Vol. 2. pag. 74.

ENGRAMMELLE Pap. d'Europe pag. 174. t. 39. fig. 83.

*Habitat in Suecia.* LILJEBLAD.

Valde variat.

PAPILIO OPTILETE. FABRIC. Mant. Vol. 2. p. 74.

ENGRAMMELLE Pap. d'Europe p. 311. tab. 84. fig. 85. tert. a, b, c.

*Habitat in Suecia.* Dom. AFZELIUS. Licentiat. HOLMER.

PAPILIO CLEOBIS. P. p. r. *Alis integris caeruleis, subtus canis: punctis oblongis nigris simplicibus.*

*Papilio acis.* FABRIC. Mantiss. Vol. 2. p. 73.

*Habitat in Suecica.* Notar. DELÉN.

PAPILIO MINIMUS. P. p. r. *Alis integris fuscis supra maculatis, subtus albidis, basi caeruleis: lunula fasciaque ocellari.*

ENGRAMMELLE Pap. d'Europe p. 181-183. t. 42. fig. 88. e. f.

*Habitat in Vestmannia* Dom. Doct. HALL.

*Minor* P. *Argiolo*, totus supra fuscus, immaculatus basi alarum caerulea, nitente.

*Alae* subtus cinereo-albidae. *Anticae* lunula nigra fasciaque ocellari e punctis sex nigris; *posticae* prope basin puncta duo nigra, ante medium lunula obsoleta; postice ordo punctorum ocellarium septem serie abrupta punctoque ocellari solitario intra marginem. Ocelli



posticarum interdum valde obsoleti, ut vix manifesti.

PAPILIO HILLE. P. p. r. *Alis integris caeruleo-micantibus, subtus punctis ocellaribus numerosis.*

FABRIC. Mant. Vol. 2. p. 80.

*Habitat ad Luloam antiquam frequentissime, 1788 a LILJEBLAD lecta.*

Valde similis P. hippothoë, sed supra non fulvus, verum caerulescens, nitidus, margine postico imprimis posticarum fulvo-fasciato; subtus similiores, sed hic duplo fere minor.

BOMBYX RECLUSA. *Alis destexis plumbeo-ferrugineoque variis: fasciis tribus albis anastomosantibus, macula apicis ferruginea: puncto marginali albo.* FABRIC. Mant. Inf. Vol. 2. pag. 120.

ROES. Inf. tom. 4. tab. II. f. 4. 5.

*Habitat Upsaliae. Prof. AURIVILLIUS. Praeses, alii. Simillima habitu et structura B. curtulae, sed quadruplo minor, tota valde hirsuta.*

BOMBYX LAPPONICA. *Alis deflexis, anticis brunneis: punctis fasciisque flavis; posticis basi fuscis, apice fulvis: maculis quatuor nigris.*

*Habitat in Lapponia. D. GROENDAL.*

*Magnitudine et fascie B. Plantaginis.*

*Antennae pectinatae, nigrae.*

*Caput, Thorax, Abdomen hirsuta, fulva.*

*Thorax flavo-sexmaculatus, maculis 2 anticis, 2 lateralibus. singula in singula costa et duabus longitudinalibus in dorso.*

*Alae anticae supra brunneae, fasciis quinque interruptis flavis, penultima denticulata transversa; posticae basi fuscae, apice fulvae maculis quatuor nigris lunatis inaequalibus. Subtus omnes fuscae fasciis et maculis eisdem.*

NOCTUA

**NOCTUA DIVERGENS:** *Cristata alis deflexis integris, anticis griseis: fasciis duabus fuscis signoque albo inscriptis; posticis flavis margine nigro.* FABRIC. Mantiss. Insect. Vol. 2. p. 162.

*Habitat in Lapponia* Prof. VINBOM, Dr. STRUVE; Mag. QUENSEL.

**NOCTUA LEUCOPTERA:** *Alis deflexis, anticis cinereis: fasciis tribus punctisque duobus nigris; posticis niveis.*

*Habitat in Suecia.*

*Magnitudine media.*

*Corpus totum laeve, cinereum.*

*Alae anticae* utrinque cinereae, supra fasciis quatuor nigris, 1 in basi interrupta, 2 ante medium undulata, 3 pone medium curva undata, 4 intra marginem obsoleta. Inter fasciam 3 et 4 punctum anterius minutum et macula posterius oblonga. *Posticae* utrinque totae niveae fascia tenuissima intra marginem e punctis nigris. *Alae posticae* basi ciliatae.

**NOCTUA MELALEUCA:** *Alis deflexis, anticis nigris cinereo-maculatis; posticis albis: margine nigro.*

*Habitat in Lapponia,* LILJEBLAD, EKHOLM, GROENDAL, QUENZEL.

*Inter minores Noctuas, capite et toto corpore hirto, pilis albis nigrisque griseo.*

*Antennae filiformes, setaceae, nigrae.*

*Alae anticae* supra nigrae, ciliatae, subundulatae fasciis obsoletis griseis et maculis tribus, longitudinaliter positis griseis, quarum posteriores sensim majores. Subtus basi villosae, fuscae, maculis obsoletis albis marginalibus. *Posticae* utrinque niveae, margine extimo nigro-irrorato, postico limbo lato, atro.

**NOCTUA MELANOPA:** *Alis deflexis, anticis nigris griseo-irroratis; posticis albis: macula marginique nigris.*

*Habitat in Lapponia, LILJEBLAD.*

*Similis omnino priori; sed alae posticae minus albae, basi et arcu medio nigris, ciliisque marginis postici niveis. Praeterea alae anticae non totae nigrae, sed albae, arcu medio et margine postico nigro.*

**NOCTUA LAPPONICA:** *Alis deflexis albidis, anticis fasciis quinque atris, posticis puncto arcuque duplici nigro.*

*Habitat in Lapponia, GROENDAL, Chirurg. Exp. ad Chinam Soc. Com. Suec.*

*Magnitudine N. Melaleuca.*

*Corpus totum hirtum pilis nigris albisque.*

*Thorax antice subcristatus, fascia atra albaque.*

*Antennae filiformi-setaceae, fuscae.*

*Alae anticae albae punctis minutissimis atris adpersae; fasciae quinque undatae nigrae, 1 in ipsa basi, 2 infra basin, 3 et 4 in medio interiori in margine approximatae, 5 intra marginem posticum; margo posticus denticulatus e maculis albis nigrisque; posticae alae totae fuscae margine magis nigricante. Omnes subtus albae puncto medio, arcu limboque latiori marginali nigris; margo posticus albo nigroque denticulatus in posticis, in anticis albus.*

**TORTRIX PENZIANA:** *Alis albis fusco-irroratis: fasciis tribus obliquis articulatis nigris.*

*Habitat in Sueciae meridionalibus Provinciis. Consiliar. D. PENTZ.*

*Tortrix Rosana paulo major et magis oblonga. Caput album, hirtum.*

*Palpi compressi, clavati, albi.*

*Alae*

*Alae anticae* oblongae, obtusae, supra albae lineolis fuscis irroratae; fasciae tres obliquae, atrae, subarticulatae articulis quadratis. Subtus fuscae, immacolatae, ciliatae. *Alae posticae* supra fuscae, subtus albae: margine exteriori fusco-maculato.

**TORTRIX RHENANA:** *Alis extus ferrugineis, intus albis fusco-irroratis: fascia communi maculaque duplici atra.*

*Habitat* in Blekingia. Dom. RHEN.

*Tortrice Rosana* paulo major.

*Antennae* filiformes, apice attenuatae, cinereae, capite thoraceque longiores.

*Palpi* compressi, clavati.

*Corpus et Pedes* albid.

*Alae anticae* extus ferrugineae, fusco-fasciatae, interiori margine niveae, nigro-irroratae. Ante medium fascia communis, atra, marginem exteriorem non attingens. Pone medium macula in singula ala obliqua, oblonga, atra, margines non attingens. *Alae posticae* supra fuscae, subtus versus marginem tenuiorem albae, versus crassiores fusco-irroratae.

*Differt a T. Hermanniana.*

**TORTRIX FIMBRIANA:** *Brunnea margine extimo niveo: fasciis punctisque brunneis.*

*Habitat* in Vestrogothia. Pastor BJERKANDER.

*Corpus* magnitudine T. Rosanae.

*Antennae* filiformes, brunneae, longitudine dimidia corporis.

*Palpi* ovati, porrecti, brunnei, subtus albid.

*Alae* supra brunneae margine exteriori linea lata, nivea, apicem alae non attingente: fasciae undulatae, subabruptae, binae et puncta sparsa brunnea; subtus fuscae margine albid.



**TORTRIX HIRUNDANA:** *Alis brunneis, dorso late niveis maculisque marginalibus.*

*Habitat in Suecia. BJERKANDER.*

*Corpus magnitudine T. Rosanae.*

*Caput, Antennae, Palpi ut in antecedenti.*

*Thorax antice brunneus, postice niveus, medio fascia nigra.*

*Alae in margine interiori late niveae punctis obsoletissimis; in exteriori brunneae, macula duplici baseos punctisque minutissimis subquaternis marginalibus albis; margo posticus fusco, alboque varius, ciliatus. Subtus alae fuscae, nitentes.*

**TORTRIX GROENDALIANA:** *Alis ferrugineis: fasciis argenteis maculisque decem luteis.*

*Magnitudine media.*

*Antennae, thorax, alae anticae subtus et posticae utrinque fuscae.*

*Alae anticae supra ferrugineae: fasciae transversae argenteo-plumbeae sex, ultima intra marginem maculari; praeterea maculae majores luteae, quinque in singula ala obtusa.*

**TORTRIX HALLIANA:** *Alis canis fusco-punctatis: macula baseos margineque exteriori brunneis.*

*Habitat in Suecia. D. Dr. HALL.*

*Magnitudine media, tota supra infraque argenteo-cana.*

*Antennae subfiliformes, fuscae, corpore duplo breviores.*

*Alae anticae supra punctis minutissimis fuscis irroratae, inprimis postice, obtusissimae; in basi singulae macula et margo exterior a medio ad apicem late ferrugineae, linea in media ala latissima. Subtus immacolatae, uti et posticae supra.*



TORTRIX GROSSANA: *Alis cinereis: fasciis duabus obliquis fuscis.*

*Habitat* in Vestrogothia, BJERKANDER.

*Magnitudine* T. hamanae.

*Caput* luteum palpis brevissimis.

*Antennae* fuscae, corpore quadruplo breviores.

*Thorax* fuscus, immaculatus; laevis.

*Alae* anticae obtusae, supra cinereo-albidae, striis tenuissimis undulatis fuscis irroratae: fasciae duae, latae, obliquae, dentatae, fuscae altera juxta basin, altera a medio margine externo ad angulum ani ducta, ubi saepe subbifida in medio valde angustata. Subtus uti alae posticae vtrinque fuscae, immaculatae.

*Abdomen et Pedes* cinerei.

Varietas occurrit capite nigro, fascia postica valde bifida, et colore alarum albidior.

DISSERTATIO  
DE  
INSECTIS SUECICIS.  
PARS III.

D. 9. MAJI 1792.

RESP.

JAC. ÅCKERMAN.

**B**OMBYX *ferrata*: alis reversis anticis fusco-cinereis: strigis duabus nigris; posticis albis ciliatis.

*Bombyx trepida*. FABR. Mant. vol. 2. p. 120.

*Habitat* in Vestrogothia. DN. LEONH. GYLLENHAL.

*Magnitudine B. vinulae*, tota hirsuta, cinereo-fusca.

*Antennae ferratae*, corpore dimidio breviores.

*Thorax* subcristatus, fascia lineisque duabus obsoletis nigris.

*Alae* incumbentes; *anticae* supra fusco-cinereae venis elevatis, hirtae, ad angulum ani falcatae: supra basin fascia undata nigra; ante medium alia undata, versus interiorem marginem obsoleta; pone hanc lunula nigra; in ipso margine et intra illum ordo punctorum oblongorum, nigrorum; subtus albido-fuscae, immaculatae. *Posticae* reversae, medio ciliato-ferra-

ferratae, supra albae, margine fusco et bifasciato; subtus albae.

*PHALAENA separata*: alis albo-canefcentibus: fasciis tribus duplicatis nigris, postica obliqua. *Phalaena separata*. Mus. Acad. Ups. P. 6. p. 75. c. fig.

*Habitat* in Suecia. Notar. DELEN.

*Magnitudine Ph. Wawariae paulo major.*

*Antennae setaceae.*

*Alae* patentes, canae; *anticae* medio albae, fasciis tribus nigris, duplici linea constantibus: prima in basi, secunda antenuato-acuta, marginem non attingens. Subtus canae, macula marginali alba. *Posticae* utrinque canae, immaculatae.

*PHALAENA ornata*: feticornis alis niveis, puncto medio margineque postico undato-fuscis. FABR. Mant. v. 2. p. 210.

*PHALAENA offeata*: feticornis alis albis obscurius undatis: puncto medio nigro, anticis costa ferruginea. FABR. Mant. v. 2. p. 211.

*PHALAENA strigata*: alis flavis apice fuscis, fasciis fuscis quatuor.

*Phalaena strigata*: Mus. Acad. Ups. P. 6. p. 75. c. fig.

*Habitat* in Gestricia, D. PRINTZ.

*Magnitudine Phalaenae emarginatae, tota pallide flava.*

*Antennae setaceae.*

*Alae* patentes, *anticae* flavae, *posticae* fuscae, fasciis circiter quatuor tenuibus, recurvis, fuscis, subtus obsoletioribus.

*PHALAENA transversata*: alis nigris: fascia lata media alba striga nigra interrupta punctoque in posticis albo.

Pha-

*Phalaena transversata*. Mus. Acad. Ups. P. 6. p. 75. c. fig.

*Habitat* in Vermelandia. D. HOLMER. in Gestricia, D. PRINTZ.

*Magnitudine et facie Phalaenae hastatae.*

*Thorax niger, marginibus pectoreque albis.*

*Antennae setaceae, fuscae.*

*Alae planae; Omnes supra nigrae maculis marginalibus albis. Pone medium fascia lata alba, in qua striga obsoleta fusca in anticis. In posticis macula simul alba pone fasciam; subtus potius albae, puncto, fascia media et margine postico late nigris. Ipse margo albo-maculatus.*

*PHALAENA paludata: alis canis: anticis fasciis quatuor nigris, tertia dentata, quarta reversa.*

*Phalaena paludata*. Mus. Acad. Ups. P. 6. p. 76. cum fig.

*Habitat* juxta paludes turfosas Vestrogothiae, D. GYLLENHAL.

*Magnitudine Phalaenae incanatae, tota cana.*

*Antennae filiformi-setaceae.*

*Alae planae: anticae supra fasciis quatuor nigris notatae, prima angustissima juxta basin; secunda ante medium parum undata; tertia pone medium magis dentata; quarta apicis lunata, abbreviata, obsoleta. Posticae supra immaculatae; subtus omnes rufescentes fascia punctoque fusco margineque albo maculato.*

*PHALAENA rhamnata: alis dentatis fuscescentibus: fascia media dentata obscuriore; lunula arta puncto strigaeque fuscis. FABR. Mant. v. 2. p. 198.*

*PHALAENA rubiginata: alis niveis: fasciis duabus ferrugineis, posteriore dimidiata: puncto subocellari atro. FABR. Mant. v. 2. p. 205.*

PHA-



*PHALAENA hexapterata*: alis fusco griseoque variis, posticis albis duplicatis. FABR. Mant. v. 2. p. 207.

Valde affinis *Phalaenae didymatae*, sed maxime distincta videtur alis spuriis, quas tamen vidi etiam in varietate quadam *Phalaenae ferrugatae*; an itaque haec nota tantum sexus differentia?

*PHALAENA myrtillata*: alis cinereis supra puncto fasciisque obsoletis fuscis.

*Phalaena Myrtillata*. Mus. Acad. Upf. P. 6. p. 75. Magnitudine fere *Ph. Papilionariae*, tota fusco-irrorata, macula nigra anticarum supra fasciisque obsoletis fuscis; intra marginem fascia albida, undulata.

*Alae* planae rotundatae, subtus omnes cinereae puncto fusco in medio.

*Antennae* setaceae, longitudine fere corporis.

*PYRALIS hamalis*: alis basi canis: macula fusca, apice nigris.

*Pyrallis hamalis*. Mus. Acad. Upf. P. 6. p. 76. cum fig.

*Habitat* in Vermelandia. D. HOLMER; in Finlandia D. HAST.

Paulo major *Pyralli purpurali*.

*Antennae* setaceae, cinereae, capite thoraceque longiores.

*Caput et Thorax* incana.

*Alae* deflexae, forficatae; *anticae* supra basin canae macula marginis exterioris oblonga, fusca; in medio albae, inde ad apicem nigrae.

*Posticae* basi albae puncto nigro, apice nigrae. Subtus similes paginae superiori.

*Abdomen et pedes* albida.

*PYRALIS margaritalis*: alis anticis pallide flavis, fasciis duabus puncto margineque postico fuscis;



fuscis; posticis albis. FABR. Mant. Inf. v. 2. pag. 218.

*Habitat* in pluribus Sueciae provinciis. D. WESTRIN et alii.

*Magnitudine* PYR. *forficalis*, cui similis.

*Caput*, *Thorax*, *Abdomen* albido-flavescentia.

*Antennae* setaceae, cinereae, longitudine dimidii fere corporis.

*Alae* deflexae, forficatae; *anticae* flavescentes, margine postico ferrugineo-fusco. Infra basin versus marginem externum, punctum minimum fuscum. Ante medium undatae facia tenui undata et alia pone medium subferruginea. Subtus margo extimus, posticus et punctum ferrugineum. *Posticae* supra albae, margine postico parum fusco; subtus concolores.

**TORTRIX** *chlorana*: alis hombeis, anticis viridibus; margine extimo albo. FABR. Mant. Inf. v. 2. p. 224.

*Magnitudine* et *facie* *Tortricis viridanae*.

*Caput* niveum, *antennis* subfiliformibus, cinereis.

*Thorax* viridis, *pectore* pedibusque albidis.

*Alae* deflexae, obtusissimae; *anticae* supra virides margine extimo, imprimis basi, albo; subtus viridi-albae. *Posticae* utrinque albae.

*Abdomen* supra fuscum, subtus album.

**TORTRIX** *Teatiana*: alis planis cinereis macula punctisque duobus centralibus nigris. FABR. Mant. v. 2. p. 235.

*Facies* depressa et habitus *T. heracleanae*.

*Palpi* obtusi, breves.

*Antennae* filiformes, corpore dimidio breviores, cinereae.

*Thorax*, *Abdomen* et *Pedes* cinereo-flava.

*Alae*

*Alae* incumbentes, truncatae, planae; *anticae* cinereo-flavescentes. tenuissime nigro-irroratae; in margine exteriori maculae quatuor nigrae, in medio puncta duo minuta, et unum majus nigra; in margine postico puncta minuta sex; subtus fuscescentia margine lutescente. *Posticae* fusco-plumbeae, ciliatae.

**TORTRIX** *applana*: alis depressis fusco-ferrugineis: punctis duobus ocelloque albo centralibus.

*Pyralis applana*? FABRIC. Mant. Inf. 2. p. 239. Facies et similitudo summa cum *T. Teatiana*, *Kaekeritziana* et *heracleana*, quae omnes, an specie differant, doceant posteriores observationes et imprimis metamorphosis.

*Supra* subferruginea, tota nigro tenuissime irrorata, subtus plumbeo-fusca, nitens.

*Alae* planae, incumbentes, *anticae* in margine exteriori et postico obsolete nigro-punctatae; ante medium puncta duo, minuta, nigra; pone haec ocellus albus cum puncto albo vix perspicuo.

**TORTRIX** *Sneathmanniana*: alis albidis: fasciis duabus obliquis ferrugineis, anteriore abbreviata, posteriore interrupta. FABR. Mant. Inf. 2. p. 278.

*Magnitudine* vix *T. Alstroemerianae*; tota supra albido-flavescent, subtus fusca, nitens.

*Palpi* porrecti.

*Alae* triangulares, postice sensim dilatatae, ciliatae. Arcus obliquus in medio dorso, margines exteriores non tangens, sed in margine macula ferruginea. Pone medium fascia obliqua e tribus maculis.

DISSERTATIO  
DE  
INSECTIS SUECICIS.

PARS IV.

D. 23. MAJI. 1792.

RESP.

CAR. FREDER. SEBALDT.

**S**PHINX *atropos*: alis integris, posticis luteis: fasciis fuscis: abdomine luteo: cingulis nigris. Fabr. Maut. Inf. 2. p. 95.

*Habitat* in Uplandia et alibi.

**BOMBYX** *hieracii*: alis subreversis atris. Fabr. Mant. Inf. 2. p. 116.

*Phalaena atra* Lin. Syst. anim. 12. p. 823.

*Habitat* extra Upsaliam et alibi.

*Habitus* et magnitudo *Tortricis* tota atra; alis plus vel minus pellucetibus rotundatis.

*Antennae* pectinatae.

*Corpus* totum hirtum.

**BOMBYX** *fusca*: alis patentibus fuscis, puncto medio fasciisque duabus atris.

*Habitat* in Lapponia. D. GRÖNDAL.

*Magnitudo* et *habitus Tortricis*, tota fusca.

*Antennae* bipectinatae radiis brevibus.

*Alae*

*Alae* omnes utrinque puncto atro in medio notatae. *Anticae* supra fasciis binis atris extra punctum. *Posticae* subtus pallidiores, tenuissime atro-irroratae.

**BOMBYX** *signata*: alis incumbentibus griseis linea atra ocelloque sesquialtero notatis.

*Habitat* in Vestrogothia. Cap. GYLLENHAL.

*Magnitudine* fere *B. Bucephalae* tota albido-grisea et hirsuta.

*Antennae* sensim attenuatae, pectinatae, radiis duplici serie fuscescentibus.

*Thorax* cristatus crista fuscescente.

*Alae* deflexae; *anticae* fusco-subundulatae et irroratae, basi linea nigra subduplicata: in medio macula minuta oblonga alba nigro-maculata; paulo pone medium macula alba cum lineola curva atra adjecta; margo obsolete nigro-punctatus; *subtus* cinereo-fuscae, macula in medio et marginalibus obscurioribus. *Posticae* pallidiores, sordidae macula atra in medio et punctis 6 marginalibus utrinque.

**BOMBYX** *pithyocampa*: alis reversis griseis: strigibus obscurioribus; posticis pallidis: puncto anali fusco. Fabr. Mant. Inf. 2. p. 114.

**NOCTUA** *linariae*: cristata alis deflexis fusco-cinereis, apice albo nigroque striatis, maculis ordinariis niveis. Fabr. Mant. 2. p. 169.

**NOCTUA** *italica*: laevis alis deflexis fuscis, strigibus ferrugineis maculaque transversa marginali alba. Fabr. Mant. 2. p. 144.

**NOCTUA** *sulphurago*: cristata alis deflexis flavis; punctis numerosis strigisque fuscis. Fabr. Mant. Inf. 2. p. 159.



**NOCTUA aurago:** cristata alis deflexis fuscescentibus litura baseos fasciaque media late flavis. Fabr. Mant. 2. p. 159.

**NOCTUA rutilago:** cristata alis deflexis flavis ferrugineo-strigosis fascia baseos apicisque fusca. Fabr. Mant. Inf. 2. p. 160.

**NOCTUA flavago:** cristata alis deflexis flavissimis: punctis fasciaque lata fuscis. Fabr. Mant. 2. pag. 160.

**NOCTUA arbuti:** cristata alis deflexis fuscis, posticis nigris fascia flava. Fabr. Mant. 2. p. 184. Syst. Ent. p. 619.

**NOCTUA porphyrea:** alis deflexis carneo luteoque variis, stigmatibus albis.

**Bombyx spreta?** Fabr. Mant. 2. p. 123.

**NOCTUA satellitia:** cristata alis deflexis dentatis brunneis, anticis puncto flavo inter puncta duo alba. Fabr. Mant. 2. p. 165.

**NOCTUA euphorbiae:** cristata alis deflexis cinereis fusco-undatis: maculis ordinariis anteriori orbiculata, posteriori reniformi albidis. Fabr. Mant. 2. p. 174. 114.

**NOCTUA jota:** cristata alis deflexis, anticis ferrugineo-griseis i resupinato aureo inscriptis. Fabr. Mant. 2. p. 163.

**NOCTUA strigula:** cristata alis deflexis rufescentibus albo nigroque striatis. Mus. Acad. Upsl. 6. p. 72. cum fig.

*Magnitudine media, hirsuta, tota rufescens.*

*Antennae setaceae.*

*Thorax cristatus, variegatus fascia purpurea.*

*Alae deflexae albo nigroque fasciatae et striatae; ocelli in medio duo praeter stigma posterius.*

*Subtus fusco-fuscescentes, immaculatae.*

*Pedes*



*Pedes* rufescentes annulis albis.

**NOCTUA** *carnea*: cristata alis deflexis, anticis carneis; stigmate flavicante; posticis arcu punctoque fusco. Mus. Acad. Upf. 6. p. 72. cum figura.

*Habitat* in Hallandia. Doct. OSBECK.

*Magnitudine* media, tota fusco-rubra.

*Antennae* setaceae.

*Palpi* appendiculati.

*Thorax* cristatus, hirsutus.

*Alae* anticae deflexae, rufescentes, ferrugineo-fasciatae. *Stigma* anterius cinereum, posterius flavescens; fascia cinerea intra marginem. Posticae pallidiores, supra immacolatae. Subtus puncto arcuque fusco.

*Pectus* valde hirsutum, fulvum.

**NOCTUA** *masoreta*: cristata cana, alarum disco litura punctisque nigris notato, Mus. Acad. Upf. P. 6. p. 72. cum figura.

*Magnitudine* inter minores, tota cana,

*Antennae* ferratae.

*Alae* incumbenti-deflexae; *anticae* supra utrinque in medio litura brevis atra, loco stigmati posterioris puncta nigra circiter quinque circulum formantia; in ipso margine puncta nigra obsoleta.

**NOCTUA** *ligustri*: cristata alis deflexis fusco virescentique variis, nigro subundatis; macula magna postica albida. Fabr. Mant. 2. p. 172.

**NOCTUA** *templi*: cristata alis deflexis obscure virescentibus; strigis undatis maculisque ordinariis flavescens.

*Noctua lucipeta*? Fabr. Mant. Inf. 2. p. 169.

*Habitat* in Hallandia. Doct. OSBECK.

*Magnitudine* N. psi.

*Antennae* filiformi-setaceae, longitudine capitis et thoracis.

*Thorax* cristatus, fusco-virescens.

*Alae* deflexae; *anticae* supra virescentes strigis undatis tribus vel quatuor obsoletis, maculisque ordinariis flavescenti-cinereis, quarum anterior minima, posterior reniformis. *Posticae* cinereae fascia fusca. Omnes subtus cinereo-flavescentes fascia media fusca.

*Pedes* cinerascetes, hirsuti.

**NOCTUA fontis:** alis deflexis nigris, anticis margine postico cinereis, punctis lineaque apicis nigris. Mus. Acad. Upf. P. 6. p. 72. c. fig.

*Habitat* in Hallandia, Doct. OSBECK; in Vermelandia. Lic. HOLMER.

*Magnitudine* et facie *Pyrallidis* majoris.

*Palpi* porrecti.

*Antennae* setaceae.

*Alae* deflexae; *anticae* supra antice brunneae, postice alidae: macula apicis obliqua, analis anguli, marginis exterioris et punctis minutis fuscis. *Posticae* supra fuscae; *subtus* omnes cinereae fascia fusca.

**NOCTUA cordigera:** cristata alis anticis nigris: fasciis undatis stigmatique albis; posticis flavis margine nigro. Mus. Acad. Upf. P. 6. p. 72. cum figura.

*Habitat* in Suecia meridionali. Lic. HOLMER.

*Magnitudine* inter minores.

*Antennae* setaceae.

*Caput et thorax* cristatus nigra.

*Alae* deflexae: *anticae* utrinque nigrae; basi macula marginalis, quadrata, albida; pone medium macula reniformis, alba; margo cinerascens fascia fusca: *subtus* macula albida. *Posticae* flavae margine late fusco utrinque.

PHA-

**PHALAENA fuscaria:** pectinicornis alis omnibus fuscis, anticis lunula nigra.

*Magnitudine* P. *chaerophyllatam* paulo superat. *Antennae* setaceae, pectinatae, radiis duplici serie brevibus, fuscis.

*Alae* omnes planae, fuscae: *anticae* in medio lunula nigra, margine cinereo maculato. *Posticae* dilutiores puncto obsoleto in medio; intra marginem fuscae, margine cinereo. *Subtus* concolores, dilutiores, puncto centrali obsoleto.

**PHALAENA circularia:** alis dentatis ferrugineis: fascia saturatiore; anticis margine maculis duabus lunulaque albis.

*Habitat* in Suecia. D. GEDNER.

*Facies* omnino P. *syringariae*, sed paulo minor.

*Antennae* pectinatae.

*Corpus* cinereo-ferrugineum, glabrum.

*Alae* planae, omnes dentatae, ferrugineae maculis obsoletis albis; fascia saturatior in formam circuli, angusta. In margine extimo maculae subtriangulares albae et prope apicem lunula alba. *Subtus* concolores.

**PHALAENA vittaria:** alis fuscis: fasciis duabus nigris repandis. Mus. Acad. Ups. P. 6. p. 74. cum figura.

*Habitat* in Gestricia. D. PRINTZ.

*Magnitudo* P. *Wawariae*, tota cinereo-fusca.

*Antennae* pectinatae, attenuatae.

*Alae* fuscae, patentes: *anticae* fasciis duabus undulatis nigris, altera ante, altera pone medium. *Margo* obsolete nigro-punctatus. *Subtus* omnes pallidiores, immaculatae.

**PHALAENA angularia:** alis albis nigro-irroratis: anticis puncto fasciisque tribus dentatis albis.

*Habitat* in Blekingia. D. RHÉN.

*Magnitudine* P. *atomariae*.

*Caput* album, nigro-maculatum.

*Antennae* in altero sexu pectinatae, in altero filiformi-fetaceae, albo-nigroque annulatae.

*Corpus* albidum, punctis nigris conspersum.

*Alae* planae; omnes albae, tenuissime nigro-irroratae; *anticis* punctum medium oblongum fasciaeque tres nigro-dentatae: prima ante medium, extus ramosa: secunda et tertia pone medium contiguae, in medio fere anastomofantes. *Ipsa* margo posticus nigro-dentatus.

*Subtus* concolores, sed obsoletiores. *Posticae* supra fere totae albae angulo ani et margine postico nigro-maculatis; *subtus* arcus punctumque nigrum.

*Pedes* nigri, albo-annulati.

PHALAENA *abruptaria*: alis cinereis: fascia obliqua punctoque minutissimo fusco.

*Habitat* in Suecia. D. GEDNER.

*Magnitudine* P. *Wawariae*.

*Antennae* fuscae, fetaceae, bipectinatae.

*Caput* et *thorax* cinerea.

*Abdomen* cinereum cingulis nigris.

*Alae* planae; omnes cinereae strigis vix perspicuis fuscis fasciatae: punctum in medio versus marginem exteriorem minimum nigrum, inque margine postico tria minutissima: fascia obliqua, latior, fusca, ab apice ad apicem oblique ducta, in anticis subabrupta. *Posticae* magis nigro-striatae ante fasciam latam. *Subtus* punctum in medio strigaeque punctorum nigrorum.

PHALAENA *sordaria*: alis albis fusco-irroratis: ocello fascia margineque punctato-nigris.

*Habi-*



*Habitat* in Gestricia. PRINTZ.

*Magnitudine* P. *Atomariam* superat.

*Antennae* cinereae, bipectinatae, setaceae.

*Caput, thorax, abdomen* cinerea.

*Alae* planae; omnes fordide albae, obsolete fusco-irroratae; ocellus coecus in medio versus marginem anteriorem: in margine extimo maculae binae: pone medium fascia obsoleta, undulata: in margine postico fascia e punctis circiter septem nigris. *Subtus* concolores, sed obsoletius fusco-undulatae.

*Similis* P. *punctariae* et *pendulariae*; sed major et fordide alba.

PHALAENA *zonata*: alis albis: fascia baseos apiceque nigris; posticis niveis.

*Habitat* in Uplandia. D. DELEN; in Westrogothia. P. BJERKANDER.

*Magnitudine* P. *Atomariae* vel paulo minor.

*Antennae* filiformi-setaceae.

*Thorax et Abdomen* fusco-alba.

*Alae* planae, omnes albae; *Anticae* supra prope basin fascia nigra et margo posticus late niger.

*Limbus* late albus, punctis minutissimis nigris irroratus. *Posticae* niveae. *Subtus* omnes albae puncto fusco.

PHALAENA *cognata*: alis fuscis: basi fascia lata media punctoque fuscis.

*Habitat* in Suecia meridionali.

*Magnitudo* et facies omnino P. *juniperatae*, cui simillima, licet diversa.

*Antennae* setaceae, uti totum corpus cinereae.

*Alae* deflexo-planae, omnes fuscescentes: *Anticae* supra prope basin litura transversa, pone hanc alia dentata, pone medium alia dentata, inter quas litura brevis et in apice litura



*transversa nigra. Subtus omnibus in medio arcus fuscus cum puncto minuto.*

*PHALAENA arundinata: alis basi albis fascia nigra; apice nigris. fascia undata alba.*

*Habitat in Vestrogothia. D. GYLLENHAL.*

*Paulo minor P. linnata.*

*Alae planae: anticae supra basi albae fascia in medio fere alae fusca obsoleta; a medio ad apicem nigrae, fascia undata, et striga intra apicem alba. Posticae totae, uti et omnes subtus, albae ultimo apice obsolete fusco.*

*Abdomen albidum.*

*PHALAENA corylata: alis cinereo-albis fasciis subternis dentatis punctoque fuscis.*

*Habitat in Finlandia. D. HAST; in Vestrogothia P. BJERKANDER.*

*Magnitudine P. triflatae et similitudo P. juniperatae, licet major et diversa.*

*Antennae filiformi-setaceae, cinereae.*

*Corpus album, nigro-irroratum.*

*Alae planae; anticae supra albidae vel fuscescentes; fasciae tres distinctae, latae: prima in basi striga alba divisa: secunda in medio, extus latior, dentata, in qua punctum nigrum: tertia in apice strigis variis undatis albis notata. Posticae albae apice fuscescentes. Subtus omnes albidae fascia punctoque nigris.*

*PHALAENA flavofasciata: alis albis: fasciis duabus flavescentibus litura albida divisis.*

*Magnitudo P. triflatae.*

*Antennae filiformi-setaceae, cinereae.*

*Thorax et abdomen cinereo-albida.*

*Alae planae, omnes albae; Anticae supra fascia obsoleta prope basin; in medio fascia lata, dentata, extus latior, flavicans; intra apicem fascia*

fascia flavescent, dentata, litura undata alba terminata. *Margo* posticus albo-flavoque dentatus. *Posticae* albae. *Subtus* omnes bifasciatae.

*PHALAENA pupillata*: alis fuscis medio ferrugineis: strigis undatis albis, ocello duplici, altero pupillato.

*Phalaena pupillata*. Mus. Acad. Upf. P. 6. p. 75.

*Habitat* in Gestricia. D. PRINTZ.

*Magnitudine* *Phalaenae atomariae*.

*Alae* plano-patentes. *Anticae* nigrae, medio subferrugineo-fuscae: strigis pluribus undatodentatis albis, quarum tres imprimis magis exstantes; apice fuscae striga e punctis albis obsoleta; *margo* posticus albo-maculatus. In medio ocelli duo, quorum extimus pupillatus. *Posticae* basi albae, fusco-undulatae, apice nigrae striga alba margineque albo-maculato. *Subtus* omnes concolores.

---

DISSERTATIO  
DE  
INSECTIS SUECICIS.

PARS V.

D. IO. MAJI 1794.

RESP.

ISAACUS HAIJ.

**H**ISTER AENEUS: elytris basi striatis apice punctatis. Fabric. Syst. Entom. p. 53. Mant. inf. vol. I. p. 33.

*Habitat* in Suecia. Notar. Delén.

Semine Secalis latior et paulo brevior, totus ater, nitidus.

*Thorax* politus lateribus papillofis.

*Elytra* polita basi, apice et lateribus papillosa seu punctata; stria unica juxta suturam et in margine exteriori tres brevissimae, tenuissimae,

HISTER ELONGATUS: piceus lineari-oblongus, elytris striatis.

Hister oblongus Fabric. Entom. System. p. 75.

Hister parallelipedus. Herbst.

*Habitat* in Suecia meridionali.

*Magnitudine* et forma similis H. ferrugineo, sed totus piceus, nitidus, depressiusculus.

*Antennarum* clava ferruginea.

*Ely-*

*Elytra* apice et pedes imprimis picei.

*Striae* Elytrorum Sex, longitudinales.

HISTER DEPRESSUS: depressus, ater, nitidus elytris extus striatis. Fabric. Mant. inf. vol. I. p. 32. Entom. Syst. p. 74.

*Habitat* in Suecia.

*Statura* et magnitudine *H. ferruginei*, sed magis depressus, totus ater, nitidus, pedibus et antennarum clava piceis.

*Striae* Elytrorum tres in singulo margine externo. intra apicem desinentes.

HISTER PUNCTATUS: piceus elytris obsolete striatis, pedibus ferrugineis.

*Habitat* in arenosis Westrogothiae tempore vernali. Gyllenhal.

*Magnitudine* dimidia Tritici seminis.

*Corpus* totum laeve, piceum, quadratum.

*Pedes* magis rufescentes.

*Striae* Elytrorum quatuor, obsoletae, brevissimae, vix dimidiam elytrorum longitudinem attingentes.

HISTER FLAVICORNIS: ater, convexus, elytris oblongis laevissimis, antennarum clava ferruginea.

Hister flavicornis *Herbst*.

*Habitat* in Blekingia D. Gedner et Rhén: In Smolandia sub cortice pinuum emortuorum Sam. Törner. In Suecia Printz.

*Magnitudine* parum excedit *H. pygmaeum*. totus oblongus, convexus, nitidus, laevissimus absque striis, ater, sola clava antennarum ferruginea.

*Pedes* picei.

HISTER GLABRATUS: supra aeneo-niger nitens, subtus ater, elytris striato-punctatis. Fabric. Entom. Syst. p. 73.

*Magni-*



*Magnitudine H. unicoloris mediocris, totus glaber, supra nitidus, aeneus, convexus.*

*Caput, Thorax, Elytra aeneo-nigra.*

*Abdomen et pedes atrii.*

*Thorax valde marginatus.*

*Elytra punctato-striata, abdomen fere aequantia, truncata.*

*Striae punctatae plures, tenuissimae.*

**HISTER ABBREVIATUS:** ater elytris striatis: inferioribus striis abbreviatis. Fabric. Entom. Syst. p. 75.

*Corpus H. unicolore quadruplo minus, totum atrum, nitidum, pedibus paulo magis piceis.*

*Thorax marginatus.*

*Elytra in singulo margine externo striata striis tribus longitudinalibus: has inter et futuram utrinque striae duae abbreviatae, sic ut ab apice vix ad medium Elytri versus superiora ducantur.*

**HISTER QUADRISTRIATUS:** ater, nitidus pedibus piceis, elytris basi striis quatuor abbreviatis postice punctatis.

*Habitat in Blekingia. RHEN.*

*Magnitudine fere H. brunnei, totus ater, nitidus, pedibus apiceque Elytrorum piceis.*

*Thorax tenuissime punctatus.*

*Elytra tenuissime punctata, basi et margine exteriori striis quatuor obliquis abbreviatis.*

**HISTER CAESUS:** niger thorace sulco transverso, antennis ferrugineis. Fabric. Entom. Syst. p. 77.

*Habitat in Westrogothia GYLLENHAL.*

*Pulice minor, niger seu piceus, politus.*

*Thorax transversim sulcatus.*

*Elytra absque striis.*

*Similis D. psyllii.*



**HISTER FERRUGINEUS:** ferrugineus, oblongus elytris striatis.

*Habitat* in Nericia Smaraeus. In Westrogothia GYLLENHAL. in Germania Schneider.

*Magnitudine* fere *H. depressi*, lineari-oblongus, totus ferrugineus, glaber.

*Elytra* tenuissime striata: striis sex longitudinalibus.

*Differt* ab *H. brunneo*: 1. quod oblongus.

2. elytris magis abbreviatis.

**HISTER SINUATUS:** ater elytris macula media lunata rubra. Fabric. Entom. Syst. p. 75.

Hister 4 maculatus Linn. Fn. Suec. p. 147. n. 443. α.

*Magnitudine* *H. unicoloris*, totus excepta macula elytrorum lunata rubra, ater, nitidus.

*Thorax* marginatus stria intra marginem.

*Elytra* margine utrinque striis tribus longitudinalibus, valde abbreviata.

**ELOPHORUS NUBILUS:** griseus thorace elytrisque sulcato-rugosis. Fabric. Spec. Inf. p. 77. Mant. p. 43.

*Habitat* hic inde in domibus.

*Dimidio* minor *E. aquatico*, cui valde similis et cujus forsan mera varietas.

**ELOPHORUS FLAVIPES:** niger thorace sulcato, elytris striatis pedibusque testaceis. Fabric. Entom. Syst. p. 205.

*Satis* vulgaris in aquis Uplandiae et aliarum Provinciarum.

*Decuplo* minor *E. aquatico*, cui simillimus.

*Thorax* sulcatus, cinereus, fuscus vel viridinaeus.

*Elytra* testacea, punctato-striata, plerumque maculis duabus vel tribus fuscis.

*Pedes* pallidi.

ELOPHO-

**ELOPHORUS ELONGATUS:** niger, thorace punctato, elytris porcatis. Fabric. Entom. Syst. p. 204.

*Magnitudine* E. flavipedis seu pulicis, totus niger, thorace interdum virescente.

*Thorax* foveis 5 impressis.

*Elytra* costis elevatis notata, interque has lineae duae punctorum impressorum.

**ANTHRENUS VERBASCI:** niger elytris fasciis tribus undatis albis. Fabric. Entom. Syst. p. 264.

**ANTHRENUS PIMPINELLAE:** niger elytris fascia alba apicē ferrugineis: litura alba. Fabric. Entom. Syst. p. 263.

**OPATRUM SULCATUM:** nigrum thorace laevi, elytris striatis.

*Opatrum* agricola. Fabr. Entom. Syst. p. 91.

*Pediculo* majus, subcylindricum, fusco-ferrugineum.

*Thorax* laevis, marginatus.

*Elytra* postice deflexa, obtusa, sulcata sulcis punctatis.

*Antennae* et pedes rufescentes.

**BYRRHUS ATER:** oblongus, niger immaculatus. Fabric. Entom. Syst. p. 85.

*Magnitudine* et facie B. pilulae, sed totus sordide niger, laevis, glaber, immaculatus.

*Striae* elytrorum tenuissimae, obsoletae.

**BYRRHUS VARIUS:** viridi-aeneus, elytris lineis abruptis atris.

*Magnitudine* Coccinellae 2-punctatae, totus fusco-cinereus, nitens.

*Thorax* fusco-aeneus, immaculatus.

*Elytra* viridi-aenea lineis pluribus interruptis atris.

**BYRRHUS PULVERULENTUS:** fusco-ferrugineus, tomentosus elytris lineis abruptis nigris.

*Duplo*

*Duplo minor B. vario, totus imprimis supra tomentosus, fuscus.*

*Elytra notata sunt lineolis abruptis nigris.*

BYRRHUS MINUTUS: ater pedibus rufescentibus.

*Habitat in Suecia. Capit. PFEIF.*

*Pediculi magnitudine totus ater, nitidus, pedibus rufescentibus.*

*Elytra tenuissime et vix conspicue striata.*

BYRRHUS CINCTUS: fusco-ferrugineus, thorace nigro-maculato, elytris fascia undata nigra.

*Magnitudine et statura B. pilulae, totus subtus piceus, supra fuscus flavescenti-tomentosus.*

*Thorax in medio punctis aliquot nigris confluentibus maculatus.*

*Elytra tenuissime striata, costa nigra et in medio fascia communis undata nigra, nullibi marginem exteriorum attingens.*

BYRRHUS FASCIATUS: tomentosus fuscus, elytris fascia undata rufa. Fabric. Entom. Syst. pag. 85.

*Magnitudine fere B. pilulae et summa similitudine, etiam lineolis obsoletis abruptis nigris, totus tomentosus, fuscus.*

*Elytra in medio dorsi fascia transversa albida vel rufescente, margines exteriores attingente.*

*Thorax vel fuscus, vel albidus macula fusca.*

BYRRHUS DORSALIS: tomentosus, nigricans elytris macula communi rufescente. Fabric. Entom. Syst. p. 85.

*Duplo minor B. pilula, totus tomentosus, fuscus.*

*Thorax ferrugineo-maculatus.*

*Elytra in medio dorso macula sublunata rufescente, punctis albis cincta.*

**BYRRHUS ALBO-PUNCTATUS:** tomentosus, niger elytris in medio fasciatis ex ordine duplici undulato punctorum alborum.

*Magnitudine* B. dorsalis ejusque summa similitudine, totus tomentosus, niger.

*Thorax* obsolete ferrugineo-variegatus.

*Elytra* in medio dorso notantur arcu bis lunulato ex serie duplici punctorum alborum minutissimorum.

**NITIDULA PUSILLA:** fusca, thoracis dorso, fascia elytrorum, antennis pedibusque rufis.

*Magnitudine* et statura N. colon, laevis, fusca.

*Antennae* et pedes tota ferruginei.

*Thorax* rufus margine tenuissime nigro.

*Elytra* fusca plaga rufa, seu rufa margine exteriori, apice et regione scutelli fuscis, truncata, abdomine breviora.

**NITIDULA AENEA:** viridi-aenea antennis pedibusque nigris. Fabric. Entom. Syst. p. 261.

*Habitat* in Blekingia. RHEN.

*Pulice* vix major, exceptis antennis et pedibus nigris tota viridis, polita, laevissima.

**NITIDULA VIRIDESCENS:** viridi-aenea pedibus rufis.

*Omnino* similis praecedenti, exceptis solis pedibus rufis.

*Forfan* prioris sola sexus varietas.

**NITIDULA 4-GUTTATA:** fusca elytris quadriguttatis.

*Magnitudine* N. colon, tota fusca, laevis.

*Thoracis* margo exterior vix manifeste pallidus.

*Elytra* truncata, abbreviata, nigra: macula flava, parva in costa et alia major, subtransversa intra apicem.

*Pedes* et antennae flavescentes.



**NITIDULA IO-GUTTATA:** fusca thoracis margine elytrorumque maculis decem pallidis. Fabr. Ent. Syst. p. 258.

*Habitat* in Blekingia. RHEN.

*Inter* minores seu minor N. 2-pustulata tota glabra fusca.

*Thorax* marginalibus lateralibus et puncto baeseos flavis.

*Elytra* margine flavescentia, absque striis tenuissime subpunctata, maculis in singulo quinque pellucidis, 2, 1, 2 flavescentibus.

**NITIDULA OBSCURA:** nigra. opaca pedibus pallidis. Fabric. Entom. Syst. p. 255.

*Silpha* rufipes? Linn. Syst. p. 573.

*Inter* minores, vix pediculo major, tota supra fusca laevis, opaca. pedibus pallidis.

**NITIDULA VILLOSA:** pubescens, ferruginea elytris laevibus.

*Habitat* in Finlandia TÖRNER.

*Magnitudine* et summa affinitate N. *Pubescentis*, tota ferruginea et tenuissime pubescens, laevis absque striis Elytrorum, punctis impressis vix conspicuis.

**NITIDULA MARGINATA:** fulcata thorace margine, elytris margine discoque maculis ferrugineis. Fabr. Entom. Syst. p. 256.

*Habitat* in Kinnekulle. Gedner.

*Inter* majores, magnitudine Cimicis, tota ferruginea et tenuissime villosa.

*Thorax* in medio nigro maculatus.

*Elytra* fulcata atomis variis atris.

*Similis* valde N. *verbasci*, sed villosa et quadruplo major, elytris fulcatis.

**NITIDULA LIMBATA:** nigra thoracis elytrorumque margine ferrugineis.

*Habitat* Calmariae. Magist. Wahlbom.

*Inter* minores, vix pulice major, oblongiuscula, laevis, fusca.

*Thoracis* margo, elytrorum limbus exterior et pedes ferruginei.

**NITIDULA VERRASCI:** fusca, laevis thoracis elytrisque margine lineola baseos fasciaque apicis fulvis.

*Nitidula* strigata. Fabr. Entom. Syst. p. 257.

*Media* seu magnitudine Coccinellae 2-punctatae laevis, fusca.

*Thoracis* margo anticus et laterales flavescentes.

*Elytra* margine flava absque striis; prope basin lineola flexuosa et punctum minutum, intra apicem fascia flexuosa flava.

*Pedes* flavescentes.

**NITIDULA SORDIDA:** laevis, fusca thoracis margine elytrisque maculis sparsis ferrugineis. Fabr. Entom. Syst. p. 258.

*Habitat* in Kinnekulle. Gedner.

*Paulo* minor *N. marginata*, tota fusca, opaca, laevis absque striis et vix manifeste villosa.

*Thoracis* margo ferrugineus. pellucens.

*Elytra* notantur maculis aliquot sparsis rufis.

*Similis* *N. Marginatae*, sed laevis, tota fusca et minor.

**SILPHA GRANULATA:** atra thorace antice truncato, elytris punctatissimis: lineis tribus elevatis abbreviatis.

*Habitat* in Suecia. PERIFF.

*Magnitudine* *S. atrata* superat, tota atra.

*Thorax* antice truncatus. vix excisus. postice lobato-rotundatus, tenuissime punctatus.

*Ely-*

*Elytra* rotundata, frequentissime punctata, costis tribus elevatis politis laevibus apicem non attingentibus, exteriori breviori.

*Os* rufescens.

SILPHA LAPPONICA: atra thorace pectoreque albo-tomentosis, elytris clathratis.

*Habitat* in Lapponia Doct. LILJEBLAD.

*Statura* et magnitudine *S. ruogfæ* vel paulo major. tota atra.

*Caput*, pectus et thorax tomentosa villo albido.

*Thorax* excisus, postice rotundatus, punctis nigris in tomento translucentibus.

*Elytra* postice parum excisa, in medio costis tribus elevatis integris abbreviatis, inter quas series quadruplex nodorum elevatorum.

*Abdomen* fuscum tomento vix conspicuo.

---

L.

DISSERTATIO  
DE  
INSECTIS SUECICIS.  
PARS VI.

D. 3. DEC. 1794.

RESP.

SAMUEL KINMANSON.

**S**ILPHA SINUATA: atra thorace scabro, elytris postice sinuatis. Fabr. Entom. Syst. I. p. 252.  
*Magnitudine media, tota atra, depressiuscula, opaca.*

*Caput cinereo-pubescent.*

*Thorax nodis elevatis scaber, tenuissime pubescens.*

*Elytra glabra, lineis tribus elevatis costata, apice extus sinu excavata.*

**HYDROPHILUS ORBICULARIS:** subrotundus, ater, glaber. Fabr. Entom. Syst. I. p. 184.

*Duplo minor H. Scarabaeoide, et magis globosus, totus aterrimus, laevis, politus.*

**HYDROPHILUS TRUNCATELLUS:** ovatus, ater thoracis margine postico ferrugineo, elytris abbreviatis.

*Habitat in Vestro Gothia. GYLLENHAL.*

*Magni-*



*Magnitudine* pulicis, oblongus, totus laevis ater. antennis, angulo postico thoracis pedibusque piceis.

*Elytra* truncata, abdomine breviora.

*Facies* Gyrini, sed antennae perfoliatae.

HYDROPHILUS AFFINIS: ovatus luridus, thorace fusco.

*Habitat* Upsaliae; in Vestro-Gothia. GYLLENH.

*Magnitudine* pediculi, ovatus, convexus, laevis, totus luridus capite thoraceque nigris.

HYDROPHILUS BICOLOR: ovatus, supra flavescent, subtus ater. Fabr. Entom. Syst. I. p. 184.

DYTISCUS PORCATUS: oblongus, niger thoracis elytrorumque margine externo flavo, elytris sulcatis glabris.

*Habitat* in Uplandiae aquis, rarior.

Paulo minor *D. marginali*, sed major *D. sulcato*, totus glaber, niger, exceptis marginibus thoracis et elytrorum lateribus flavis.

*Elytron* singulum 10-sulcatum, sulcis glabris abbreviatis.

Differt a *D. marginali* thorace, cujus latera tantum externa flavescent.

DYTISCUS FUSCUS: fuscus, thoracis margine flavo, elytris transverse subtilissime striatis. Fabr. Entom. Syst. I. p. 189.

*Magnitudine* fere *D. striati*, a quo differt imprimis striis elytrorum longe tenuioribus, et thorace magis fusco.

DYTISCUS AGILIS: niger, ore thorace elytrorum margine pedibusque ferrugineis. Fabr. Entom. Syst. I. p. 194.

*Habitat* in aquis Uplandiae, et alibi vulgaris.

Unguem longus et planus, fuscus.

*Thorax* ferrugineus, postice parum niger.

*Elytrorum* margo exterior ferrugineus.

**DYSTICUS NOTATUS:** fuscus thorace flavo: punctis quatuor nigris, elytrorum stria suturali tenuissima. Fabr. Ent. Syst. I. p. 195.

*Habitat* cum priori, vulgaris.

Ejusdem magnitudinis et staturae cum *D. agili*, cui valde similis.

*Thorax* ruber, punctis quatuor nigris transversis, quorum intermedia saepe coalita.

**DYTISCUS RIPUNCTATUS:** ater thorace flavo: punctis duobus nigris, elytris flavo fuscoque variis. Fabric. Ent. Syst. I. p. 192.

*Magnitudine* et statura *D. agilis*, laevissimus.

*Thoracis* puncta duo transversa.

*Elytra* flavescentia, fusco-irrorata.

**DYTISCUS FENESTRATUS:** supra ater, subtus ferrugineus, elytris maculis duabus albidis. Fabr. Entom. Syst. I. p. 192.

*Habitat* in Uplandiae aquis, vulgaris.

*Magnitudine* dimidia *D. striati*, convexus, politus, supra aterrimus, subtus piceus.

In basi capitis puncta duo rubra.

*Maculae* duae albae in singulo elytro, altera fere in medio prope marginem exteriorem linearis, altera intra apicem lunulata.

**DYTISCUS FULIGINOSUS:** ater capite punctis duobus sanguineis, thoracis elytrorumque lateribus flavescentibus. Fabr. Entom. Syst. I. pag. 191.

*Magnitudine* et statura *D. fenestrati* et *uliginosi*, quibus valde similis, ater, politus.

*Caput* ore et punctis duobus rubris.

*Thoracis* Elytrorumque margines laterales albidoflavescents.

**DYTISCUS CONGENER:** ater elytris piceis, margine pallidiore.

*Habitat* in aquis Uplandiae, vulgaris.

*Duplo* minor *D. uliginoso*, oblongus, politus.

*Caput* atrum punctis duobus sanguineis.

*Thorax* ater, immaculatus.

*Elytra* fusca seu picea margine pallidiore, immaculata.

**DYTISCUS PLANUS:** oblongus, depressus, piceus tibiis rufis. Fabr. Ent. Syst. I. p. 195.

*Habitat* in Uplandiae aquis; Calmariae WAHLBOM.

*Magnitudine* vix seminis *Oryzae*, depressus, oblongus, politus, fuscus seu piceus, margine elytrorum parum pallidiore.

*Tibiae* rufescentes, femoribus piceis.

**DYTISCUS NIGRITA:** ater antennis pedibusque ferrugineis. Fabr. Entom. Syst. I. p. 201.

Inter minimos, vix pediculo major, oblongus, convexus, ater, politus.

*Antennae* et pedes rufescentes.

**DYTISCUS PICIPES:** niger thorace flavo-maculato, elytris flavo-lineatis. Fabr. Entom. Syst. I. pag. 196.

*Habitat* in Uplandiae aquis. DOM. DILLÉN.

*Magnitudine* Seminis *Oryzae*, oblongus, totus fuscus vel niger.

*Thorax* maculis flavis sparfis.

*Elytra* margine lineisque plurimis, tenuissimis, abruptis flavescentibus.

**DYSTICUS LINEATUS:** ferrugineus elytris fuscis: lineis flavis obsoletis. Fabric. Entom. Syst. I. pag. 200.

Inter minimos magnitudine vix pulicem superat, ovato-oblongus, convexus, totus ferrugineus.

*Elytra* fusca lineis flavescentibus, diaphanis, obsoletis, in singulo circiter quatuor, quarum

exterior intra marginem longitudine elytri;  
reliquae breviores.

**DYTISCUS IMPRESSUS:** flavescens, elytris punctis  
impressis subocellaribus. Fabr. Entom. Syst. I.  
pag. 199.

Inter minores. magnitudine pediculi, oblongus,  
antice angustior, convexus, flavescens.

*Elytra* flavescenti-fusca, pulcherrime striata,  
punctis nigris impressis subocellaribus.

**DYTISCUS DORSALIS:** oblongus, niger capite  
thoracis margine elytrorumque puncto baseos  
et margine rubris. Fabric. Ent. Syst. I. p. 196.

*Magnitudine* feminis *Oryzae*, oblongus, niger.  
Rubra sunt os, margines thoracis et elytrorum,  
puncta duo transversa in thorace, et punctum  
unicum distinctum, rotundum in singuli ely-  
tri basi.

**IPS SANGUINICOLLIS:** atra thorace elytrorum-  
que maculis duabus pedibusque rufis.

*Mycetophagus Sanguinicollis.* Fabr. Entom.  
Syst. I. p. 498.

*Habitat* in Vestro-Gothia, CAPIT. GYLLENHAL.

**IPS 4-MACULATA:** oblonga, atra elytris striatis:  
maculis quatuor rubris.

*Habitat* in Vestro-Gothia, GYLLENHAL; in  
Scania, QUENSEL.

*Magnitudine* et statura I. 4-*pustulatae*, tota atra.

*Elytra* punctato-striata, maculis quatuor san-  
guineis, ut in 4-*pustulata*.

**IPS FUNGORUM:** ovata, punctata thorace flavo,  
capite elytrisque violaceis.

*Tetratome fungorum.* Fabr. Ent. Syst. I. p. 507.

*Habitat* in Scania, QUENSEL.

Paulo minor I. *haemorrhoidali*, cui valde simi-  
lis, ovata, subcylindrica, punctata.

*Caput*



*Caput* nigro-violaceum.

*Thorax* et *pectus* rufescentia.

*Abdomen* postice et *pedes* picei.

*Elytra* absque striis violacea.

DERMESTES CARNIVORUS: niger, elytris antice testaceis, abdomine albo. Fabr. Ent. Syst. I. p. 55. Mant. p. 34.

*Habitat* Upsaliae.

DERMESTES TRIFASCIATUS: ovatus, niger elytris fasciis tribus undatis cinereis. Fabr. Entom. Syst. I. p. 228.

*Habitat* in Suecia. CAPIT. PFEIFF.

*Magnitudine* D. pellionis, facie omnino Anthreni.

*Thorax* postice cinereus.

*Elytra* fasciis tribus undatis, et puncto apicis cinereis, villosis notantur.

DERMESTES ATOMARIUS: niger, elytris punctis fasciisque postica fulvis.

Mycetophagus atomarius. Fabr. Entom. Syst. I. pag. 498.

Valde similis D. maculato, cujus forsan sola varietas; totus ovatus, convexiusculus, tenuissime subvillosus, totus fusco-niger.

*Elytra* postice fascia flexa, saepe ex tribus punctis flavis constans, apice puncto et majori in basi praeter tria vel quatuor in medio sparsa, remota.

*Pedes* flavescentes.

DERMESTES MULTIPUNCTATUS: niger elytris punctis numerosis fulvis.

Mycetophagus multipunctatus. Fabr. Entom. Syst. I. p. 498.

Ips atomaria. Mus. nat. p. 116.

Ovato-oblongus, ater, convexus, punctis plurimis elytrorum inaequalibus, saepe confluentibus, pellucidis, flavis.

DER-

DERMESTES BICINCTUS: niger elytris fasciis  
durbus punctoque apicis ferrugineis.

Mycetophagus 2-fasciatus. Fabr. Entom. Syst. I.  
pag. 500.

Culice vix major, laevis, ater.

*Elytra* in basi fascia ex punctis tribus saepe distinctis. alia pone medium et puncto apicis fulvis, diaphanis.

DERMESTES 4-MACULATUS: niger elytris punctis duobus rufis.

Mycetophagus 4-maculatus. Fabr. Ent. Syst. I.  
pag. 497.

*Habitat* in Suecia, DELEN

*D. maculato* minor, convexus, fuscus, antennis pedibusque pallidioribus.

*Elytra* fusca, substriata, punctis duobus in singulo flavis, altero in costa. altero intra apicem.

DERMESTES PUNCTATUS: niger, politus elytris  
basi thoraceque rufis.

Mycetophagus punctatus. Fabr. Entom. Syst. I.  
pag. 499.

*Magnitudine* et facie *D. maculati*, convexus, niger.  
*Thorax* piceus seu rufescens.

*Elytra* nigra, basi rufa raro intra apicem puncto rufo.

*Pedes* rufescentes.

DERMESTES NIGRICORNIS: flavus antennis fuscis.  
Mycetophagus nigricornis. Fabr. Entom. Syst. I.  
pag. 499.

*Tenebrio pallens*? Linn. Faun. Suec. p. 225.

*Habitat* Upsaliae; in Blekingia. Dom. RHEN.

*Magnitudine* *Seminis Oryzae*, totus flavo-testaceus, convexus, laevis, oculis solis nigris.

DERMESTES TESTACEUS: oblongus, ferrugineus  
abdominis basi oculisque nigris. Fabr. Ent.  
Syst. I. p. 233.

Paulo

Paulo minor *D. nigricorni*, convexus, ferrugineus totus, exceptis oculis basique abdominis nigris.

DERMESTES MACELLARIUS: niger, glaber pedibus piceis. Fabr. Entom. Syst. I. p. 228.

*Habitat* Upsaliae in domibus et fenestris.

*Simillimus* *D. pellioni* sed absque punctis albis elytrorum; totus ater pedibus, imprimis tibiris, antennis et ore fuscis seu piceis.

Forſan ſola varietas *D. pellionis*.

DERMESTES FUMATUS: oblongus, tomentosus, cinereo testaceus oculis nigris.

*D. Fumatus* et tomentosus. Fabr. Ent. Syst. I. p. 231 et 232.

*Vulgaris* in Uplandia et alibi, in hortis.

*Corpus* oblongum, convexus, totum pilis testaceis virescenti-fuscis tectum, magnitudine feminis *Oryzae*.

*Oculi* ſoli nigri.

Utraque ſpecies Fabricii non niſi varietates ſunt vel ſexu differunt.

DERMESTES FIMETARIUS: oblongus, niger, nitidus, pedibus ferrugineis. Fabric. Entom. Syst. I. p. 231.

*Pulice* minor, elytris poſtice piceis.

DERMESTES UNIDENTATUS: oblongus, testaceus thorace unidentato. Fabr. Ent. Syst. I. p. 232.

*Habitat* vulgaris ſaepe in domibus.

DERMESTES LONGICORNIS: oblongus, fuscus thorace fovea impreſſa.

*Habitat* in domibus.

*Similis* priori magnitudine pediculi, fuscus.

*Thorax* in medio fovea impreſſa.

*Elytra* et thorax vel fuſca vel picea.

DERMESTES CORDATUS: oblongus, fuscus thorace trifulcato.

Tene-

*Tenebrio minutus?* Linn. Syst. p. 675.

*Pulice minor, fuscus.*

*Thorax* obcordatus angulis anticis acutis, trifurcatus, marginibus elevatis.

DERMESTES CELLARIS: ovatus, fuscus thorace crenato. Fabr. Entom. Syst. I. p. 234.

*Habitat* Upsaliae; in Vestmannia HALL; in Blekingia, RHÉN.

*Magnitudine* pulicis oblongus, laevis, fuscus vel testaceus.

*Thorax* rufescens, interdum subcrenatus.

*Elytra* quandoque basi rufescunt.

DERMESTES SERRA: ater antennis flavis: clava ferrata. Fabr. Entom. Syst. I. p. 234.

*Habitat* Upsaliae et alibi; in Blekingia, RHÉN.

*Magnitudine* seminis oryzae, ovatus, convexus, ater, exceptis antennis et pedibus flavis, politus.

*Antennarum* clava latere altero filia, ferrata.



DISSERTATIO  
DE  
INSECTIS SUECICIS.

PARS VII.

D. 22. DEC. 1794.

RESP.

GUST. MAGNUS WENNER.

**T**INEA SPARGANELLA: ferrugineo - aurea, alis punctis tribus fuscis.

*Habitat* in Vestrogothia, Bjerkander.

*Paulo* minor *T. culmellae*, cui similis, sed magis obtusa, facie Tortricis et tota aureo - ferruginea, nitens, lineis tenuibus albidis. In margine tenuiori puncta tria, fusca, saepe obsoleta, longitudinaliter digesta in singula ala. *Alae* subtus fuscae.

*Palpi* corniformes.

TINEA ANGULELLA: flavescenti - fusca puncto in medio alae nigro.

*Habitat* in Ostrogothia, Pfeif; in Vestmannia, Hall.

*Magnitudine* et facie *T. sparganellae*, postice obtusa et facie Tortricis, tota ferrugineo - flavescenti; *margo exterior* basi fuscus et paulo pone medium in pagina media alae superioris punctum nigrum.

*Palpi*

*Palpi porrecti.*

*Subtus tota pallidior.*

*Variat colore magis flavo vel fulvo.*

**TINEA ARIDELLA:** flavescenti-cinerea linea fasciisque fuscis.

*Magnitudine et facie T. culmellae*, tota cinerea in medio alarum linea fusca; intra apicem fascia flexuosa et in ipso margine puncta aliquot nigra. *Alae inferiores* albae, immaculatae.

**TINEA ABRUPTELLA:** alis nigro-fasciatis lineisque: linea abrupta ramosa.

*Magnitudine et facie T. culmellae.*

*Palpi porrecti*, subtus nigri, supra albi.

*Antennae attenuatae*, corpore breviores.

*Alae superiores* nigro-irroratae et ramoso-lineatae; intra marginem fascia curva et ipse margo niger ciliis albo nigroque dentatis; in medio linea lata abrupta, alba, postice ramosa inque ipso apice macula alba. *Alae inferiores* albae, immaculatae.

**TINEA FERRUGINELLA:** fusco-ferruginea, immaculata alis postice plicato-striatis.

*Magnitudine et facie T. culmellae*, tota fusco-ferruginea, immaculata.

*Palpi porrecti*, capite longiores.

*Antennae* parum setaceo-attenuatae.

*Alae superiores* postice plicato-striatae et margine externo pallido; *subtus* fuscae marginibus pallidis.

**TINEA DEALBELLA;** argenteo-fusca linea marginali mediaque ramosa argentea nitida.

*Magnitudine et facie T. pratellae.*

*Palpi porrecti*, cinerei, capite longiores.

*Antennae* supra albae, subtus fuscae.

*Alae*

*Alae superiores ex argenteo-fuscae; nitentes: margo exterior argenteus et in medio linea, postice ramosa, ramis liberis divaricatis argenteis; margo posticus ciliatus, immaculatus.*

**TINEA HAMELLA:** cinereo-fusca linea medio hamata argentea, margine postico punctato.

*Magnitudine et facie T. culmellae.*

*Palpi porrecti, capite paulo longiores.*

*Antennae cinereae.*

*Alae superiores externe fuscae, dorso cinereae; in medio linea argentea, medio hamum exferens, postice abbreviata; intra marginem posticum linea fracta punctis quatuor nigris in plicis, et in ipso apice macula fusca intra maculam argenteam.*

**TINEA NEMORELLA:** cinerea, albo-lineata puncto utrinque nigro.

*Habitat in Vestrogothia, Gyllenhal et alibi.*

*Paulo minor T. culmella, alis apice caudato-divaricatis.*

*Palpi porrecti, spina in medio erecta.*

*Antennae filiformes, annulatae, longitudine dimidia corporis.*

*Alae cinereo-flavescentes, albo-striatae seu ad marginem externum fuscescentes lineis ramosis argenteis, dorso pallidiore. In medio dorso versus marginem tenuiorem puncta duo nigra et versus posticum plura minutissima, sparsa.*

**TINEA OPPOSITELLA:** atra alis maculis duabus oppositis albis.

*Alucita oppositella? Fabr. Ent. Syst. 3. p. 344.*

*Minuta alis plano-convexis, duplo minor T. minutella Linnaei, tota atra exceptis punctis duobus pone medium transversis in alis su-*

perioribus et annulis albis abdominis pedumque.

*Palpi corniformes.*

*Antennae dimidio breviores alis ciliatis.*

*Differt a T. minutella colore atro et maculis albis.*

**TINEA FORFICELLA:** ferruginea linea marginali, puncto et fascia obliqua fuscis.

*Habitat in Suecia meridionali; in Ostrogothia, Westrin; in Westmannia, Stickman.*

*Magnitudo et facies T. culmellae:*

*Palpi porrecti, longitudine capitis et thoracis.*

*Antennae tenuissime pectinatae, palpis paulo longiores.*

*Alae superiores ferrugineae: intra marginem exteriorem linea, pone medium punctum et ab apice externo ad dorsum ducta linea obliqua fusca, ut in P. forficali; intra marginem posticum ciliatum puncta aliquot nigra. Alae inferiores albidae.*

**TINEA CUPRELLA:** alis cupreo-aureis, capite thoraceque hirsutis, antennis longissimis.

*Facie omnino T. Frischellae, subcylindrica.*

*Antennae setaceae, nigrae, apice albae, corpore duplo longiores.*

*Caput et thorax atra, valde hirsuta.*

*Alae totae cupro-aureae, nitidae, apice ciliatae.*

*An Alucita Cuprella? Fabric. Ent. Syst. 3. p 342.*

**TINEA ERXLEBELLA:** antennis mediocribus, alis anticis aureis, posticis purpureo-aureis, capite fulvo.

*Alucita Erxlebella. Fabr. Ent. Syst. 3. p 340.*

*Facie omnino T. Frischellae, sed fere major.*

*Antennae setaceae, fuscae, apice albidae, longitudine corporis.*

*Caput*



*Caput* hirsutum, fulvum.

*Thorax* aureo-nitens.

*Alae superiores* totae cupreo-aureae, nitidae, margine externo versus apicem cupreo-purpurascente, immaculatae, apice ciliatae; *inferiores* purpureae, auro nitentes margine imprimis extimo aureo.

*Corpus* nitidum.

*Pedes* fusco-fasciati, nitentes.

TINEA STRIGILELLA: fusco-aurea alis superioribus fascia argentea, capite fulvo.

*Habitat* in Suecia, D. Gedner.

*Similis* omnino *T. cinctellae*, sed decies minor, non-atra, opaca sed aureo-fusca,

*Caput* omnino fulvum.

*Alae superiores* postice et inferiores undique valde ciliatae.

TINEA SPARMANNELLA: alis auro-purpureoque variegatis nitidis. Fabr. Ent. Syst. 3. p. 324.

*Habitat* in variis Sueciae provinciis.

*Alae superiores* aureae maculis majoribus minoribusque variegatis caeruleis vel purpureis; *inferiores* fuscae, ciliatae.

TINEA FLAVIFRONTILLA: alis anticis cinereis immaculatis, capite fulvo.

*Vulgaris*, pelles et plumas in domibus destruens cum *T. pellionella*.

*An* varietas *T. pellionellae*?

TINEA 4-GUTTELLA: alis nigris; punctis duobus longitudinalibus niveis.

*Minuta*, tota sordida, fusca macula alba in singulae. *Alae superioris* medio et alia in apice.

*Apices* alarum uti et *inferiores* ciliatae.

*Differt* a *T. atrella* punctis longitudinaliter positis altero in medio, altero in apice alae.

**TINEA 6-GUTTELLA:** alis cinereis: punctis duobus aureis unoque niveo oblique transversis. *Minuta*, tota cinereo-fusca, argenteo-nitens. *Antennae* annulatae, filiformes, corpore breviores.

*Alae superiores* apice dilatatae, erecto-exstantes, ciliatae; in medio dorso prope marginem anteriorem macula aurea, paulo posterius in medio alae alia aurea et pone hanc in margine exteriori macula alba; omnes parvae; Apice elevatae, ciliatae.

**TINEA PENICILLA:** alis plumbeis: apice penicillato-plumosis.

*Habitat* in Suecia, Delén.

*Minima* magnitudine vix pulicis, tota supra plumbea, ipso apice ciliato et fusco.

*Antennae* brevissimae.

**TINEA FARINELLA:** farinaceo-nivea immaculata.

*Similis* *T. argentellae*, sed minime nitida, verum farinacea, immaculata; alis superioribus subtus et inferioribus totis fuscis, nitidis.

*Antennae* cinereae.

*Abdomen* et pedes fuscescentes.

**TINEA THORACELLA:** flava thorace punctis tribus alisque fasciis duabus fuscis.

*Habitat* in Suecia, Delén.

*Magnitudine* pediculi, convoluta alis postice valde ciliatis.

*Caput*, *thorax* et *alae superiores* flavae. In thorace puncta tria fusca; in alis superioribus fasciae binae, fuscae, transversae, altera prope basin, altera in medio.

**TINEA AUROPUNCTELLA:** fusca alis punctis tribus aureis alternantibus.

*Magnitudine* dupla pediculi, tota fusca, aureo-nitens.

*In alis superioribus prope basin fascia transversa aurea; in medio juxta marginem interiorem macula et alia intra apicem aurea, majuscula.*

**TINEA PAYKULLELLA:** alis purpureis: fasciis tribus aureis.

*Habitat in Vestrogothia, Gyllenhal.*

*Minuta, vix T. calthella major.*

*Alae superiores totae purpureae seu auro-rufae, nitentes, margine ciliatae: fasciis tribus aureis, transversis; una intra basin, altera in medio, tertia intra apicem. Alae inferiores fuscae, immacolatae, ciliatae.*

*Pedis et abdomen fusca uti et antennae.*

**TINEA BIMACULELLA:** alis fuscis: maculis duabus aureis apicis dorsaliq.

*Media, facie Tortricis.*

*Alae superiores fuscae, obsolete aureo-nitentes.*

*Macula magna communis in medio dorso aurea, et alia magna intra apicem.*

*Caput, thorax et omnia subtus fusca.*

**TINEA GYLLENHALELLA:** purpurea fascia punctisque decem aureis.

*Habitat in Vestrogothia, Bjerkander.*

*Minuta, oblonga.*

*Caput villosum, rufum.*

*Antennae purpureo alboque annulatae, corpore paulo breviores.*

*Thorax fuscus, antice et loco scutelli flavescens.*

*Alae superiores deflexae, totae purpureae seu brunneae, punctis minutissimis aureis micantes, apice ciliatae; Ante medium fascia obliqua, communis, aurea; in medio marginis exterioris macula elongata, triangularis: in margine interiori paulo pone medium macula communis; pone hanc in margine externo*

alia, linearis, et in ipso apice prope marginem tenuiorem strigae binae parvulae.

*Abdomen* album annulis nigris.

*Pedes* albi, nigro-irrorati.

*Fascia* prima interdum interrumpitur.

**TINEA GLEICHELLA:** alis planis atris: fascia media maculisque duabus oppositis argenteo-albis. Fabr. Ent. Syst. 3. p. 323.

*Vix* major *T. cryptella* seu inter minimas.

*Alae superiores* atrae: fascia in medio alba, transversa, communis; intra apicem puncta duo opposita in singula ala ut in *T. oppositella*.

*Palpi* corniformes.

*Corpus* fuscum, nitidum, uti et *alae inferiores*.

**TINEA BLANCARDELLA:** alis auratis: lineola strigisque marginalibus argenteis. Fabr. Ent. Syst. 3. p. 427. Clerk. Icon. III. fig. 8.

*Habitat* in Vestrogothia, Bjerkander.

**TINEA FORSTERELLA:** alis fusco-auratis: arcu dorsali lineolisque marginalibus quinque argenteis, apice macula atra argenteo-pupillata. Fabr. Ent. Syst. 3. p. 329.

*Habitat* in Vestrogothia, Gyllenhal.

*Pedes* nigri argenteo-annulati.

*Alae inferiores* fuscae.

**TINEA STIGMATELLA:** oblonga, alis linearibus ferrugineis: macula costali alba. Fabr. Ent. Syst. 3. p. 304.

*Habitat* hinc inde in pluribus provinciis.

**TINEA ATRELLA:** fusca, plana tota nigro-irrorata, alis ciliatis, subtus albida. Mus. P. 6. pag. 78.

*Inter* minores. Tota supra atra, albido-irrorata; subtus albidior, nitida.

*Anten-*



*Antennae* filiformes, corpore breviores, albo-annulatae.

*Palpi* corniformes.

*Alae superiores* planae, apice ciliatae, tenuissime irroratae nigro-alboque, apice subpunctato.

*Omnia* subtus albida, fusco-irrorata, nitidiuscula.

**TINEA ATROPUNCTELLA:** nigra, punctis alarum sex atris. Mus. P. 6. p. 78.

*Magnitudo*, *statura* et *facies* *T. Evonymellae*, tota nigra punctis tribus atris in singulo elytro longitudinaliter positis, excepto abdomine postice flavescente.

**TINEA OBSCURELLA:** alis obscure fuscis nitidulis immaculatis. Fabr. Ent. Syst 3. p. 312.

*Habitat* in Vestrogothia, GYLLENHAL.

**TINEA VIDUELLA:** alis atris: fasciis albis media abrupta, capite thoraceque albis. Fabr. Ent. Syst 3. p. 299.

*Habitat* in Sueciae pluribus provinciis, etiam meridionalibus.

*Palpi* corniformes, albi.

*Antennae* nigrae.

*Caput* niveum.

*Thorax* albus maculis atris.

*Alae atrae* fasciis tribus albis, prima et ultima ob iquis, media abrupta; margo ciliatus albus; *inferiores* atrae.

*Pedes* atris, albo-annulati uti et abdomen.

**TINEA VIRGELLA:** alis anticis cinereis: fasciis quatuor atris, posticis atris, capite albo.

*Habitat* in Suecia, sat vulgaris.

*Similis* *T. viduellae*, sed magis angustior.

*Palpi* corniformes, albi.

*Antennae* annulatae, corpore paulo breviores.

*Caput* album, thorace nigro maculato.

*Alae superiores* cinereae, nigro-irroratae; fasciae quatuor atrae distinctae, prima et ultima obliqua, mediae duae transversae; *margo ciliatus*, nigro-punctatus.

*Abdomen* et pedes atri, albo-annulati.

**TINEA SULPHURELLA:** alis anticis auratis: maculis duabus sulphureis, posticis flavis.

*Alucita* sulphurella. Fabr. Ent. Syst. 3. p. 343.

*Magnitudine* et facie *T. Degerellae*.

*Palpi* corniformes, antennaeque mediocres, fuscae.

*Alae anticae* fusco-auratae: in medio dorso macula lutea, in margine extremo minor; saepe a costa linea brevis abbreviata, lutea; *inferiores* luteae, apice fuscae, ciliatae.

**TINEA OCULELLA:** fusco-cinerea: linea nigra terminata oculo albo.

*Habitat* in Suecia; in Vestmannia, Hall.

*Inter* majores, alis subforficatis, *Pyrilidis* facie, tota fusca, fuliginosa, villosa.

*Palpi* porrecti, corniformes, breves.

*Antennae* fuscae.

*Alae superiores* fuscae, inprimis versus marginem exteriorem; a costa ad medium linea nigra, terminata oculo pupilla alba; *margo* posticus niger ciliis cinereis; *alae subtus* fusco-glaucescentes.

*Corpus* nigrum.

*Caput* interdum album.

**TINEA FAGELLA:** alis griseis: strigis atomisque nigris.

*Habitat* in Blekingia, Rhen.

*Magnitudine* *T. unguicellae*, tota cinereo-albida, punctis atomisque nigris irrorata; alis alterius sexus postice angustatis, subcaudatis.

*Palpi* corniformes.

*Anten-*

*Antennae* annulatae, corpore breviores.

*Alae* notantur in basi lineola atra; in medio litura V latino simili cum punctis duobus a latere externo et pone hanc litura obliqua nigra.

*Pedes* annulati.

*Variat* magis vel minus punctis nigris irrorata et characteribus exstantibus.

**TINEA FUNGELLA:** alis superioribus cinereis maculis punctisque nigris irroratis, inferioribus fuscis.

*Habitat* in Suecia sat vulgaris; in Blekingia, Rhen. *Facie* et similitudine summa *T. Boletellae*, sed duplo minor, alis convexis, deflexis.

*Palpi* corniformes.

*Antennae* fuscae, obsolete annulatae, corpore triplo breviores.

*Caput* et apices palporum lutescentes.

*Alae superiores* cinerae, totae irroratae maculis subquadratis et punctis nigris plurimis; in margine externo maculae sunt majores et subfasciatae.

*Alae inferiores* fuscae, immacolatae, nitidae.

*Corpus* cinereum.

*Pedes* annulati.

**TINEA ATOMELLA:** cinerea, fusco-irrorata: arcu in medio nigro.

*Noctua lanceolata?* Fabr. Ent. Syst. 3. p. 53.

*Habitat* in Suecia vulgaris.

*Inter* majores, facie *Tortricis*, sed alis non truncatis, verum sublanceolatis, rotundatis.

*Tota* cinerea punctis minutissimis irrorata. In media pagina alae superioris pone medium arcus niger et margo posticus nigro-punctatus. Praeterea saepe in costa lineola atra, quandoque fracta.

*Alae inferiores* cinereo-fuscae, immaculatae.  
*Palpi* porrecti, breves.

TINEA LATERELLA: alis anticis cinereo-albidis: lituris punctisque nigris, thorace linea utrinque nigra.

*Habitat* in Suecia, Pfeif; in Vestrogothia, Bjerkander.

*Facie*, magnitudine et similitudine *T. picarellae*, oblonga.

*Palpi* corniformes, breves.

*Antennae* fuscae.

*Caput* et thorax hirsuta, alba: linea utrinque in thoracis lateralibus atra.

*Alae superiores* alidae, cinereo-maculatae irrorataeque; in costa lineola atra, alia abbreviata versus marginem internum, et curva paulo posterius. In margine externo puncta aliquot magis distincta nigra. *Margo* ciliatus. *Subtus* alae superiores et inferiores totae fuscae, nitentes.

*Corpus* et pedes cinerei, nitentes.

TINEA BINOTELLA: cinereo-fusca alis punctis duobus atris.

*Magnitudine* et *statura* *T. juniperellae*, oblonga, planiuscula, tota cinereo-fusca, nitidula.

*Palpi* corniformes.

*Alae superiores* in medio notantur puncto atro et alio intra apicem quasi ex duobus conflato.

TINEA AXILELLA: cinereo-fusca alis, axilla puncto hamoque nigris.

*Similis* priori. tota cinereo-fusca seu cinerea nigro tenuissime irrorata; in singula ala superiori ipsa basis costae lineola atra, in medio lineola seu punctum obliquum, et pone medium hamulus ater.

*Subtus*



*Subtus* omnia cinereo-albida, alis inferioribus glaucis, nitidulis, ciliatis.

**TINEA TRINOTELLA**: alis cinereis punctis tribus nigris.

*Habitat* in Vestrogothia. Bjerkander.

*Media*, tota cinerea, vix maculata.

*Alae superiores* cinereo-flavescentes: in singulo paulo ante medium puncta duo, transversa, atra, interiore majore, et pone medium solitarium. Oculo armato alae videntur punctis tenuissimis nigris irroratae. *Alae inferiores* ciliatae.

*Tibiae* valde pilosae.

*Caput*, *thorax* et omnia *subtus* cinerea.

*A T. tripunctella* Fabr. diversa.

**TINEA PARIPUNCTELLA**: cinerea alis punctis sex nigris per paria digestis.

*Habitat* in Ostrogothia, Westrin.

*Media* vel inter minores, plana, cinerea.

*Antennae* annulatae, corpore breviores.

*Palpi* corniformes.

*Alae superiores* notantur in basi, medio et pone medium pari punctorum atrorum, transverse collocatorum et praeterea margo exterior et apex notantur punctis nigris. *Alae inferiores* glaucae, ciliatae.

*Tibiae* annulatae.

**TINEA TETRAPUNCTELLA**: alis albis punctis duobus nigris, margine apiceque fuscis.

*Habitat* in Vestrogothia, Gyllenhal.

*Inter minimas* tota cinereo-alba.

*Palpi* corniformes, fusci.

*Antennae* albo-annulatae, corpore breviores.

*Alae superiores* albidae margine externo postice fusco, uti et apice ciliato; prope costam videtur punctum oblongum, obsoletum; in medio

medio versus marginem externum punctum nigrum minutum et aliud in media pagina pone medium. *Alae inferiores* valde ciliatae. *Pedes* fusco-cinerei.

**TINEA STANNELLA**; plumbea, immaculata capite fulvo.

*Magnitudine* et facie *T. padellae*, plumbea capite fulvo.

*Antennae* fuscae, corpore breviores.

*Alae* supra nitentes, immaculatae; subtus obscuriores.

**TINEA DENTICULELLA**: purpurea falcia alarum maculisque tribus argenteis.

*Habitat* in Suecia, Gedner.

*Inter* minores, tota purpurea; in alis superioribus fasciâ in media curva et maculae tres argenteae, quarum duae in margine externo, una in interno, oblongae vel subtriangulares.

*Margo* posticus latior, ciliatus.

*Alae inferioris* fuscae, ciliatae.

*Antennae* fuscae, longitudine fere corporis.

**TINEA MARGINELLA**: alis griseis: margine crassiori albo, palpis plumosis. Fabr. Ent. Syst. 3. pag. 297.

*Habitat* in Vestrogothia, Gyllenhal.

*Magnitudine* *T. albellae*, cinereo-fusca, oblonga.

*Antennae* filiformes, fuscae, corpore breviores.

*Palpi* porrecti, plumosi, spina erecta.

*Caput* albidum.

*Alae superiores* fusco cinereae: *margo exterior* ad medium usque albus; ipse *margo posticus* albidus uti et apex antice. In media pagina puncta duo nigra.

*Differt a T. albella*, quod dimidia pars marginis antici tantum alba sit.

DISSERTATIO  
DE  
INSECTIS SUECICIS.

PARS VIII.

D. 13. DEC. 1794.

RESP.

JONAS KULLBERG.

**T**RITOMA BICOLOR: rufa elytris postice nigris. Hypophlaeus bicolor. Fabr. Entom. Syft. I. p. 501.

Linearis, oblonga, convexa, tota rubra exceptis. *Elytris* dimidiis postice et apice abdominis atris.

TRITOMA 2-PUSTULATA: fusca, glabra elytris puncto rubro.

Lyctus 2-pustulatus. Fabr. Entom. Syft. I. pag. 503.

*Habitat* in Blekingia, Rhen.

Linearis, polita, fusco-ferruginea.

*Elytra* truncata, intra apicem puncto pallido diaphano.

TRITOMA CONTRACTA: ferruginea, polita elytris striatis: sutura atra.

Lyctus contractus. Fabr. Ent. Syft. I. p. 505.

Similis priori, sed tota rufa elytris striatis, sutura atra.

TRI-

**TRITOMA PICIPES:** laevis, nitida, castanea antennis nigris.

*Hypophlaeus castaneus.* Fabr. Entom. Syst. I. pag. 500.

*Habitat* in Blekingia, Rhen.

Tota laevis striis elytrorum obsoletis, brunnea, lineari-oblonga.

**TRITOMA PALLIPES:** nigra, depressa antennis pedibusque piceis.

*Habitat* in Suecia et in India Orientali.

*Magnitudine* pediculi, atra, depressa, elytris manifeste striatis, antennis pedibusque solis rufescentibus.

**TRITOMA RUFIFRONS:** atra fronte, maculis duabus elytrorum pedibusque ferrugineis.

*Ips* rufifrons. Fabr. Ent. Syst. I. p. 514.

An *Tenebrio linearis*? Linn.

**TRITOMA SULCATA:** atra pedibusque ferrugineis, elytris sulcatis.

*Colydium elongatum* et filiforme. Fabr. Entom. Syst. I. p. 495. 496.

*Habitat* in Vestrogothia, Gyllenhal.

**TRITOMA STERCOREA:** tota ferruginea elytris striatis.

*Habitat* in Blekingia, Rhen.

Linearis, glabra, tota ferruginea.

*Thorax* obsolete punctatus.

*Elytra* striata.

**SPHAERIDIUM FERRUGINEUM:** globosum, ferrugineum elytris striatis Fabr. Ent. Syst. I. p. 80.

*Corpus* globosum, magnitudine pediculi.

*Elytra* punctato-striata.

**SPHAERIDIUM RUBRUM:** oblongum, ferrugineum elytris laevibus.

*Habitat* in Gestricia, Printz.



*Corpus* magnitudine pediculi, oblongum, laeve, glabrum, totum rubrum seu brunneum.

*Elytra* laevia absque striis et punctis.

SPHAERIDIUM MARGINATUM: laeve, atrum elytrorum margine pedibusque ferrugineis. Fabr. Ent. Syst. I. p. 80.

*Habitat* in Smolandia, Hay.

Paulo minus *S. Scarabaeoide*, laeve, atrum, margine extimo elytrorum et pedibus piceis.

SPHAERIDIUM MORIO: atrum, holosericeum totum. Tritoma morio. Fabr. Ent. Syst. I. p. 507.

*Magnitudine* pulicis, atrum totum, sed supra tenuissime villosum.

SPHAERIDIUM RUFIPES: atrum, glabrum elytris striatis, pedibus rubris.

*Habitat* in Blekingia, Rhen.

*Magnitudine* pulicis, globosum, atrum, glabrum.

*Elytra* valde striata.

*Pedes* rubri.

SPHAERIDIUM GLOBOSUM: globosum, atrum thorace rufo. Fabr. Ent. Syst. I. p. 78.

*Habitat* rarius in Suecia inventum.

SPHAERIDIUM HUMERALE: atrum, glabrum elytris macula baseos rubra. Fabr. Ent. Syst. I. pag. 79.

*Habitat* Upsaliae in ligno putrido.

*Corpus* globosum, glabrum, atrum thoracis margine, elytrorum basi, abdomineque rubris.

Variat elytris nigris et abdomine piceo.

SPHAERIDIUM PLAGIATUM: pallidum, laeve plaga suturali nigra.

*Habitat* in Vestrogothia, Gyllenhal; in Gestricia, Printz.

*Magnitudine* pulicis luteo-fuscum, laeve, glabrum, basi elytrorum et futura nigra.

SPHAE-

**SPHAERIDIUM NIGRIPENNE:** rufum, nitidum elytris atris, antennis fuscis. Fabr. Entom. Syst. I. p. 82.

*Corpus* magnitudine pulicis, globosum, involutum, laeve, nitidum, totum rubrum, exceptis elytris atris et antennis fuscis.

**SPHAERIDIUM RUFICOLLE:** atrum, nitidum thorace pedibusque anticis rufis. Fabric. Ent. Syst. I. p. 82.

Simile priori, totum laeve, oculis, elytris, abdomine atris; pedibus, thorace; capiteque rufis.

**SPHAERIDIUM FLAVIPES:** atrum elytris apice pedibusque rufis. Fabr. Ent. Syst. I. p. 81.

*Habitat* in Suecia; in Vestrogothia, Gyllenhal. *Magnitudine* pediculi, totum glabrum, laeve, atrum, elytris intra apicem puncto rufo, pedibus piceis.

**SPHAERIDIUM BICOLOR:** supra atrum subtus piceum, elytris glabris laevibus: puncto rubro intra apicem. Fabr. Ent. Syst. I. p. 82.

Simillimum *S. Flavipedi*, a quo vix distinctum nisi abdomine rubro

**SPHAERIDIUM 2-PUSTULATUM:** subvillosum, atrum macula humerali pedibusque rubris.

*Corpus* pulicis magnitudine, hemisphaericum. subvillosum, atrum humeris solis et elytris rufis. *Elytra* laevia.

**SPHAERIDIUM BIPUNCTATUM:** atrum, laeve puncto elytrorum baseos pedibusque rufis.

*Habitat* in Suecia; in Vestrogothia, Gyllenhal. *Magnitudine* pulicis, hemisphaericum, laeve, totum atrum puncto in singulo elytro intra basin pedibusque rufis.

**SPHAERIDIUM TRITOMA:** atrum, globosum elytris macula humerali coccinea.

Tri-

*Tritoma* 2-pustulata. Fabr. Ent. Syst. I. p. 505.  
*Habitat* in Vestrogothia, Gyllenhal.  
 Subglobosum, glaberrimum, atrum costa ely-  
 trorum coccinea.

*SPHAERIDIUM IPS*: atrum, oblongum costa ely-  
 trorum coccinea.

*Ips* 2-pustulata. Fabr. Ent. Syst. I. p. 511.  
 Simile *Sph. Tritomae*, sed corpus oblongo-li-  
 neare, glabrum, atrum costa elytrorum coccinea.

*CASSIDA MARGARITACEA*: viridi-flavescent, pun-  
 ctata capite pectoreque nigris. Fabric. Ent.  
 Syst. I. p. 297.

*Magnitudine C. nobilis* luteo-virescent, pun-  
 ctata capite pectoreque solis nigris.

*CASSIDA FLAVEOLA*: supra lutescent, subtus atra  
 margine abdominis flavo.

*Habitat* in Vestrogothia, Gyllenhal.  
 Similis priori, sed abdomen, pectus, oculi atrii,  
 margine abdominis flavescent.

*CASSIDA PALLIDA*: flavescent, punctata oculis  
 nigris.

*Habitat* Upsaliae.

Similis prioribus, sed paulo major, tota ex-  
 ceptis oculis flava.

*CASSIDA EQUESTRIS*: viridis elytrorum basi striga  
 argentea, abdomine atro: margine pallido.  
 Fabric. Ent. Syst. I. p. 292.

*Habitat* Upsaliae, in Hortis.

Paulo major *C. viridi*, cui similis, sed abdomen  
 margine flavescit.

*CASSIDA VIBEX*: virens futura sanguinea. Fabr.  
 Ent. Syst. I. p. 293.

*Habitat* Upsaliae rarior.

Similis *C. viridi*, sed distincta futura rufa.

CASSIDA BRUNNEA: brunnea margine elytrorum rufo.

Cassida limbata Fabr. Ent. Syst. I. p. 294.

Habitat Upsaliae et alibi.

Magnitudine C. viridis, tota fusco-brunnea, margine rufo.

Elytra punctata.

CASSIDA FERRUGINEA: supra ferruginea, subtus nigra, elytris punctatis costatis.

Cassida ferruginea. Fabr. Mant. p. 62. Spec. Inf. p. 108. Ent. Syst. I. p. 294.

Habitat in Suecia sat frequens.

Magnitudine superat C. nobilem, tota supra ferruginea, immaculata; subtus atra.

Elytra punctata et lineis elevatis costata.

CASSIDA AFFINIS: elytris virescentibus nigro punctatis. Fabr. Ent. Syst. I. p. 293.

Habitat vulgaris in Hortis.

Similis omnino C. nebulosae, excepto colore viridi et elytris inprimis postice magis nigro punctatis.

CASSIDA MURRAEA: supra rubra, subtus nigra elytris nigro maculatis. Fabr. Ent. Syst. I. p. 294.

Habitat in Vestrogothia; Gyllenhal.



# DISSERTATIO DE INSECTIS SUECICIS.

PARS IX.

D. 20. MAJI 1795.

RESP.

STENO EDVARDUS WESTMAN.

**A**NTHRENUS FASCIATUS: supra niger thorace elytrorumque fascia cinerea.

Habitat in Suecia rarior.

*Magnitudine* reliquis duplo major.

Cinereo - tomentosa sunt caput, antennarum clava, abdomen, pedes, thorax, et fascia elytrorum ante medium. *Elytra* nigra, laevia.

SCYMNUS ATER: totus ater ano rufescente.

*Anthrenus ater.* Mus. Acad. P. 3. p 34.

*Magnitudine* pulicis, totus ater, glaber, ano solo parum rufescente.

SCYMNUS AURITUS: ater capite thoracis angulis anticis ano pedibusque flavis.

Habitat in Vestro-Gothia. GYLLENHAL.

*Magnitudine* minimi pulicis, ater, glaber.

Caput, thoracis anguli antici, pedes anusque flavi.

SCYMNUS BIPUSTULATUS: ater elytris intra apicem puncto rubro.

H 2

Altica

*Altica 2-punctata.* Mus. Acad. P. 3. p. 42.

*Magnitudine* pulicis, torus ater excepto puncto rubro intra apicem singuli Elytri.

**SCYMNUS BIMACULATUS:** ater elytris basi puncto pedibusque rubris.

*Habitat* in Uplandia; in Vestro-Gothia. GYLLENHAL.

*Facie et magnitudine* prioris, ater, glaber.

*Caput et pedes* flavescentes.

*Elytra* in basi puncto rubro rotundo notata.

*Variat* capite nigro et flavo.

**SCYMNUS SUTURALIS:** ater plaga sanguinea.

*Magnitudine* pulicis, ater, glaber.

*Elytra* plaga lata, sanguinea; seu potius rubra margine omni nigro.

**COCCINELLA ABBREVIATA:** elytris rubris: fascia postica abbreviata punctisque duobus nigris; thorace atro: margine lineisque duabus albis. Fabr. Syst. 3. p. 269.

*Habitat* in Suecia rarior.

*Magnitudine* C. 7-punctatae.

*Fascia* abbreviata pone medium Elytrorum ex punctis duobus coalitis, cruribus apicem spectantibus. Punctum terminale intra apicem.

**COCCINELLA SEX-MACULATA:** elytris luteis: punctis sex nigris, thorace punctis nigris quinque.

*Habitat* in Suecia. HUMMEL.

*Magnitudine* C. 5-punctatae, pallide flava.

*Thorax* maculis quinque nigris; duae in medio, tres in basi.

*Elytron* singulum punctis minutissimis tribus, uno in costa, duobus in medio, altero prope marginem externum.

*Varietas* datur puncto costali nullo.

*Differt*

*Differt. a C. sex-maculata. Fabr. Ent. Syst. p. 274.*

**COCCINELLA FENNICA:** elytris rubris: punctis septem nigris, thorace nigro: margine antico punctisque duobus flavis.

*Habitat in Finlandia. Lect. BORGSTROEM.*

*Magnitudine C. 5-punctatae.*

*Caput luteum basi oculisque nigrum.*

*Thorax niger: margine antico cum hamo medio, lateribus et maculis duabus luteis.*

*Elytra rubra: punctum scutellare commune, pone medium singulo puncta duo nigra oblique posita, et intra apicem unum minus.*

**COCCINELLA OCULATA:** elytris rubris: punctis novem nigris, thorace nigro: macula antica lutea.

*C. Oculata. Mus. Acad. P. 3. p. 33. diversa a C. oculata Fabr. Ent. Syst. p. 287.*

*Magnitudine C. 5-punctatae.*

*Caput nigrum, flavo-maculatum.*

*Thorax niger, angulo antico flavo.*

*Elytra rubra: punctis 9 nigris, quorum I scutellare commune, I in basi, I pone medium, I in ipso margine antice et I intra marginem pone medium singuli Elytri.*

*Abdomen uti et pedes nigri.*

**COCCINELLA TRICUSPIS:** elytris rubris: punctis nigris novem arcuque communi.

*Habitat in Nericia; SMARAEUS.*

*Magnitudine C. 2-punctatae.*

*Caput luteum oculis punctisque duobus nigris.*

*Thorax antice luteus, hamos tres exserens, postice niger.*

*Elytra rufa: punctum baseos sub-quadratum, duo in singulo medio transversa, quorum*

unum in ipso margine, pone medium punctum marginale et fascia arcuata communis cruribus antrorsum versis; in medio dorso macula magna communicans.

**COCCINELLA ARCTICA:** elytris nigris: punctis decem nigris, thoracis margine antico flavo.

*Habitat* in Lapponia; EKELOUND.

*Caput* nigrum maculis duabus flavis.

*Thorax* niger margine antico flavo; saepe maculae binae in basi et rarius unica antice.

*Elytra* rubra: in singuli medio puncta tria transversa saepe coalita et intra apicem duo transversa.

**COCCINELLA 2-MACULATA:** elytris rubris: punctis nigris undecim, corpore ferrugineo.

Fabr. Ent. Syst. I. p. 277.

*Habitat* in Suecia.

C. 2-maculata. Mus. Acad. Append. I. p. 113.

diversa a C. 2-maculata Fabr. Ent. Syst. p. 277.

*Magnitudine* C. 2-punctatae.

*Caput* nigrum punctis duobus flavis.

*Thorax* niger macula antica flava marginali.

*Elytra* rubra: punctum costale et scutellare commune. in medio et pone medium in singulo puncta duo obliqua nigra, quorum exteriora minora.

*Varietas* punctis confluentibus.

**COCCINELLA TRIANGULARIS:** elytris rubris: punctis undecim nigris, capite punctis duobus flavis.

*Magnitudine* C. 2-punctatae.

*Caput* nigrum maculis duabus flavis.

*Thorax* niger in angulo antico macula flava.

*Elytra* rubra: punctum scutellare commune; in medio puncta duo transversa, oblique posita;

tum



tum punctum minutum solitarium et tandem duo transversa. Puncta interiora et scutellare majora.

COCCINELLA 14-MACULATA: elytris rubris: punctis 14 nigris, thorace flavo: punctis 6 nigris.

C. 14-maculata. Fabr. Ent. Syst. p. 279.

Minor C. 2-punctata.

Caput luteum oculis nigris.

Thorax flavus punctis 4 anticis, 2-baseos nigris.

Elytra, lutea: futura punctisque 14 nigris, duobus in basi, tribus in medio, duobus intra apicem, omnibus obliquis.

COCCINELLA 16-MACULATA: elytris rubris: punctis sedecim nigris, thorace flavo: maculis septem nigris.

Magnitudine C. 5-punctatae.

Caput flavum oculis nigris.

Thorax flavus: punctis nigris, duobus in medio et quinque in basi.

Elytra rubra: puncta duo in basi coalita, postea duo juxta marginem externum coalita; tum unum in medio prope marginem externum, majus cum linea futurali abbreviata coalitum; tandem puncta duo versus marginem externum coalita, quasi fasciam formantia et ultimo punctum solitarium versus marginem internum.

Pectus et abdomen nigra.

Pedes toti rubri.

COCCINELLA 18-MACULATA: elytris rubris: punctis octodecim nigris, thorace flavo: maculis quinque nigris.

Coccinella 16-punctata Mus. P. 3. p. 34.

Magnitudine C. 5-punctatae.

H 4

Caput

*Caput* flavum, basi nigrum.

*Thorax* flavus punctis duobus in medio, tribus basi nigris.

*Elytra* rufa; in singuli basi puncta duo nigra; in medio tria transversa; pone medium tria transversa, quorum intimum futuram tangit; intra apicem punctum solitarium.

*Pedes* flavi macula nigra.

COCCINELLA 12-GUTTATA: elytris luteis: punctis albis duodecim, thoracis lateribus albis.

Coccinella bis 6-guttata. Fabr. Ent. Syst. I. p. 284.

*Habitat* in Vestro-Gothia, GYLLENHAL.

COCCINELLA FLAVIPES: elytris nigris, capite thoracis margine pedibusque luteis.

Coccinella impustulata Fabr. Ent. Syst. I. p. 286.

*Magnitudine* C. 2-punctatae, tota nigra, laevis.

*Caput*, thoracis latera, pedes anusque flava.

COCCINELLA MARGINELLA: elytris nigris: puncto baseos flavo, capite punctis duobus lateribusque thoracis flavis.

*Inter minimas*, tota atra glabra.

*Caput* nigrum ore punctisque duobus albis.

*Thoracis* margines laterales antice albid.

*Elytron* singulum in basi juxta costam puncto et margine externo flavis.

*Pedes* flavi.

*Vix* varietas C. variabilis, cui similis?

COCCINELLA VARIABILIS: elytris nigris: punctis duobus lunatis submarginalibus rubris.

Fabr. Ent. Syst. I. p. 287.

*Habitat* sat vulgaris in Suecia.

*Caput* nigrum punctis duobus albis.

COCCINELLA HAEMORRHOIDALIS: elytris nigris: macula media lateribus thoracis anoque rubris.

*Magni.*

*Magnitudine* C. 5-punctatae, nigra.

*Margines* thoracis, *abdomen* postice et *macula* in medio *Elytri* singuli rubra.

COCCINELLA COLON: elytris nigris: punctis quatuor luteis, thorace immaculato.

*Inter* minimas, tota polita, nigra.

*In* singulo elytro puncta duo flava, longitudinaliter posita anusque ruber.

*Differt* a C. 4-pustulata: elytrorum punctis linea recta positis, minoribus, thorace immaculato et minori magnitudine.

COCCINELLA ABDOMINALIS: elytris nigris: punctis duobus abdomineque rubris.

*Magnitudine* C. 2-pustulatae seu C. Caeti duplo minor.

*Caput*, thorax, elytra, pectus, pedes nigra.

*Puncta* duo elytrorum et abdomen imprimis postice rubra.

COCCINELLA REPPENSIS: nigra capite lateribus thoracis punctoque apicis elytrorum luteis.

*Habitat* in Vestro-Gothia, GYLLENHAL.

*Inter* minimas tota nigra, polita.

*Caput* totum flavum.

*Thoracis* margines laterales flavi.

*Intra* apicem singuli elytri punctum luteum.

COCCINELLA 4-VERRUCATA: elytris nigris: punctis rubris quatuor, ano rubro. Fabr.

Syst. I. p. 288.

*Habitat* in Suecia, vulgaris.

COCCINELLA OCTOPUSTULATA: elytris nigris: maculis tribus lunulaque flavis.

*Habitat* in Suecia. SMARAEUS.

*Magnitudine* et similitudine C. hieroglyphicae.

*Caput* et omnia subtus atra.

*Thorax* niger angulo antico flavo.

*Elytra atra, laevia, glabra: in angulo baseos macula lunata; in medio baseos lineola flava; in margine exteriori macula et a medio marginis interioris ad apicem macula major lunata, cum opposita elytri alterius coalita.*

COCCINELLA SIMILATA: elytris nigris: maculis decem flavis, thorace nigro: angulo antico flavo.

*Habitat* Calmariae, WAHLBOM.

*Magnitudo* et similitudo summa C. decem-guttatae, sed thorace et punctis dissimilis.

*Caput* flavescens, nigro-marginatum.

*Thorax* niger angulo antico flavo.

*Elytra* nigra: in basi lunulae binae flavae; pone medium puncta duo rotunda et intra apicem macula solitaria in singulo elytro flava.

*Abdomen* nigrum ano flavo.

*Pedes* nigri geniculis luteis.

COCCINELLA DENTATA: elytris nigris: punctis duodecim albis exterioribus margine connexis.

C. 10-pustulata (12-pustulata). Fabr. Entom. Syst. I. p. 290.

*Habitat* in Suecia sat vulgaris.

*Variat* punctis magis discretis.

COCCINELLA LAPPONICA: elytris nigris: margine exteriori, lineola flexuosa suturali punctoque flavis.

*Habitat* in Lapponia, QUENSEL et EKHOLM.

*Magnitudine* C. 14-pustulatae, oblonga.

*Caput* nigrum, flavo-maculatum.

*Thorax* niger marginibus lateralibus et antico cum hamulo flavis.

*Elytra*



*Elytra* nigra; laevia: margo exterior sinuato-flavus; juxta futuram linea curva flava et pone medium punctum flavum.

*Tibiae* flavescentes.

COCCINELLA STRIGATA: elytris nigris: vitta duplici lutea, thorace nigro: linea lutea.

*Habitat* in Lapponia. Doct. EKELOUND.

*Magnitudine* C. lapponicae, - ejusque facie, oblonga.

*Thorax* niger lateribus lineaque media flavis.

*Elytra* nigra margine flavo-dentato; juxta futuram alia linea flexuosa postice punctum nigrum includens.

*Pedes* toti flavi.

DISSERTATIO  
SISTENS  
NOVAS INSECTORUM  
SPECIES.

PARS. I.

D. 15. DEC. 1781.

RESP.

SAM. NICOL. CASSTROEM.

**I**ucundissima certe est illa scientia, quae Entomologiae nomen adepta, veteribus parum vel nihil exulta fuit, recentioribus vero non modo in deliciis habita, sed ad fastigium fere suum fuit evecta. Conferre namque, si cuidam placuerit, rydes antiquitatis insectorum figuras, illorumque descriptiones incompletas et inordinatas cum iconibus Kramerianis, Drurianis, Clerkianis aliisque, nec non cum saccinctis characteribus Fabricii, de Geer, a Linné aliorumque, seculi hujus summorum virorum; is certe non difficulter deprehendet, tantam fere intercedere differentiam inter priorum seculorum et hujus nostri notitiam entomologicam, quanta inter larvam, metamorphosin sensim per gradus subituram, et ipsam Insecti declaratam imaginem.

Scien-

Scientiæ etenim faciẽm postquã induere coepit hæc nostra, non ii solum, qui summo alias studio litteris operam navant, amore maximo illam amplexi fuerunt, sed et Magnates, quin etiam potentissimos Rẽges adeo oblectare coepit, ut Musæa insectorum, illa certẽ pulcherrima et pretiosissima, Palatia illorum intraverint. Hinc factum fuit, ut a medio hujus seculi maxima incrementa ceperit, innumerisque fere individuis novis aucta fuerit hæc scientia minimorum animalculorum. Sic Insecta Americæ imprimis collegerunt, detexerunt Belgæ et Angli; Indiae orientalis, uti etiam Africæ variae nationes Europææ huc attulerunt. Imprimis vero collectiones insectorum insigniores novissimẽ fecerunt varii, de hac scientia itaque præ aliis bene meriti, nec sine laude promerita nominandi: JOSEPHUS BANKS, Illustr. Vir et Botanicorum hodie Princeps, e novi, nuper detecti mundi variis plagis, non primis modo, sed numero, structura et coloribus valde insignibus insectorum speciminibus musæum suum exornavit Systemaque Fabricianum speciebus novis benignissime ditavit. PALLAS et LAXMAN e Sibiria et aliis Imperii Russici provinciis non paucas insectorum species novas secum reportarunt. E Coromandeliam varias quoque novas amicis suis misit Celeber. Vir et inclytus Botanicus Dr. KOENIG. Quæ Bengalam et Gangem fluvium circumjacentes regiones progignunt insecta pulcherrima, impensis et studio insignibus, has ipsas terras per vastum mare ipsa adiens conquisivit Domina ANNA MONSON, aequè in ceteris ac quidem in Historia Naturali docta. Insecta Capensia, quorum ante viginti annos vix unicum specimen Europæ curiosis innotuerat, prima colli-

colligenda curavit Gubernator promontorii bonae spei TULBAGH, eorumque centuriam circiter dimidiam Arch. a LINNÉ transmisit. Vastissima vero haec regio, versus interiora Africes immente sese extendens, plurima adhuc, ex hac Classe, animalcula alebat, a Dr. SPARRMAN et Exp. D. Praefide, non multum post e latebris suis vocanda inque Europam mittenda. Lepidoptera insecta e confiniis Cantonae in China quotannis secum ducunt nautae; e Japonia vero ne ullum quidem specimen unquam fuit missum antequam Exp. D. Praefidi Insulas illas remotissimas adire, percurrere contigit. Varias icone rudi in Historia Japoniae expressit quidem Dr. KAEMPFER, variasque artificiosa manu, e cupro factas vidimus; veras autem nullas, collectiones licet maximae, ante paucos annos continuerunt species.

Agmen itaque insectorum novorum, quum adeo brevi increverit, nec multa horum specimina adhuc descripta et publici juris facta fuerint, non inutile fore crediderim, si illorum, quae in Capite bonae spei et Japonia invenerit Exp. D. Praeses, partem aliquam delinearem descriptamque Tecum B. L. communicarem.

\* \* \*

#### LUCANUS.

*Antennae* clava lamellata.

*Maxillae* porrectae, dentatae.

L. CAPENSIS: *exscutellatus*, *niger*, *elytrorum*  
*fulcis punctatis*.

Habitat in Capite bonae spei.

*Corpus*



*Corpus* magnitudine *Tenebr. Fossore* paulo majus, totum nigrum, glabrum, oblongum et valde cylindricum.

*Caput* punctis impressis.

*Maxillae* breves, arcuatae, dentatae.

*Antennae* clavatae, fissiles, laminis tribus.

*Thorax* marginatus, glaberrimus, postice rotundatus punctis minimis impressis.

*Elytra* marginata, abdomen occultantia; singulum striis octo punctatis.

*Femora* latiuscula, compressa: *tibiae* dilatatae, compressae, dentatae, dentibus exterioribus tribus seu quatuor; interioribus binis. *Tarsi* minimi.

*Abdomen* versus anum pilosum.

#### DERMESTES.

*Antennae* clava perfoliata, triarticulata.

*Caput* inflexum.

*Thorax* convexus, truncatus.

*Corpus* oblongum, convexus.

D. BIFASCIATUS: *niger*, *elytris fasciis binis undulatis luteis*, *thorace cinereo-tessellato*.

Habitat ad Caput bonae spei.

*Corpus* magnitudine *Derm. undati*, sed paullo latius.

*Antennae* perfoliatae, nigrae, capite paullo longiores.

*Caput* nigrum.

*Thorax* ater, hirtus, cinereo-tessellatus, antice angustior, pro capite emarginatus, postice truncatus, trilobus.

*Elytra* atra, marginata, tenuissime hirta, fasciis duabus aurantiacis: antica transversa, undulata,

*lata, inque futura autrorsum flexa; postica lunata, interrupta.*

*Abdomen et Pectus nigra pilis cinereis tota hirta.*

**D. INTERRUPTUS:** *niger, fascia baseos elytrorum rubra, interrupta.*

*Magnitudo Derm. undati.*

*Corpus totum atrum, tenuissime pilosum. laeve.*

*Thorax convexus, antice angustior, pro capite emarginatus, postice truncatus, trilobus.*

*Elytra marginata, oblonga: prope basin fascia transversa, rubra, interrupta in medio, sic ut futuram non attingat.*

**D. BIPUSTULATUS:** *ater, glaber, capite, thorace punctoque baseos elytrorum rubris.*

*Magnitudine pulicis, totus glaberrimus et convexus.*

*Antennae perfoliatae.*

*Caput, Thorax, Pedes, Anus rubra. Oculi nigri.*

*Thorax convexus, laevissimus, marginatus, antice truncatus, postice latior, subtrilobus.*

*Elytra laevissima absque striis et punctis, marginata, atra, puncto rubro in ipsa costa.*

*Abdomen piceum.*

**D. MACULATUS:** *niger, elytris fascia undata punctisque rubris.*

*Habitat in Sueciâ, in Ostro-Gothia lectus et alibi.*

*Corpus statura Derm. undati, sed paullo minus.*

*Caput nigrum.*

*Antennae piceae, moniliformes, articulis tribus ultimis crassioribus, longitudine thoracis.*

*Thorax convexus, marginatus, antice angustior, emarginatus, postice lineola utrinque impressa, truncatus, trilobus.*

*Elytra oblonga, marginata, striata, nigra: in costa punctum rubrum, sublunatum; pone hoc*

hoc, prope futuram, secundum rotundum, intra apicem tertium; in medio fascia undulata rubra.

*Pedes et Abdomen rufescentia.*

*D. MARGINATUS: niger, thoracis lateribus, pedore incisurisque abdominis albis.*

Habitat in Capite bonae spei et India Orientali. Magnitudo et Facies omnino *Derm. lardarii*, sed paullo major, totus pilis tenuissimis hirtus.

*Caput cinereo-album.*

*Antennae perfoliatae.*

*Thorax* convexus, antice angustior, emarginatus, postice latior, truncatus, trilobus, margine utrinque cinereo-albo e tomento tenuissimo.

*Scutellum cinereum.*

*Elytra oblonga, nigra.*

*Pectoris latera tota alba.*

*Abdomen nigrum, segmentis margine albis.*

*Pedes nigri.*

*D. PICEUS: totus ferrugineus elytris striatis.*

Habitat in Capite bonae spei inque India Orientali. Magnitudo et Statura omnino *Derm. marginati*, totus pilis tenuissimis decumbentibus hirtus et ferrugineus seu piceus.

*Caput inflexum.*

*Antennae perfoliatae, longitudine capitis.*

*Thorax* convexus, antice angustior, postice latior, trilobus, marginatus.

*Elytra* tenuissime striata absque punctis impressis. Color fere *Tenebrionis Culinaris*, sed magis obscurus.

#### ANOBIUM.

*Antennae* clava perfoliata, triarticulata.

*Thorax* marginatus, rotundatus.

Vol. III.

I

Corpus

*Corpus convexum, lineari-oblongum.*

*Elytra flexilia.*

**A. RUFICOLLE:** *violaceum, hirtum, thorace, basi elytrorum pedibusque rubris.*

Habitat in Africa et India Orientali.

Magnitudo et Statura *Derm. Violacei*, totus pilis erectis hirtus.

*Caput violaceum.*

*Antennae perfoliatae, nigrae, longitudine fere thoracis.*

*Thorax convexus, marginatus, rotundatus, tenuissime punctatus, ruber.*

*Elytra oblonga, marginata, striata punctis impressis, violacea, basi rubra.*

*Pectus rubrum uti et Pedes, toti.*

*Abdomen nigrum.*

*Dermestes ruficollis Fabricii Syst. Entomol. p. 57.*

**A. CAPENSE:** *atrum, hirtum, elytris violaceis, fasciis duabus albis.*

Habitat in Capite bonae spei.

*Corpus magnitudine majoris pediculi, sub-cylindricum.*

*Caput nigrum, hirtum.*

*Antennae perfoliatae, nigrae, longitudine capitis.*

*Thorax convexus, marginatus, rotundatus, hirtus, punctatus, niger.*

*Elytra oblonga, hirta, punctata, obscure violacea, fasciis duabus albis, altera in medio undulata, altera intra apicem.*

*Pectus et Abdomen nigra, glabra.*

*Pedes nigri, femoribus glabris, tibiis tarsisque hirtis.*

**A. BIFASCIATUM:** *nigrum, glabrum, elytris fasciis duabus luteis.*

Habitat ad Caput bonae spei.

*Corpus*



*Corpus* totum sublineari-oblongum, nigrum, glaberrimum, impunctatum, lineam longum.

*Antennae* perfoliatae, piceae, longitudine fere thoracis.

*Thorax* planus, marginatus, rotundatus, postice angustior, ater.

*Elytra* marginata, picea, absque striis, fasciis duabus, altera prope basin, altera pone medium, lacteis, rectis, transversis neque suturam neque marginem attingentibus.

A. VIRIDE: *viride, hirtum, pedibus rubris.*

Habitat in Africa et India Orientali.

*Corpus* lineare, totum hirtum et, exceptis antennis atque pedibus, viridi-cupreum, subunguiculare.

*Caput et Thorax* magis aenea.

*Antennae* perfoliatae, nigrae, thorace breviores.

*Thorax* planus, marginatus, rotundatus, punctatus.

*Elytra* magis viridia, marginata, acuta, flexilia, punctata absque striis.

*Abdomen* glabrum.

*Pedes* hirti, femoribus tibiisque rubris, tarsis fuscis.

A. RUFIPES: *violaceum, hirtum, pedibus rubris.*

Habitat in India Orientali, in Capite bonae spei inque Europa.

*Corpus* magnitudine *Derm. Violacei*, ovatum, parum hirtum, totum, exceptis antennis et pedibus, violaceum.

*Antennae* perfoliatae, nigrae, basi rubrae.

*Thorax* planus, marginatus, rotundatus, tenuissime punctatus.

*Elytra* oblonga, marginata, punctata, flexilia.

*Abdomen* glabrum.

*Pedes* toti rubri.

*Differt ab Anobio viridi* 1) corpore ovato, violaceo.  
 2) antennarum basi rubra.  
 3) pedibus totis rubris.

**A. CAERULEUM:** *caeruleum, hirtum, lineare.*

*Habitat in Capite bonae spei.*

*Corpus lineare, immaculatum, violaceum, hirtum, supra punctatum, lineam longum.*

*Thorax parum convexus, marginatus, rotundatus.*

*Elytra marginata, flexilia.*

*Differt a Derm. violaceo* 1) corpore linearinec ovato.

2) colore magis obscuro.

#### COCCINELLA.

*Antennae clava solida.*

*Abdomen planum.*

**C. FIMBRIATA:** *elytris flavis immaculatis margine nigro, thoracis margine postico punctis quatuor nigris.*

*Corpus magnitudine C. 5-punctatae.*

*Caput flavum, oculis nigris.*

*Antennae clava solida clavatae, palpique flavescents.*

*Thorax flavus, margine postico nigro, punctis quatuor nigris, quorum duo in medio distincta vel coalita et in singulo margine unum saepe obsoletum.*

*Elytra flava, immaculata, margine omni nigro.*

*Pectus et Abdomen atra.*

*Pedes flavi.*

*Differt a Coccin. marginata.*

α) thoracis punctis subquaternis, raro duobus.

β) punctis thoracis albis nullis.

**C. MINUTA:** *elytris rubris thoraceque immaculatis.*

*Habitat in India Orientali.*

*Corpus*

*Corpus* magnitudine vix Pulicis, obscure rubrum, totum immaculatum, glabrum.

*Omnium minima differt a C. impunctata thorace unicolore.*

*C. TRINOTATA: elytris rubris hirtis punctis tribus nigris, capite rubro.*

*Habitat in Capite bonae spei.*

*Corpus* hemisphaericum, inter omnes Coccinellas facile minimum, tenuissime hirtum, rubrum.

*Caput* rubrum, immaculatum.

*Thorax* ruber, macula in medio magna nigra.

*Elytra* rubra, maculis tribus nigris, una in sutura communi, una in singuli elytri medio.

*Abdomen* in medio nigrum.

*Differt a C. tripunctata* 1) quod multoties minor.  
2) quod hirta.  
3) quod caput immaculatum.

*C. JAPONICA: elytris flavis, cruce suturae duplici maculisque quatuor nigris.*

*Habitat in Japonia.*

*Corpus* magnitudine *C. hieroglyphicae*.

*Caput* flavum, puncto baseos nigro.

*Thorax* niger, marginibus luteis.

*Elytra* lutea maculis oblongis duabus in singulo versus exteriorem marginem; sutura nigra cum punctis duobus obliquis. Apex ipse etiam niger est.

*Abdomen* nigrum, luteo-maculatum.

*Pedes* flavi.

*C. GRANDIS: elytris flavis, punctis nigris tredecim, thorace nigro, marginibus flavis.*

*Habitat in China, unde missa fuit a D. P. J. Bladh.*

*Corpus* inter *Coccinellas* omnium maximum, glabrum.

*Caput* flavum, minimum, oculis nigris.

*Thorax* niger, margine utrinque flavo.

*Elytra* flava, punctis septem nigris: unum in medio singuli elytri versus basin rotundum, tum tria ante medium transversa, quorum exterius marginale, oblongum, medium rotundum, iuterius commune cum puncto elytri oppositi, adeoque maximum; tandem pone medium tria transversa uti tria priora, sed paullo minora; in ipso apice punctum commune. Margo elytrorum valde productus est.

*Abdomen* et *Pedes* lutea.

*Alae* fuscae.

*Differt facile a C. 13-punctata.*

1) magnitudine.

2) punctis tribus in ipsa sutura communibus.

*C. GIBBA*: elytris rubris, fascia punctisque sex nigris.

*Habitat* in Capite bonae spei.

*Corpus* magnitudine *Coc. 7-punctatae*, totum tenuissime hirtum.

*Caput* rubrum, oculis nigris.

*Thorax* ruber, puncto in medio nigro.

*Elytra* rubra, fascia in medio arcuata nigra, in singulo e tribus punctis coalita; puncta duo nigra in basi et unum lunatum utrinque intra apicem.

*Pectus* nigrum.

*Abdomen* et *Pedes* rubri.

*C. OCTOMACULATA*: elytris rubris, punctis octo nigris, thorace immaculato.

*Habitat* in Capite bonae spei.

*Corpus* magnitudine *C. 7-punctatae*, totum rubrum.

*Caput*



*Caput et Thorax immaculata oculis nigris.*

*Elytra saturate rubra, punctis octo nigris; unum in basi transversum, duo in medio parum confluentia inter se, quartum intra apicem minimum.*

*C. PSI: elytris flavis, margine exteriori maculis quatuor nigris.*

*Habitat ad Caput bonae spei.*

*Corpus magnitudine fere C. 7-punctatae.*

*Caput pallide flavum oculis nigris.*

*Thorax flavus, macula in medio nigra, bifida.*

*Elytra flava, margine exteriori et sutura nigra; in singulo maculae quatuor nigrae, prima ad basin rotunda, secunda in margine exteriori quadrata, tertia intra apicem, quarta lunata in sutura a medio fere ad apicem cum opposita conjuncta.*

*Pectus nigrum.*

*Abdomen et Pedes lutei.*

*C. IRIDEA: elytris rubris punctis novem nigris ocellaribus.*

*Habitat in Capite bonae spei.*

*Corpus magnitudine fere C. 7-punctatae, totum rubrum, glabrum, exceptis elytris, immaculatum.*

*Oculi nigri.*

*Elytra rubra, punctis novem nigris, iride lutea cinctis, quorum unum prope basin utrinque, duo ante medium transversa, tum unum versus marginem exteriorem, tandem unum intra apicem commune.*

*C. OCULATA: elytris rubris, punctis novem nigris, circulo flavo circum oculos.*

*Habitat in Capite bonae spei.*

*Corpus magnitudine C. 7-punctatae.*

*Caput* nigrum, margine antico et circulo oculorum flavo. *Oculi* nigri.

*Thorax* ater puncto in angulo antico utrinque flavo.

*Elytra* rubra, punctis novem nigris: unum in ipsa costa, unum versus marginem anteriorem ante medium, unum versus futuram in medio elytri, unum versus posteriorem marginem pone medium et unum commune in futura prope basin.

*Abdomen et Pedes* atra.

*Valde similis* *Cocc. novem-punctatae*; differt vero.

α) *Longitudine fere quadrupla.*

β) *Punctis inverso ordine positis.*

γ) *Capite immaculato cum circulo oculorum flavo.*

**C. SIMILIS:** *elytris rubris, fasciis duabus punctisque quatuor nigris.*

*Corpus* magnitudine *Coccin. 5-punctatae*, oblongum, totum supra adpersum pilis brevissimis cinereis.

*Caput cum Antennis, Oculis et Palpis, Thorax et omnia subtus nigra, immaculata.*

*Elytra* marginata, rufescentia fasciis duabus punctisque quatuor nigris: scilicet ad basin fascia subundulata ex tribus punctis connexis: ante medium fascia obliqua ex punctis duobus connexis futuram et marginem non attingente. Pone medium prope futuram punctum unicum et aliud intra apicem.

*Distincta 1) a C. 11-punctata et 13-punctata, quibus similis, thorace toto nigro punctisque anticis connexis.*

2) *a C. 9-punctata, thorace toto capiteque nigro, immaculato, fasciisque elytrorum.*

C. BO-

*C. BOREALIS*: elytris rufis, punctis duodecim nigris, thorace quadripunctato.

*Coccinella Borealis Fabricii Syst. Entom. p. 82.*

Habitat in Capite bonae spei.

Corpus magnitudine *C. ocellatae*, gibbum.

Caput flavum, immaculatum, oculis nigris.

Thorax flavus punctis quatuor nigris, quorum duo in medio et in singulo margine unicum.

Elytra marginata, rubra, punctis duodecim nigris; tria transversa prope basin, quorum unum in ipsa costa, unum in medio et unum in sutura communi; tria transversa in medio, quorum intimum commune et caeteris longe majus; unum intra apicem magnum.

Omnia subtus lutea.

*C. CAPENSIS*: elytris rubris, punctis duodecim nigris, thorace immaculato.

Corpus magnitudine *Cocc. ocellatae*, ovatum, gibbum.

Caput rufescens oculis nigris.

Thorax rufescens, immaculatus, glaber, marginatus.

Elytra rufescentia, glabra: singulum punctis sex nigris, rotundis; duo ad basin, duo ante medium, unum versus marginem interiorem pone medium, unum intra apicem.

Abdomen nigrum, margine rufescente.

Pectus et Pedes toti rufescentes.

Differt 1) a *Coccinella* 12-punctata

α) quod major.

β) thorace immaculato.

γ) punctis rotundis, nec ultimo repando.

2) a *C. Boreali*

α) thorace immaculato.

β) punctis elytrorum nullis connexis.

**C. PUSILLA:** *elytris flavis punctis octo nigris, quadrifariis.*

*Corpus* pulice vix majus, totum pallide flavum, exceptis punctis elytrorum immaculatum, convexum, glabrum.

*Elytra marginata:* singulum punctis quatuor nigris quadrifariam oblique positis.

*Haec uti minuta et unipunctata inter minimas numeranda est.*

**C. DISTINCTA:** *elytris rubris, punctis sedecim nigris distinctis.*

*Habitat in Capite bonae spei.*

*Corpus* magnitudine *Coccin. 5-punctatae*, totum supra adpersum punctis minimis, cinereis.

*Caput* rufescens, oculis nigris.

*Thorax* marginatus, niger, marginibus lateralibus rufescentibus.

*Elytra marginata, rufescentia, punctis sedecim nigris, distinctis:* in singuli medio quatuor longitudinaliter: duo ad marginem exteriorum, et duo ad suturam. *Scutellum* nigrum.

*Pectus et Abdomen* nigra.

*Pedes* rufescentes, femoribus nigris.

*Distincta a Coccin. 16-punctata, quod puncta omnia sint distincta, thorax niger, quodque major.*

**C. FLEXUOSA:** *elytris rubris, fasciis duabus punctisque duobus nigris.*

*Habitat in Capite bonae spei.*

*Corpus* magnitudine *Cocc. 5-punctatae*, glabrum.

*Caput* flavum, ore oculisque nigris.

*Thorax* flavus, margine postico maculaque in medio trigona nigra.

*Elytra* rubra, margine exteriori tenuissime nigro; fascia prope basin undata, nigra, nec  
mar-



marginem nec futuram attingente; fascia alia in medio transversa undata. Punctum intra marginem utrinque nigrum; futura nigra.

*Abdomen rubrum cingulis nigris.*

*Pedes, rubri.*

**C. REPANDA:** *elytris flavis, fasciis tribus undatis, nigris.*

Habitat in Capite bonae spei.

*Corpus magnitudine Cocc. 7-punctatae, glabrum.*

*Caput, Antennae, Oculi, Abdomen et Pedes nigra.*

*Thorax niger, utrinque macula in angulo antico flava.*

*Elytra flava, fasciis tribus undatis, nigris, prima prope basin nec marginem nec futuram attingente, secunda in medio transversa marginem exteriorem non attingente, tertia intra apicem transversa omnino.*

**C. FLAVICOLLIS:** *elytris sanguineis punctis decem nigris, thorace flavo.*

Habitat in Capite bonae spei.

*Corpus magnitudine Cocc. 7-punctatae, pilis tenuissimis hirtum.*

*Caput, Thorax, Pedes et Pectus pallide lutea, immaculata.*

*Oculi nigri.*

*Elytra sanguinea, punctis in singulo quinque nigris, duo in basi, duo in medio et unum intra apicem.*

*Alae flavescentes.*

*Abdomen flavum, cingulis aliquot nigris.*

**C. UNDULATA:** *elytris rubris, fasciis undatis dentatisque variis nigris.*

Habitat in Capite bonae spei.

*Corpus magnitudine Coccin. 7-pustulatae, supra totum adpersum pilis brevissimis cinereis.*

*Caput*

*Caput, Antennae et Palpi* flavescentia.

*Oculi* nigri.

*Thorax* flavescent, medio macula magna, fusca, transversa.

*Elytra* rubra fasciis undulatis lunulisque nigris, scilicet in singulo ad basin ocelli duo pupilla nigra, a basi in ipso margine externo linea ad medium elytri, ubi inflectitur per medium elytri undulata ad-suturam, dentes tres acutiusculos formans et tandem versus inferiora usque ad apicem ducta reflectitur et dentem duplicem versus superiora exserit, includens figuram signo quaestionis similem nigram.

*Pectus et Abdomen* nigra.

*Pedes* flavescentes, femoribus medio nigris.

**C. LUNATA:** *elytris flavis, fasciis duabus, arcu punctisque quinque nigris.*

Habitat in Capite bonae spei.

Magnitudine Cocc. fere 7-punctatae, glabra tota.

*Thorax* niger angulo antico utrinque flavo.

*Elytra* flava: prope basin signum (;) in singulo punctumque elytri baseos commune nigrum: infra basin utrinque prope exteriorem marginem punctum minutum nigrum. Pone medium fascia lata transversa, marginem anteriorem non attingens et alia omnino transversa, undulata intra apicem nigra.

*Omnia subtus* nigra.

**C. CRUX:** *elytris flavis, lineis duabus cruceque nigris.*

Habitat in Capite bonae spei.

*Thorax* marginatus, antice pro capite truncato excisus, flavus; margo posticus fascia nigra, simplici, antrorsum curvata, maculaque in medio cordata.

*Elytra*

*Elytra* marginata, glabra, flava: in singulo linea media rectiuscula, nigra, a basi, intra apicem terminata, inque sutura crux nigra, formata ex linea communi et punctis duobus ante medium coalitis.

*Pectus et Abdomen* nigra.

*Femora* nigra genibus tibiisque flavescentibus.

*Differt a C. Comma* margine elytrorum non nigro, cruce suturae exstante et linea in elytris subrecta vel incurva, quae in altera recta est, apice extrorsum curvata; *Thoracis* macula cordata et fascia simplici absque dentibus.

**C. COMMA:** elytris flavis: sutura, margine lineaque nigris.

*Habitat* in Capite bonae spei.

*Corpus* magnitudine *Coccin. 5-punctatae*.

*Caput* flavum, macula media nigra. *Oculi* nigri.

*Antennae et Palpi* flavescentes.

*Thorax* planiusculus, marginatus, antice pro capite excisus, glaber, flavus. Margo posticus fascia nigra quadridentata; anticus punctis duobus nigris.

*Elytra* marginata, flava, lineis quinque rubris; prima et secunda in margine exteriori medio dilatata, tertia et quarta in medio, antico apice extrorsum curvata, nec basin nec apicem attingens, comma (,) referens, quinta in ipsa sutura communis, ante medium latior.

*Cetera ut in Coccinella cruce.*

**C. LINEATA:** elytris rubris, margine omni maculisque duabus oblongis nigris.

*Habitat* in Capite bonae spei.

*Magnitudine Coccin. 5-punctatae*, glabra.

*Caput* flavum, puncto medio oculisque nigris.

*Thorax* flavus, margine postico maculaque cordata cohaerente nigra

*Elytra*



*Elytra* rubra, margine omni tenuissime nigra et in singulo macula lata, oblonga, nigra nec apicem nec basin attingens.

*Abdomen et Femora* nigra.

*Tibiae* flavae.

**C. FLAVIPES:** *elytris nigris: thorace nigro, maculis duabus flavis.*

Habitat in Promontorio bonae spei.

*Corpus* magnitudine *Coccin. 2-pustulatae*.

Flava sunt os, thoracis anguli antici, pedes et anus.

Reliqua nigra, glabra, immaculata.

*Differt a Coccin. impustulata thoracis lateribus flavis, absque puncto nigro et margine antico non flavo, sed thorace concolore.*

**C. HAEMORRHOIDALIS:** *elytris nigris: maculis duabus flavis, thoracis marginibus anoque flavis.*

*Corpus* magnitudine *Coccin. 2-pustulata* minus, valde gibbum, atrum, laeve, glaberrimum.

*Thorax* marginatus, utrinque in angulo antico macula supra infraque fulva, margine ipso tenuissime nigro.

*Elytra* marginata, valde convexa: in singuli medio macula simplex, orbiculata, flava. *Alae* fusco-hyalinae.

*Pectus et Abdomen* plana, nigra, ultimis segmentis totis supra infraque fulvis.

*Pedes* toti nigri.

*Diversa est* 1) *a Coccin. Casti*

α) magnitudine multoties minori.

β) macula elytrorum flava nec fulva

2) *a Coccin. 2-pustulata.*

α) minori magnitudine.

β)



β) *macula elytrorum simplici, nec composita ex maculis tribus confluentibus.*

γ) *thoracis marginibus luteis.*

δ) *ano fulvo tantum nec abdomine toto.*

**C. LAEVIS:** *elytris nigris, punctis sex flavis. thoracis angulis anticis flavis.*

*Magnitudine Coccin. 2-pustulatae, glabra.*

*Caput flavum, oculis nigris.*

*Thorax niger, angulis anticis flavis.*

*Elytra nigra punctis sex flavis, duobus utrinque in medio et uno intra apicem, rotundatis.*

*Abdomen nigrum, pedibus flavis.*

*Differt a Coccin. 6-pustulata*

α) *thorace maculato.*

β) *capite flavo.*

γ) *situ et figura punctorum in elytris.*

**C. RIVOSA:** *elytris nigris, lunulis sex punctisque quatuor rubris.*

*Habitat in Capite bonae spei.*

*Magnitudine Cocc. ocellatae, tota gibba, glabra.*

*Caput flavum, oculis nigris.*

*Thorax niger, angulis anticis flavis.*

*Elytra nigra: in singuli medio maculae duae rotundae, rufescentes et lunulae tres, quarum prima juxta basin retrorsum spectans, secunda versus apicem anteriora spectans, et tertia pone medium versus suturam retrorsum versa.*

*Abdomen nigrum, marginibus rubris.*

*Pedes flavi, femoribus basi nigris.*

**C. DENTATA:** *elytris nigris, margine exteriori linea tridentata, punctisque sex flavis.*

*Habitat in Capite bonae spei.*

*Corpus magnitudine C. 14-punctatae.*

*Caput*

*Caput* flavum puncto nigro.

*Thorax* niger, marginibus lateralibus et antico flavis.

*Elytra* nigra: singulum linea in exteriori margine tridentata ex punctis duobus et lunula protuberantibus et praeterea puncta tria flava, unum in basi juxta suturam, unum in medio, unum prope suturam pone medium.

*Abdomen* nigrum, margine flavo.

*Pedes* flavi, femoribus puncto nigro notatis.

*C. HIRTA*: *elytris* nigris, maculis duodecim rubris.

Habitat ad Promontorium bonae spei.

Magnitudine *Coccin. ocellatam* fere aequat, tota pilis cinereis hirta.

*Caput*, *Thorax*, *Abdomen* et *Pedes* atra.

*Elytra* atra, quasi reticulata: singulum maculis sex rubris, quarum una in basi lunata posteriora spectans, tum duae transversae, tandem duae et denique una intra apicem.

*C. 20-PUSTULATA*: *elytris* nigris: punctis fulvis viginti.

Habitat in Capite bonae spei.

*Corpus* magnitudine *Coccin. 7-punctatae*, gibbum, tenuissime hirtum.

*Caput*, *Thorax*, *Abdomen* et *Pedes* nigra, immaculata.

*Elytra* nigra: singulum maculis fulvis decem; duabus in basi, tum tribus transversis rotundis, inde duabus, quarum interior lunata, posteriora cruribus spectantibus, tandem duabus rotundis et una in ultimo apice.

*C. OCTO-GUTTATA*: *elytris* rubris maculis octo flavis.

Habitat in regno Japonico.

*Corpus*

*Corpus* magnitudine *Coccinella Ocellata* paullo majus, glabrum.

*Caput* et *Thorax* rubra, immaculata, tenuissimis punctis pertusa.

*Elytra* marginata, punctis decem seriebus pertusa, rubra: singulum maculis quatuor laete flavis, quarum prima in costa lunata, secunda juxta priorem rotundata, tertia prope suturam rotundata et quarta intra apicem obcordata maxima.

*Omnia subtus et alae rubra.*

#### CICINDELA.

*Antennae* setaceae.

*Oculi* prominuli.

*Maxillae* porrectae.

*C. GIGANTEA*: nigra, *elytris* costa longitudinali serrata, acuta, thorace bilobo.

Habitat in viis ad Caput bonae spei, celerrime currens et mordens, vulgaris.

*Corpus* Carabi majoris magnitudine, subtriangulare, totum atrum, hirtum, scabrum.

*Caput* prominulum, teres, laeve, linea supra oculos elevata. *Oculi* supra nigri, infra pallidi. *Maxillae* longitudine fere capitis, incurvatae, acute dentatae. *Palpi* quatuor.

*Antennae* longitudine thoracis, setaceae.

*Thorax* antice teres, postice marginatus, inaequalis, elevatus, rotundatus, cordato-bilobus, ab *elytris* remotus. *Scutellum* mediocre.

*Elytra* deflexa, clausa, marginata, incurvata, lata, glabra, antice laevia, postice punctis elevatis aspera, supra plana, versus latera et praeprimis postice punctis elevatis pilosis scabra; costa producta in lineam acutam, serratam, ciliatam.

*Pedes aequales, cursorii, longi. Tibiae spinis tribus terminatae. Tarsi articulis imbricatis. Digiti unguiculati.*

*Facies thoracis et Elytrorum a Cicindelis diversa, Carabis valde similis est.*

*C. JAPONICA: violacea, elytris basi, apice fasciaeque cupreis, punctis duobus fasciaeque luteis. Habitat in Japonia.*

*Corpus magnitudine Cicind. Sylvaticae.*

*Caput Antennaeque violaceae labio luteo. Maxillae luteae, subtus apiceque nigrae, porrectae, longitudine capitis.*

*Thorax cupreus, marginibus antico et postico violaceis.*

*Elytra violacea, tomentosa, non nitentia, basi, apice, fascia ante medium et sutura cuprea; praeterea fascia in medio obliqua et puncta duo utrinque lutea, unum prope costam, alterum intra apicem.*

*Subtus omnia e cyanco et violaceo nitent.*

*C. TRIDENTATA: purpurascenti-aenea, elytris linea marginali tridentata.*

*Habitat in Ceylona et Coromandelis.*

*Corpus magnitudine C. hybridae.*

*Caput antice cyaneum, postice aeneum, labio luteo. Maxillae nigrae.*

*Antennae apice fuscae, basi aeneae.*

*Thorax convexus, linea exaratus.*

*Elytra obscure purpurascenti-aenea, margine linea lutea tridentata, dentem minutissimum ante medium, alterum in medio rotundum, tertium postice flavum exserens.*

*Subtus omnia aenea, nitida, barba sparsa alba, imprimis femora.*

*Differt*



*Differt a C. marginata quod fascia nulla sit undata, nec punctum ullum in basi elytrorum.*

**C. CATENA:** *viridi-aenea, elytris linea marginali flava, triramosa.*

*Cicindela catena. Fabric. Syst. Entom. p. 226.*

*Habitat in Capite bonae spei inque Indiae orientalis plurimis locis satis frequens.*

*Varietates hujus plures sunt, quae in sequentibus conveniunt.*

*Corpus magnitudine C. hybrida paullo minus.*

*Caput et Antennae filiformes, aeneae labio luteo. Maxillae nigrae. Palpi pallidi apice nigro, plumosi.*

*Thorax aeneus, hirtus.*

*Subtus omnia violacea, nitida, lateribus pilis albis densis hirtis.*

*Varietas 1) Elytra viridi-aenea, intra marginem linea flava, triramosa; ramo primo intra basin brevi; secundo in medio obliquo, undato; tertio, in apice lunato. Praeterea a basi ad medium in ipsa sutura linea flava hamata.*

*2) Elytra purpurascenti-aenea, lunula in costa, fascia obliqua undulata, et lunula apicis flavis. Praeterea prope suturam, juxta basin utrinque lineola et alia in medio flava.*

*3) Elytra aenea, intra marginem linea flava triramosa, ramum primum in costa lunatum, alterum obliquum numero (5) similem in medio, et tertium lunulato-flexuosum intra apicem flavum exserens.*

*Species haec valde similis C. Capensi, cum qua in multis adeo convenit, ut forsan ejus sola sit varietas, licet haec paullo minor. Utraque Species singularis est tomento albo in thorace et lateribus pectoris et abdominis.*

## GYRINUS.

*Antennae cylindricae, rigidae.*

*Pedes natatorii.*

*G. CAPENSIS: elytris viridi-aeneis margine pallido.*

Habitat in rivulis prope Cap, alibique in Promontorio bonae spei.

*Corpus magnitudine Gyrino Natatore minus, oblongum, glabrum, supra viridi aeneum, infra pallidum, glaberrimum, depressiusculum.*

*Antennae thorace breviores, longitudine capitis, exstantes.*

*Oculi 4, duo superiores minores, duoque inferiores majores.*

*Thorax marginatus, lateribus pallidis.*

*Elytra abdomine paullo breviora, striata, margine pallide flava.*

*Pedes quatuor posteriores abbreviatae, cheliformes.*

## HEMEROBIUS.

*Os maxillosum.*

*Alae deflexae.*

*Antennae setaceae.*

*H. GRANDIS: alis subaequalibus, reticulato-venosis maculis duabus pallide flavis.*

Habitat in Japonia.

*Corpus*

*Corpus* oblongum, flavescent, glabrum.

*Caput* subtriangulare, oculis glabris prominulis.

*Antennae* setaceae, nigrae, thorace longiores.

*Maxillae* nigrae.

*Thorax* lineari-oblongus, linea nigra utrinque ab oculis ad basin thoracis ducta.

*Alae* quatuor, subaequales, deflexae, obtusae, costa elevata et linea a costa fere ad apicem extra quam margo productus venis parallelis, hyalinae venis reticulatis, maculis duabus lutescentibus obsoletis, una ante, altera pone medium, corpore multo latiores et duplo longiores.

---

DISSERTATIO  
SISTENS  
NOVAS INSECTORUM  
SPECIES.

PARS II.

D. 23. APR. 1783.

RESP.

JOHANNES M. EKELUND.

C I M E X.

*R*ostrum inflexum.

*Pedes* cursorii.

*C. ACAROIDES*: *scutellatus*, ater thorace, scutello, abdomineque albo-marginatis.

Habitat in Capite bonae spei.

*Corpus* magnitudine *C. scarabaeoidis*, totum aterrimum, nitidum, convexum.

*Caput* submarginatum; intra apicem maculae binae, luteae, pellucidae et tria puncta minima lutea sulcum longitudinalem circumstantia.

*Antennae* triarticulae, filiformes, luteae.

*Thorax* et *scutellum* immaculata, laevissima, margine undique luteo-alba.

*Scutellum* cum abdomen tegens.

*Pedes* toti lutei, inermes.

C. SIL-



*C. SILPHOIDES: scutellatus, niger thorace postice, scutello antice, margine linea media maculisque duabus albis.*

*De Gebloemde Schildwantz Stoll. Cimic. p. 19. Pl. IV. 21.*

Habitat in Capite bonae spei.

*Corpus magnitudine C. baccarum, ovatum, glabrum, facie Silphae.*

*Caput angustum, marginatum, antice acuminatum, medio linea elevata, nigrum, punctatum.*

*Antennae sub oculis filiformes, sensim latiores, thorace breviores, nigrae.*

*Thorax convexus, non marginatus, pro capite excisus, punctatus, niger: margo anticus et laterales, et postice dimidia pars thoracis alba.*

*Scutellum magnitudine et latitudine abdominis, nigrum, punctatissimum, obtusum. Margo exterior a medio ad apicem et linea media alba: basis late alba et ad singulū latus macula magna subcordata alba.*

*Hemelytra nigra, margine albo.*

*Alae breviores, nigrae.*

*Pectus nigrum margine antico albo.*

*Abdomen albidum lateribus nigris.*

*Pedes toti nigri.*

*C. DIOPHTHALMUS: scutellatus, ruber thorace punctis duobus nigris, pedibus cyaneis.*

Habitat in Capite bonae spei.

*Corpus magnitudine fere Scarabaei stercorarii, ovatum, exceptis antennis, pedibus et punctis, testaceo-rubrum, glabrum.*

*Antennae filiformes, nigrae. Oculi nigri.*

*Thorax versus marginem anticum punctis duobus nigris notatus.*

*Puncta duo in singulo latere pectoris cyanea.*

*Pedes toti cyanei, inermes, tibiis angulatis.*

**C. MULTIPUNCTATUS:** *scutellatus, ruber thorace  
scutelloque punctis minutissimis plurimis nigris.*  
*De Kameel Kleurige Schildwants. Stoll. Cimic.*  
*p. 40. Pl. IX. 60.*

*Habitat in Capite bonae spei.*

*Corpus magnitudine C. grisei, ovatum, convexum, glabrum, supra rubrum, subtus griseum.*

*Caput rubrum, obtusum oculis nigris.*

*Rostrum inflexum, rubro nigroque varium.*

*Antennae filiformes articulis tribus oblongis nigro rubroque variis, thorace breviores.*

*Thorax laevis, inermis, antice ruber, postice testaceus, convexus, punctis minimis plurimis sparsis nigris.*

*Scutellum totum abdomen tegens, obtusum, basi media rubrum, postice testaceum, convexum, punctis plurimis sparsis nigris minimis.*

*Hemelytra nigra, margine baseos rufescente.*

*Pedes inermes, rufescentes.*

*Pectus et abdomen albida, atomis punctorum minimorum nigrorum grisea.*

**C. GRANDIS:** *scutellatus, rufus maculis thoracis  
tribus scutellique quinque nigris.*

*Habitat in India orientali.*

*Magnitudine fere Scarabaci percorarii, oblongus, convexus, glaber, subtus violaceus, supra sanguineus maculis atris.*

*Caput cyaneum, medio linea nigra.*

*Antennae filiformes, nigrae.*

*Thorax valde convexus, sanguineus; margo anticus angustissime cyaneus; margo posticus niger: in singulo latere punctum nigrum et in medio macula magna atra.*

*Scutellum abdomen tegens, obtusum, glaberrimum, convexus, sanguineus, basi nigrum, quae*

quae nigredo cum thoracis nigredine confluit.  
 Maculae quinque nigrae: una in medio prope  
 basin rotunda; duae pone hanc versus latera  
 oblongae, transversales; una pone has in  
 medio transversa uti fascia et una intra apicem  
 rotunda.

*Pedes nigri.*

In medio abdominis saepe macula sanguinea.

*Differt a C. Druræi situ et numero macularum.*

**C. LILIGERUS:** *scutellatus, ferrugineus scutello  
 punctis nigris duobus, fasciae undulata  
 albida.*

*De Lelydraagster. Stoll. Cimic. p. 40. Pl. IX. 59.*

Habitat prope Swartkops Zoutpan in promon-  
 torii bonae spei interioribus regionibus.

*Corpus magnitudine C. Stockeri, ovatum, con-  
 vexum, glabrum, ferrugineum.*

*Rostrum nigrum, inflexum.*

*Antennae filiformes.*

*Thorax laevis, inermis.*

*Scutellum totum abdomen tegens, obtusum,  
 intra basin in utroque latere punctum nigrum;  
 pone mediam maculae tres angulares, albae,  
 transversae, saepe confluentes et fasciam un-  
 dulatam formantes.*

*Hemelytra nigra, margine exteriori ferruginea.*

*Alae hyalinae, minores.*

*Pectus, abdomen et pedes pallidiora.*

**C. GUTTIGERUS:** *scutellatus, cinereus scutello  
 basi punctis duobus albis.*

Habitat in Japonia.

*Magnitudine C. Scarabaeoidem vix superat.*

*Caput fuscum antennis filiformibus cinereis.*

*Thorax convexus, obtuse spinosus, punctatus,  
 cinereus.*

*Scutellum* abdomen fere totum obtegens, obtusum punctis impressis frequentissimis, subrugosum, cinereum, basi externe puncto utrinque albo.

*Hemelytra* angusta, cinerea impresso-punctata.

*Pectus* et abdomen nigra.

*Pedes* cinerei, inermes.

*C. SPINIFEX*: *spinofus*, *linearis*, *cinereus* *scutello*, *bispinoso*.

*Corpus* lineare facie et magnitudine *C. tipularii*, totum cinereum.

*Caput* triangulare, postice attenuatum.

*Antennae* filiformes, longitudine fere corporis.

*Thorax* sulco transverso divisus, antice muricatus, postice spina tenuissima acutissima horizontaliter exstanti notatus.

*Scutellum* duplici spina tenui setacea notatum, quarum ultima longior, incurva.

*Abdomen* anteriùs angustatum.

*Pedes* aequales, filiformes, villosi.

*C. HISPIDUS*: *spinofus*, *oblongus*, *griseus thorace*, *capite pedibusque hispidis*.

Habitat in Indiis.

*Corpus* oblongum, totum cinereum, fuscomaculatum, longitudine *C. annulati*, sed duplo angustius.

*Caput* triangulare, postice attenuatum, tere-tiusculum, uti *thorax*, *pectus* et *pedes* aculeato-hispidum.

*Antennae* filiformes.

*Rostrum* arcuatum, inflexum.

*Thorax* bilobus, postice utrinque spina acuta.

*Abdomen* oblongo-ovatum margine elevato et nigro-maculato.

C.



**C. ACUTUS:** *spinosus, linearis, cinereus thoracis margine albido, abdomine punctis sex nigris. Magnitudine et facie C. clavati, cinereus.*

*Antennae filiformes, longitudine fere corporis, basibus articularum pallidioribus.*

*Thorax convexus, tenuissime punctato-rugosus, obsolete spinosus, margine albido.*

*Abdomen pallidum maculis tribus utrinque fuscis majusculis.*

*Pedes aequales, inermes, glabri.*

**C. CLAVATUS:** *spinosus, lineari-oblongus, ferrugine femoribus posticis incrassatis, scutello immaculato.*

*Habitat in Japonia.*

*Corpus lineari-oblongum, testaceum, magnitudine C. annulati sed paullo angustius.*

*Caput triangulare oculis prominulis.*

*Antennae filiformes, corpore dimidio breviores.*

*Thorax punctis minimis nigris muricatus, antice declivus, postice acute spinosus.*

*Scutellum immaculatum, uti et elytra.*

*Pectus et abdomen punctis nigris minimis absque ordine sparsis.*

*Femora postica elongata et incrassata, interne 3-spinosa.*

**C. JACULUS:** *spinosus, linearis, fuscus femoribus posticis incrassatis spinosis, scutello linea alba.*

*Magnitudine et facie C. pilosi, totus fusco-ferrugineus, tenuissime villosus.*

*Antennae filiformes, corpore dimidio breviores.*

*Thorax antice parum declivus, postice spinosus, tenuissime punctato-rugosus.*

*Scutellum nigrum, linea longitudinali alba.*

*Pectus latere superiori rufescens.*

*Femo-*

*Femora* postice elongata et incrassata, interne spinulis minimis ferrulata; tibiae incurvae, apice unispinosae.

**C. PILOSUS:** *spinosus, linearis, ferrugineus linea capitis pectorisque lateralis albida.*

*Corpus* lineari-oblongum, *C. clavato* paullo minus, supra ferrugineum, subtus pallidum, linea lateralis utrinque capitis et interrupta pectoris albida.

*Antennae* filiformes.

*Thorax* antice declivus, postice spinosus.

*Apex scutelli* albus.

*Femora* postica elongata et incrassata, villosa, interne spinis pluribus armata.

**C. VILLOSUS:** *spinoso-tuberculatus, totus piceus villosus.*

*De Bonte Ruypoot. Stoll. Cim. p. 57. Pl. XIII. 90.*

*Corpus C. annulato* majus, oblongum, totum piceum.

*Villosae* sunt *antennae* filiformes, *rostrum* arcuatum, *thorax*, *abdomen* et imprimis *pedes*.

*Thorax* antice lobatus cruce impressa, postice tuberculatus et obsolete spinosus.

**C. CRUX:** *spinosus, niger thorace flavo: cruce nigra.*

*Het Swarte Kruis. Stoll. Cimic. p. 43. Pl. IX. 65.*

Habitat prope Swartkops Zoutpan in Capite bonae spei.

*Corpus* magnitudine *C. personati*, oblongum.

*Caput* nigrum *rostro* arcuato, inflexo, nigro.

*Thorax* convexus, rotundatus, luteus cruce impressa nigra, nodulosus obsolete spinosus.

*Scutellum* brevissimum, bicallosum, nigrum.

*Hemelytra* brevissima, lutea; membrana fere totum elytron constituens, nigra, immaculata.

*Pectus*

*Pectus atrum.*

*Abdomen nigrum, subtrigonum medio macula magna et marginibus elevatis flavis.*

*Pedes nigri, tibiis anticis luteo nigroque lineatis.*

*Femora mutica.*

*C. PUNGENS: spinosus, oblongus, supra fuscus, subtus albidus pectore abdominisque lateribus nigro-punctatis.*

*Habitat in promontorio bonae spei Africes.*

*Corpus magnitudine C. annulati, oblongum, glabrum, supra cinereum punctis fuscis copiosissimis adpersum, subtus albidum.*

*Antennae filiformes corporis dimidia longitudine, articulis quatuor, quorum baseos totus fuscus, 2 et 3 basi rubri, apice fusci; 4 totus rufus et paullo crassior.*

*Thorax postice utrinque in spinam acutissimam exstantem productus, antice declivus.*

*Scutellum breve apice nigro.*

*Pectus utrinque punctis duobus nigris parvis notatum.*

*Abdominis margines utrinque punctis tribus nigris.*

*Femora inermia, cinerea.*

*Tibiae et plantae fusco-cinereae.*

*C. NOTATUS: spinosus, oblongus, supra ferrugineus, subtus cinereus abdomine sextuplici serie punctorum nigrorum.*

*Habitat in promontorio bonae spei.*

*Corpus vix magnitudine C. annulati, oblongum, glabrum, fusco-ferrugineum, punctis frequentissimis impressis subrugosum, subtus cinereum.*

*Antennae filiformes, immacolatae, longitudine dimidia corporis, ultimo articulo crassiori.*

*Thorax antice declivus, postice elevatus, in spinam utrinque acutam productus; spina postice subserrato-scabra, supra fusca.*

*Scutel-*

*Scutellum* breve, acutum, immaculatum.

*Pectus* et *abdomen* latere utroque serie triplici punctorum minutissimorum nigrorum notata.

*Pedes* cinerei, inermes.

**C. TRIGONUS:** *spinosus, testaceus hemelytris scutelloque puncto albo.*

*De Bont-Sprict. Stoll. Cimic. p. 50. Pl. XI. 78, 79.*

Habitat in Japonia et Surinamo.

Magnitudine *C. abietis* totus flavo-cinereus, fere pallide testaceus, subtrigonus, glaber, impresso-punctatus.

*Antennae* filiformes, articulorum quatuor, articulo ultimo breviori et crassiori.

*Caput* supra punctis duobus minutissimis nigris.

*Thorax* antice declivus punctis duobus minutis nigris, postice acute spinosus.

*Scutelli* apex ultimus et *hemelytron* singulum ad angulum ani puncto minuto albo

*Abdomen* obsolete carinatum, serie triplici punctorum nigrorum.

*Femora* et *tibiae* inermes.

**C. MURICATUS:** *spinosus, oblongus, cinereus, muricatus tibiis posticis basi dilatatis.*

Habitat in Africes bonae spei promontorio.

*Corpus* magnitudine *C. lyoscyami*, ovato-oblongum, totum cinereum et muricatum.

*Caput* linea elevata.

*Oculi* minimi, fusci.

*Antennae* filiformes, thorace paullo longiores, pilis brevibus erectis undique hispidae, articulis quatuor quorum ultimis ovatus, tres infimi subtertagono-agulati cum sulco impresso.

*Thorax* antice declivus, postice dilatatus et in spinam latiusculam productus, medio linea ele-



elevata obtusa carinatus. margine ciliato-ferratus, supra undique tuberculis exasperatus. *Hemelytra* scabra, margine baseos ciliata: membrana hyalino-cinerea punctis minimis fuscis. *Pedes* undique tuberculis parvis setigeris muricati. *Femora* postica longiora et crassiora. *Tibiae* posticae compressae, basi intus dilatatae. *Similis* *C. femorato* tibiis posticis compressis, sed hic multoties minor, undique muricatus et *thorace* postice spinosus.

*C. UNIPUNCTATUS*: spinosus, oblongus, testaceus puncto singuli hemelytri nigro.

Habitat in Japonia.

*Magnitudine* *C. trigono* plus duplo major, oblongus, glaber, supra testaceus, subtus subcinereus.

*Caput* emarginatum.

*Antennae* filiformes, corpore dimidio breviores, quadriarticulatae.

*Thorax* antice declivus, postice obsolete spinosus, marginatus subtilissime punctatus.

*Hemelytra* in medio puncto minuto nigra.

*Pectus* utrinque punctis duobus minimis nigris.

*Pedes* inermes.

*C. THORACICUS*: spinosus, oblongus, viridi-aureus thoracis margine luteo.

*De Goudglandzige Wantz. Stoll. Cimic. p. 38. Pl. VIII. 55. A.*

Habitat in India orientali et Surinamo.

*Corpus* magnitudine *C. annulati*, sed longius, supra aureo-viride, subtus flavescens, glabrum.

*Caput* punctis duobus flavis inter oculos.

*Rostri* basis flava.

*Thorax* antice declivus, attenuatus et rotundatus, postice in spinam horizontalem acutam exiens;

exiens; saturate viridis punctis micantibus elevatis; linea curva a margine antico ad spinas lutea.

*Scutellum* et *hemelytra* venis elevatis, punctatis, nitidis.

*Pectus* utrinque lineis tribus viridibus.

*Abdominis* margo maculatus.

**C. ANALIS:** *spinofus, oblongus, viridis abdomine rubro, ano nigro.*

*Het Swart Gatje. Stoll. Cam. p. 46. Pl. X. 72. B.*

Habitat in India orientali et Surinamo.

*Magnitudo C. thoracici.* sed paullo latior.

*Antennae* filiformes. nigrae, articulis basi albis, corpore dimidio breviores.

*Stemmata* duo glauca inter oculos.

*Thorax* convexus, viridis, subrugosus, antice punctis glomeratis elevatis muricatus, postice obsolete-spinosus, margine omni flavescens.

*Scutellum* breve, viride: margine flavescente,

*Hemelytra* obscure viridia venis elevatis, virentibus.

*Pectus femora* et *anus* nigra.

*Abdomen* subtus et supra sanguineum.

*Femora* postica incrassata, spina valida curva alba in medio, et *tibiae* albae, infra basin spina minori armatae.

**C. TRANSVERSUS:** *spinofus, rotundatus, viridis capite thoracique antice flavis.*

Habitat in Africa, in Capite bonae spei.

*Corpus* magnitudine *C juniperini*, ovatum, depressiusculum, impresso-punctatum, totum viride, glabrum.

*Caput* antice pallide luteum, fulco duplici tenuissimo impresso, postice viride.

*Rostrum*

*Rostrum* inflexum, longitudine pectoris, viride extus linea fusca.

*Antennae* filiformes.

*Thorax* convexus, productus medio in angulos utrinque obtusos, viridis margine antico pallide luteo.

*Scutellum* longitudine dimidia abdominis obtusiusculum, immaculatum.

*Hemelytrorum* membrana hyalina, tenuissima, immaculata; *alae* hyalinae.

*Femora* inermia, *tibiis* angulatis.

*C. HUMERALIS*: *spinofus*, *ovatus*, *viridis* *hemelytris* *basi* *luteis*.

*C. juniperino* quadruplo major, quadrangulariovatus, supra saturate, subtus pallide viridis, impressio-punctatus.

*Thorax* antice declivus, medio in angulos alatos, acutos, integros productus.

*Scutellum* longius abdomine dimidio, obtusum.

*Hemelytra* basi linea lutea in ipso margine.

*Abdomen* ferratum ferraturis nigris, ano quadridentato.

*Femora* inermia.

*C. SUBULATUS*: *spinofus*, *ovatus*, *virescens* *scutelli* *linea* *elevata* *subulata*.

*Magnitudine* et *facie* *C. humeralis*, supra fusco-viridis, subtus albidus, obsolete et tenuissime punctatus.

*Caput*, *antennae*, *thorax* antice flavescentia.

*Thorax* antice declivus, medio in angulos obtusiusculos productus, marginatus.

*Scutellum* flavo-virescens, longitudine dimidia abdominis, medio linea elevata, subulata, basin non attingente, spinosum.

*Hemelytra* venis elevatis.

*Abdomen* supra violaceum, nitidum, margine ferratum, ano acute quadridentato.

*Femora* inermia.

**C. COMMA:** *spinofus, rotundatus, cinereus* scutello linea flava.

Habitat in capite bonae spei.

*Corpus* magnitudine *C. baccarum*, ovatum, totum fusco-ferugineum seu cinereum, punctis impressis fuscis copiosissimis adpersum.

*Caput* emarginatum, ferratum.

*Antennae* filiformes, rufescentes apice nigro, longitudine thoracis.

*Thorax* convexus, postice productus in angulum utrinque obtusum, postice truncatus.

*Scutellum* longitudine fere abdominis, obtusum, linea longitudinali flavescente.

*Femora* mutica.

**C. RETICULATUS:** *spinofus, ovatus, cinereus, nigro varius, thorace serrato.*

Stoll. Cimic. Pl. XVI. III.

Habitat in Capite bonae spei.

*Corpus* magnitudine *C. baccarum*, depressiusculum, ovatum, glabrum.

*Caput, thorax, scutellum et elytra* fusco-cinerea lineis anastomosantibus punctisque impressis nigris varia.

*Subtus* omnia cinereo-fusca.

*Caput* ferratum, emarginatum oculis nigris.

*Antennae* filiformes, rufescentes.

*Thorax* planiusculus, postice elatior et in spinam utrinque obtusam, crenatam productus, lateribus serrulatus.

*Scutellum* abdomine dimidio brevius, obtusum.

*Hemelytra* integra membrana hyalina, nigris venis pulcherrime reticulata. *Alae* nigrae.

*Pectus* lateribus lunulis fuscis.

*Pedes*



*Pedes* toti cinerei, femoribus inermibus et tibiis angulatis.

**C. FULLO:** *spinosus, ovatus, niger, albo-irrotatus, capite thoracique linea alba.*

Habitat in Japonia, in insula Dezima satis vulgaris.

*Magnitudine* superat *C. rufipedem*, totus uti *Scarabaeus fullo* niger, maculis albis irregularibus minutis imprimis supra irrotatus et impressis variolosus.

*Caput* ferratum marginibus et linea media albis.

*Antenna* filiformes, longitudine thoracis. nigrae.

*Thorax* convexus, marginatus, linea media et margine tenuissime crenulato-albis, postice obsolete spinosus

*Scutellum* longitudine dimidia abdominis.

*Hemelytra* in medio immaculata.

*Abdominis* margines albo nigroque maculati.

*Pedes* albo et nigro alternatim maculati.

**C. TIBIALIS:** *spinosus, ovatus, brunneus, albo fuscoque lineatus, scutello maculis tribus albis.*

*Magnitudine* *C. baccarum*, ovatus, depressus, glaber, brunneus lineis nigris et albis sparsis.

*Caput* lineis quatuor albis, duabus intermediis basin non attingentibus.

*Thorax* convexus. lateribus albus, linea intra marginem utrinque et in medio fusca, albo-irrotatus, acute spinosus.

*Scutellum* longitudine dimidia abdominis. fuscum apice albo, maculis baseos duabus albis, obsoletis.

*Hemelytra* albo-irrotata, linea fusca marginis exterioris inter lineas albas tenuiores collocata.

*Abdomen* ferratum, ferrugineum lineis albis.

*Pedes inermes: femora et tibiae* posticorum parum incrassata, elongata.

*C. SULCATUS: spinosus, ovatus, cinereus, fusco-nebulosus abdomine sulcato.*

*De Spitskop. Stoll. Cimic. p. 33. Pl. VI. 47.*

*Habitat in India orientali, in Coromandelia et alibi.*

*C. baccarum paullo major, ovatus, depressus, supra totus cinereus lineis tenuissimis et punctis irregularibus, punctisque impressis nigris nebulosus, uti et subtus, licet ibi abdomen pallidius.*

*Caput productum, serratum, rostro longitudine fere corporis.*

*Thoracis margo antice crenulatus, postice spinosus.*

*Scutellum abdomine dimidio longius, obtusiusculum.*

*Abdomen serratum serraturis nigris, medio sulco longitudinali.*

*Femora et tibiae inermes.*

*C. FUSCUS: spinosus, oblongus, ferrugineo-fuscus antennis pedibusque hirsutis.*

*Magnitudo fere C. valgi, oblongus, totus cinereo-fuscus.*

*Antennae filiformes pilis densissimis brevibus totae hirtae, corpore dimidio breviores.*

*Thorax antice declivus, postice elevatus in alas obsolete spinosas, subrugosus.*

*Hemelytrorum apices fusco-maculati.*

*Abdomen supra concavum, hemelytris latius, subserratum, margine flavo nigroque maculatum et tenuissime ciliatum.*

*Pedes inermes, aequales, toti uti antennae hirsutae.*

*C. SORDIDUS: spinosus, cinereus thorace denticulato, antennis pedibusque piloso-hispidis.*

Habi-

Habitat in Japonia.

*Magnitudine C. marginati*, totus sordide cinereus.

*Antennae et pedes pilis hispidis.*

*Thorax valde declivus, obsolete spinosus, denticulatus.*

*Hemelytrorum membrana nigra.*

*Femora postica incrassata.*

*Abdomen supra sanguineum, marginibus eleuatis.*

*C. JAVANICUS: ovatus, luteus ano obtuso, antennis pedibusque ferrugineis.*

*De Iavaner. Stoll. Cimic. p. 9. Pl. I. 2.*

Maximos inter Cimices, aequae fere latus ac longus, totus luteus, immaculatus, glaber.

*Antennae filiformes, compressae, brunneae.*

*Thorax convexus, rotundatus, postice angustatus et transversus.*

*Abdomen ferratum, ano obtusissimo.*

*Pedes omnes angulati, brunnei, femoribus spinosis prope articulum.*

*C. CHINENSIS: ovatus, flavescens ano quadridentato, sterno porrecto.*

Habitat in Japonia et China.

E maximis hic Cimex singularis sterno suo porrecto, ovatus, glaber, totus immaculatus, cinereo-flavescens.

*Antennae filiformes, compressae, uti pedes angulati, paullo obscuriores.*

*Sternum planatum, porrectum.*

*Abdomen ferratum ano quadridentato.*

*Femora prope genu spinosa.*

*Similis C. Iavanico: antennis compressis, sterno porrecto et colore lutescente; differt vero quod minor et anus quadridentatus.*

*C. BRUNNEUS: ovatus, supra brunneus, subtus fuscus antennis pilosis.*

Habitat in India orientali.

*C. rufipede* paullo major, ovatus, glaber.

Caput fuscum oculis prominulis nigris.

Antennae compressae, pilosae.

Thorax marginatus, scutellum obrusum et elytra brunnea, tenuissime subrugosa.

Pectus et abdomen fusco-ferrugineum, serratum.

Pedes magis fusci; femora ciliato-ferrata; tibiae angulatae, villosae.

*C. INCARNATUS*: ovatus, ruber thorace antice hemelytris sicut illoque maculis duabus violaceis.

De Incarnat Kleurige Wantz. Stoll. Cimic. p. 14.

Pl. II. 10. A.

De Oranje Kleurige Wantz. Stoll. Cimic. p. 29.

Pl. VI. 39.

*Cimex aurantius*. Sulzer Gesch. ins. p. 96. N. 10. t. 10. fig. 100.

*Cimex incarnatus*. Drury ins. Tom. 2. p. 67. tab. 36. fig. 5.

Habitat in Bengala, Coromandelia, Ceilona et alibi.

Inter maximos Cimices numerandus, ovatus, supra sanguineus, subtus luteus, glaberrimus.

Caput nigrum oculis piceis, rostro antennisque filiformibus, nigris.

Thorax convexus, marginatus, marginibus antico et lateralibus violaceis.

Scutellum longitudine dimidia abdominis, acutum, basi maculis duabus quadratis, violaceis.

Hemelytra maculis duabus quadratis et apicibus violaceis.

Pectus et abdomen luteum maculis marginalibus violaceis.

Sternum porrectum acumine brevi.

Pedes angulati, nigri.

Maculae scutelli interdum obsoletae.

C. AN-



*C. ANCHORA*: rotundatus, thorace hemelytris-  
que maculis sex nigris, scutello anchora alba.

Habitat in laponia et China.

Magnitudine *C. grisei*, rotundus, convexus,  
supra sanguineus, subtus luteus, glaber.

Caput linea apicis et baseos non cohaerentibus,  
margine postico et oculis nigris.

Thorax convexus, lateribus sanguineus, medio  
luteus, antice maculis duabus oblongis, po-  
stice quatuor quadratis nigris.

Scutellum longitudine fere abdominis, obtusum,  
nigrum figura anchorae alba medio rubra.

Hemelytron singulum maculis tribus atris, mem-  
brana nigra, apice albo.

Pectus et abdomen luteo-alba serie sextuplici  
macularum nigrarum subquadrangularem.

Pedes inermes, rubri, femoribus puncto nigro.

Differt a *C. Cruciato* colore, maculis et figura.

*C. FIMBRIATUS*: rotundatus, niger thoracis ely-  
trorumque marginibus rubris.

Habitat in Capite bonae spei.

Corpus magnitudine *C. oleraceo* paullo majus,  
ovatum, depressiusculum, glaberrimum.

Caput atrum, submarginatum.

Antennae filiformes, ultimis duobus articulis  
paullo crassioribus, atrae, longitudine thoracis.

Thorax convexus, inermis, impresso-punctatus,  
ater marginibus lateralibus et postice rubris.

Scutellum longitudine dimidia abdominis, obtu-  
siusculum, atrum.

Hemelytra impresso-punctata, atra, margine  
omni rufa, apicibus atris.

Abdomen atrum, immaculatum.

Pectus atrum fascia obscura sanguinea.

Pedes atri, inermes, tibiis pilosis.

*Varietas: α) thoracis elytrorumque marginibus tenue rubris: fascia pectoris sanguinea unica obscura.*

*β) thoracis elytrorumque marginibus late rubris, abdominis marginibus medioque et pectoris fascia saturate sanguineis.*

**C. VARIEGATUS:** *rotundatus, nigro cinereoque varius, scutello punctis duobus flavis, capite thoraceque albo-lineatis.*

*Corpus magnitudine C. grisei, ovatum, depressum, totum punctatissimum imprimis supra.*

*Caput nigrum, lateribus lineisque tribus albis.*

*Rostrum pallidum, subtus fuscum, inflexum.*

*Antennae filiformes, capitis thoracisque longitudine, articulis 5, fuscae, basi nigrae.*

*Thorax plano-convexus, marginatus, fusco-cinereus: antice emarginatus margine albo, pone illum marginem fascia nigra, puncto utrinque minimo albo; latera flava; antice macula flava; lineae quinque albae a fascia nigra ad marginem posticum ducta.*

*Scutellum basi nigrum, apicem versus cinereum linea cinerea: ante medium puncta duo flava.*

*Hemelytra nigra, venis elevatis cinereis: a basi linea flava, bilida et oblique introrsum ducta marginae postico flavescente ut signum § referat.*

*Pectus et caput infra flavo-cinerea.*

*Abdomen flavescens margine anoque albidis; segmento singulo utrinque puncto nigro impresso minimo. Dorsum nigrum maculis marginalibus albis.*

*Pedes inermes, pallidi; femora ad genicula flavescencia, latere exteriori puncto minimo nigro.*

**C. VENOSUS:** *rotundatus, ruber, fusco-pictus, abdomine serie sextuplici punctorum nigrorum.*

Habi-

Habitat in promontorio bonae spei.

*Corpus* magnitudine *C. oleracei*, ovatum, depressum, rubrum, subtus punctis nigris, supra punctis et atomis fuscis, impresso-punctatum.

*Caput* integrum, margine lineisque duabus nigris.

*Rostrum* inflexum, articulatum, pectore longius.

*Antennae* filiformes, nigrae.

*Thorax* rotundato-angulatus, muticus.

*Scutellum* longitudine dimidia abdominis, obtusum.

*Hemelytra* margine fusco-reticulata, apice hyalino: venis subramosis, fuscis.

*Alae* fuscae linea intra marginem anteriorem a basi ad medium rubra.

*Femora* rubra puncto nigro, inermia; *tibiae* fuscae.

*Pectus* punctis utrinque tribus nigris.

*Abdomen* utrinque in margine punctis quinque nigris; praeterea series punctorum nigrorum parvorum in singulo segmento unico intra marginem et juxta medium abdominis series alia punctorum nigrorum.

*C. COSTATUS*: ovatus, cinereus linea hemelytrorum nigra.

Habitat in interioribus regionibus Capitis bonae spei.

Magnitudine *C. oleraceo* paullo major, totus cinereus, glaber, tenuissime impresso-punctatus.

*Antennae* filiformes.

Linea tenuis nigra in medio singuli hemelytri, apicem non attingens; apices nigri.

*Femora* inermia; *tibiae* pilosae.

*C. CORNUTUS*: ovatus, depressus, cinereus thorace lineis tribus elevatis, antennis fusiformibus.

Habitat in Japonia.



*Magnitudine et facie C. cardui*, depressus; supra cinereus, nigro-reticulatus; subtus obscurior seu ferrugineus, glaber.

*Antennae erectae*, fusiformes, hirtae, longitudine thoracis, quatuor articulorum, quorum ultimi globosi, fusiformes.

*Thorax* convexus, marginatus, lineis tribus elevatis carinatus.

*Differt facile a C. Cardui*, cui valde similis, *antennis fusiformibus et colore magis flavescente*.

*O. MELALEUCUS*; ovatus, ater hemelytris albis: maculis duabus nigris.

*Habitat in Capite bonae spei.*

*Magnitudine C. scarabaeoides*, ovatus, totus ater, nitidus.

*Antennae pallidae* articulis sensim crassioribus.

*Thoracis* margines laterales tenuissime albi.

*Scutellum* longitudine dimidia abdominis, immaculatum.

*Hemelytra* alba maculis duabus nigris, bascos minori, apicis rhombea majori; apices albi.

*Pedes* pallidiores tibiis pilosis.

*C. HIRTUS*: ovatus, ater, totus hirtus.

*Habitat in Capite bonae spei.*

*Magnitudine C. oleracei*, ovatus, punctatus, ater, non nitidus.

*Caput, thorax, scutellum, abdomen et hemelytra parum pedesque* pilis erectis nigris hirsuta.

*Femora* crassa, inermia.

*C. NIGER*: ovatus, ater thorace tibiisque ciliatis.

*Habitat in Capite bonae spei et Indiis vulgaris.*

*Corpus* magnitudine *C. oleracei* vel paullo majus, totum aterrimum exceptis apicibus hemelytrorum alisque lacteis, tenuissime punctatum, nitidum.

*Caput*



*Caput* marginatum, subemarginatum.

*Antennae* fuscae, articulis sensim crassioribus.

*Thorax* antice subretusus et *elytra* margine pilis raris distinctis. imprimis vero *tibiae* pilis verticillatis ciliatae.

*Femora* crassa, inermia, parum ciliata.

*Variat* magnitudine quadrupla et octupla.

**C. CARNIFEX:** oblongus, rufus antennis rostro tibiisque nigris.

*Cimex carnifex.* Fabric. Syst. Entomol. p. 781.

Habitat in Tanaceto chritmifolio, infra Tafelberg Cap. bon. sp.

Magnitudine *C. Rolandri*, oblongus.

*Caput* rufum supra a medio ad rostrum linea nigra glabra, oculi rostrumque inflexum nigra, glabra.

*Antennae* filiformes, capite thoraceque paullo longiores, articulis quatuor nigris.

*Thorax* oblongo-quadratus, rufus. antice linea transversa impressa: pone *thoracem* fascia nigra: *Scutellum* rubrum.

*Elytra* rubra, laeviter rugoso-punctata: membrana nigra.

*Collum* album.

*Pectus* rubrum, glabrum, lineis tribus transversis albidis, desinentibus ad femora in totidem puncta alba.

*Abdomen* totum rubrum, glabrum, incisuris nigris ad latera.

*Femora* rubra, glabra, geniculis tibiisque nigris.

**C. BILINEATUS:** oblongus, supra sanguineus thorace *elytris* scutelloque albo-marginatis.

Habitat in Capite bonae spei.

Corpus

*Corpus* magnitudine *C. pratensis*, oblongum, glabrum.

*Caput* rufescens, medio sulcatum, impresso-punctatum, conico acutum.

*Antennae* articulis tribus fuscis, infimo rubro, filiformes.

*Rostrum* inflexum, cinereo-rufescens.

*Oculi* et margo *capitis* nigri.

*Thorax* angulatus, convexus, impresso-punctatus, linea media elevata, ruber marginibus lateralibus albis.

*Scutellum* longitudine dimidia abdominis, rubrum, albo-marginatum, linea elevata, impresso-punctatum.

*Pectus* et *abdomen* livida seu cinerea.

*Pedes* cinereo-rufescentes. *Femora* mutica.

*Digit*i unguiculati.

DISSERTATIO  
SISTENS  
NOVAS INSECTORUM  
SPECIES.

PARS III.

D. 25. MAJI. 1784.

RESP.

DAVID LUNDAHL.

CIMEX.

**C.** ADSPERSUS: *oblongus, subtus cinereus nigro-punctatus, supra ferrugineus, fusco marginatus.*

*Corpus* magnitudine *C. equestris*, oblongum, glabrum.

*Caput* subtus griseum, supra ferrugineum marginibus fuscis.

*Rostrum* cinereum, inflexum.

*Oculi* nigri.

*Antennae* filiformes articulis quatuor, infimo nigro, reliquis rubris apice nigris, ultimo toto rubro, corpore breviores.

*Thorax* angulatus, convexus, ferrugineus, marginibus niger, impresso-punctatus.

*Hemelytra* ferruginea, margine exteriori fusca, punctatissima.

*Alae*

*Alae nigrae.*

*Scutellum breve, ferrugineum.*

*Pectus et abdomen cinerea, punctis minutis nigris adspersa.*

*Pedes toti nigri femoribus muticis.*

*Dorsum abdominis rufescens ano supra nigro.*

**C. HASTICORNIS:** *oblongus, rufus pectore abdomineque fasciis albis nigrisque, antennarum penultimo articulo compresso rotundato.*

*Habitat in Aitonia Capensi prope flangrivier promont. b spei, mense Decembri.*

*Corpus magnitudine C. personati, oblongum, glabrum.*

*Caput testaceum oculis concoloribus vel fuscis.*

*Rostrum inflexum, fuscum, pectore fere longius.*

*Antennae atrae articulis quatuor, quorum penultimus compressus, dilatatus et suborbiculatus est, corporis fere longitudine.*

*Thorax postice elevatus, inermis, testaceus.*

*Scutellum breve, obtusum, testaceum.*

*Hemelytra in alterutro sexu testacea, integra, in altero atra, membrana atra. immaculata.*

*Pectus et abdomen sanguinea; incisurae singulae notae fascia alba, cui adjacet fascia nigra.*

*Pedes toti atrii femoribus muticis.*

*Antennae in hac specie quam maxime singulares.*

**C. HEXOPHTALMUS:** *oblongus, supra cinereus, subtus albus pectore fasciis tribus sanguineis.*

*Habitat in Capite bonae spei.*

*Corpus magnitudine C. annulati, oblongum.*

*Caput rubrum medio nigrum.*

*Oculi rufescentes: pone singulorum oculum puncta duo elevata, altero glaberrimo.*

*Antennae filiformes, nigrae.*

*Tho.*



*Thorax* convexus, postice elevatus, inermis, antice fascia nigra sub-abrupta, marginibus lateralibus et postico rubris, medio linea elevata, fusco-cinereus.

*Scutellum* breve, hemelytris concolor.

*Hemelytra* fusco-cinerea, margine prope membranam rufescente: membrana nigra.

*Rostrum* inflexum, nigrum, longitudine pectoris.

*Pectus* albidum fasciis tribus sanguineis, obsoletis.

*Abdomen* albidum, immaculatum.

*Pedes* toti nigri femoribus muticis.

*C. AULICUS*  $\beta$ . *CROCATUS*: oblongus, luteo nigroque varius, elytris maculis quatuor, thorace duabus croceis.

Habitat in Capite bonae spei.

*Corpus* magnitudine *C. equestris*, oblongum.

*Caput* nigrum, macula triangulari crocea.

*Rostrum* inflexum, nigrum.

*Antennae* filiformes, nigrae, pectore longiores.

*Thorax* convexus, rotundatus, inermis, ater, carinatus, margine antico maculis duabus subcontiguis transversis croceis.

*Scutellum* breve, atrum.

*Hemelytra* integra, atra: singulum macula duplici magna, crocea, una in basi, altera versus membranam: membrana nigra, maculis duabus albis.

*Pectus* et *abdomen* atra fasciis croceis.

*Pedes* toti atri, femoribus muticis.

*C. SUPERSTITIOSUS*: oblongus, rufus thorace fascia nigra alba adjecta, elytris puncto nigro.

*Cimex supersticiosus*. *Fabricii spec. Insectorum* 2. p. 364. *Syst. Ent.* p. 719.

Habitat in Capite bonae spei.

*Corpus* magnitudine *C. equestris*, oblongum, glabrum.

*Caput*

*Caput* rubrum, *oculis*, *rostro inflexo* *antennisque* nigris.

*Thorax* quadratus, *marginibus* undique elevato, antico *marginibus* albo *adjacente* fascia nigra.

*Scutellum* rubrum.

*Hemelytra* sanguinea puncto in singulo unico et membrana nigris.

*Pectus* et *Abdomen* tota cincta fasciis albis et nigris.

*Pedes* nigri, *femoribus* muticis.

**C. ALBIDUS:** oblongus, rubro nigroque varius membrana hemelytrorum nivea.

*De Zierlyke Witgetipte Wantz. Stoll. Cimic. p. 50. t. 2. fig. 80.*

*Habitat* in Capite bonae spei et Surinamo.

*Corpus* magnitudine *C. equestris*, totum punctis lineisque rubris nigrisque varium.

*Antennae*, *rostrum*, *scutellum* et *pedes* inermes toti nigri.

*Caput* nigrum linea postice nigra.

*Thorax* niger, lateribus antice puncto utrinque rubro, marginibus lateralibus et postico, lineaque media rubris.

*Hemelytra* rubra, *marginibus* externo et postico nigris, linea nigra intra *marginem* interiorem et alia in medio cum puncto in disco; membranae tenuissimae, niveae.

*Pectus* nigrum, punctis utrinque tribus coccineis.

*Abdomen* rubrum incisuris tenuissime nigris et in utroque latere ordo duplex punctorum nigrorum.

**C. ANDRAEAE:** oblongus, sanguineus hemelytris nigris, thorace cruce impressa.

*Varietas*  $\beta$ . thorace nigro, oblongus, *C. annulato* longior, totus glaber.

Habi-

Habitat in Japonia.

Nigra nitida sunt *caput, rostrum inflexum, antennae, incisurae abdominis, pedes, pedus, thorax, anus.*

*Thorax 4-lobus cruce impressa.*

*Scutellum bicallosum.*

*Hemelytra atra, obscura, tenuia, immaculata.*

*Abdomen sanguineum, lateribus postice violaceo-nigris.*

*Basis femorum inermium rubra, et basis hemelytrorum alba.*

**C. PURPUREUS:** *oblongus, sanguineus capite membrana hemelytrorum pedibusque nigris.*

Habitat in Capite bonae spei.

*Corpus oblongum, statura C. annulati sed multo angustius, sanguineum, immaculatum, glaberrimum.*

*Nigra sunt antennae filiformes, rostrum inflexum, caput triangulare, pedes et membrana hemelytrorum.*

*Pedes inermes, villosi.*

*Macula hemelytrorum rotunda, non exiensque ad apices, qui hyalini sunt.*

**C. COLON:** *oblongo-ovatus, rubro nigroque variis membranis hemelytrorum albo: puncto nigro.*

Habitat in Japonia.

*Magnitudine C. campestris, ovato-oblongus, postice latior, rubro nigroque maculatus.*

*Antennae filiformi-clavatae.*

*Hemelytrorum membrana hyalina puncto minuto nigro.*

**C. AUGUR:** *oblongus, rufus antennis, alis pedibusque nigris.*

*De Pedel Wantz. Stoll. Cim. p. 73. t. 18. fig. 124.*

*De Roode Ringvalx. ibid. p. 57. t. 13. fig. 89.*  
hujus varietas videtur.

Habitat in Capite bonae spei, China et Coromandeliam.

Corpus *C. equestris* majus, oblongum.

Caput triangulare, totum rubrum.

Thorax quadratus, postice latior, depressus, linea transversa impressa.

Hemelytra rubra, immaculata.

Abdomen ovatum seu postice crassius, obtusum.

Var. α) totus sanguineus, exceptis antennis, membranis hemelytrorum et tibiis nigris.

β) supra sanguineus, antennis, rostro, pectore, incisuris abdominis albis, pedibus et membranis hemelytrorum nigris.

γ) Supra rufus, scutello, thorace antice apicibusque antennarum nigris; subtus pectore, rostro, abdomine pedibusque nigris. Abdomen postice nigrum; membranae hemelytrorum niveae punctis duobus fuscis.

δ) Hemelytris rubris membranis albis, thorace, pectore, basi abdominis, basi scutelli, antennis in medio pedibusque nigris: Abdomen apice rubrum: fascia alba in pectore utrinque.

**C. DEUSTUS:** oblongus, rufo-fuscus scutelli apice, thoracis abdominisque marginibus rubris.

Corpus magnitudine *C. hyoscyami*, oblongum.

Caput cum oculis nigrum: rostrum inflexum articulis quatuor, subulatum, nigrum.

Antennae nigrae, filiformi-clavatae articulis quatuor, ultimo crassiori, cinereo.

Thorax marginatus, niger, marginibus lineaque a medio ad marginem posticum rubris.

Scu.



*Scutellum* nigrum, apice rubro.

*Hemelytra* rufescenti-fusca, quasi deusta, lateribus rubris.

*Pectus* nigrum lineis transversis punctisque ad basin femorum totidem rubris.

*Abdomen* nigrum, marginibus medioque rubris.

*Pedes* omnes nigri, femoribus dentatis ad genicula.

*Similis de Roodgerande Wantz. Stoll. Cimic. p. 56. Pl. XIII. 87. sed diversus.*

**C. NEBULOSUS:** oblongus, flavescens thorace lineis quatuor, hemelytris fasciis tribus fuscis.

Habitat in promontorio bonae spei.

*Statura et magnitudine C. campestris*, oblongus, totus pallide flavus, glaber.

*Thorax* convexus lineis quatuor fuscis.

*Scutellum* lineis duabus fuscis.

*Hemelytra* fasciis tribus, obliquis, fuscis.

**C. CAFFER:** oblongus, niger thorace fascia alba, hemelytris ferrugineis: maculis quatuor albis.

Habitat in Capite bonae spei.

*Magnitudine et statura C. arenarii*, oblongus, glaber.

*Caput* triangulare, nigrum.

*Antennae* basi rufescentes, apice nigrae.

*Thorax* convexus, niger, postice fascia alba cum puncto nigro in angulo.

*Hemelytra* ferruginea, obscure albo-striata: punctum album intra apicem, cui antice adjacet punctum nigrum; membrana nigra: macula alba in apice.

*Pectus*, *abdomen* et *pedes* atra, fascia alba in pectore et alia in anteriori parte abdominis.

**C. ANGUSTATUS:** linearis, niger capite thoraceque elongato.

*Corpus* magnitudine *C. tipularii*, lineare, totum atrum, glabrum.

*Antennae* trium articulorum, filiformes, tenuissimae.

*Caput* elongatum, antice triangulare, postice teres.

*Rostrum* setaceum.

*Oculi* ab antennis remoti, medii inter caput et thoracem.

*Thorax* parum inaequalis.

*Pedes* setacei, longi, *femoribus* rufis, *tibiis* nigris.

*C. OCELLATUS*: *scutellatus*, *supra* *purpureus* *thorace* *spinoso*, *scutello* *ocellis* *senis*.

*Habitat* in *Japonia* et *China*.

*Magnitudine* *C. rufipedis*, oblongus, convexus.

*Caput* purpureum basi lineaque violacea.

*Thorax* convexus, purpureus, angulis dilatatis; spinosis, spina acuta recurva nigra, antice puncta quatuor minuta nigra, postice maculae quatuor luteae.

*Scutellum* totum abdomen tegens, convexum, obtusum, purpureum, ocellis senis iride flava, quorum tres juxta basin, duo in medio transversaliter oblongi, et unus infra apicem saepe caecutiens.

*Antennae*, *caput* subtus, *pectus* violacea.

*Femora* antica rufa, postica basi rubra, ceterum *pedes* violacei.

*Abdomen* rubrum punctis marginalibus quatuor violaceis.

#### M A N T I S.

*Os* maxillosum.

*Antennae* setaceae.

*Thorax* linearis, elongatus.

*Pedes* raptorii.

*M. LABIATA: linearis, virescens, inermis, capitis lateribus viridibus.*

Habitat in India orientali.

*Corpus* lineare, inerme, glabrum, flavo-virescens.

*Caput* oblongo-quadratum medio sulco tenui, virescens, marginibus lateralibus viridibus.

*Antennae* basi luteae, inde virides, longitudine thoracis, filiformes.

*Thorax* lineari-convexus, inermis, viridi-flavescens, antice margine utroque saturate viridi.

*Pedes* angulati, simplices, inermes, virides.

*Alatum insectum non vidi.*

*M. PAUPERATA: thorace apice dilatato spinuloso, femoribus lobo simplici terminatis.*

*Mantis Pauperata Fabricii spec. inf. T. 1. p. 346.*

Habitat in India orientali.

*M. Gongylode* paulo minor et angustior.

*Capitis vertex* productus, subulatus, bifidus, cinereus.

*Thorax* lineari-trigonus, apice alatus, remote spinulosus, cinereus, pollicaris.

*Hemelytra* pallide virescentia, margine exteriori viridi; ante medium linea, commae signo similis, albida.

*Pedes* cinerei fasciis fuscis: femora antica spina, reliqua ala simplici in latere externo notata.

*Anus* serratus.

*M. MACULATA: cinerea thorace alato spinuloso, pedibus intus nigro-maculatis.*

Habitat in Japonia.

*Corpus* lineare, cinereum, glabrum, bipollicare.

*Caput* deflexum, retusum.

*Antennae* setaceae thorace duplo breviores.

*Thorax* trigonus, marginatus, antice alatus, spinosus, longitudine fere dimidia corporis.

*Hemelytra* cinerea, immaculata, reticulata.

*Pedes* antichi raptorii, compressi, angulati; *femora* et *tibiae* latere interiori macula et spinis nigris.

M. NASUTA: *cinerea thorace inermi, capite conico integro.*

Habitat in Capite bonae spei et India orientali. *Linearis, inermis, glabra, cinerea, sesqui-pollicaris.*

*Caput* productum, horizontale, conicum, integrum, (nec bifido vertice) convexum.

*Oculi* oblongi.

*Thorax* linearis, convexus, vix marginatus, inermis, glaber, semipollicaris.

*Hemelytra* et *alae* cinereo-hyalina, reticulata.

*Pedes* simplices absque alis, pallidiores.

M. LOBATA: *virescens, capitis cornu oculisque conico-acuminatis.*

*Mantis lobata. Fabricii spec. inf. T. I. p. 350.*

Habitat in promontorii bonae spei interioribus.

*Corpus* pollicare, virescens, flavo-maculatum.

*Caput* deflexum, valde retusum: stemmata tria nigra inter antennis: supra stemmata cornu minutum inter oculos: *oculi* singulares, conico-acuminati, pellucidi.

*Antennae* setaceae, fuscae, longitudine thoracis.

*Thorax* ovato-angulatus, convexus, inprimis antice eleuatus, marginatus, ferrulatus, vix unguicularis.

*Hemelytra* saturate viridia, reticulata, marginata: infra basin macula minor lutea, et alia in medio magna: circulo nigro et punctis duobus nigris, quorum alter oblongus.

*Alae* basi sanguineae, medio late nigrae, apice virescentes.

*Pedes*



*Pedes angulati, compressi, ciliati, flavescentes fasciis viridibus.*

*M. FAUSTA: linearis, cinereo-fusca, immaculata.*

*Habitat in Capite bonae spei.*

*Numen tutelare Hottentottorum.*

*Inter minores hujus generis, vix pollicaris, linearis. tota cinereo-fusca.*

*Caput deflexum, retusum antennis setaceis, vix thoracis longitudine.*

*Thorax lineari-trigonus, marginatus, integer.*

*Pedes angulati, tenues.*

*Boni ominis animal hanc speciem respiciunt stupidissimi Hottentotti nec vel illi vel aliis, cui insidere contigit, ullam adferunt noxam; non tamen illam, DEI instar, adorare solent.*

#### ELATER.

*Antennae filiformes.*

*Corpus dorso impositum exfiliens mucrone pectoris e foramine abdominis resiliente.*

*E. MELANOCEPHALUS: ruber capite, linea thoracis apiceque elytrorum nigris.*

*Elater melanocephalus. Fabric. spec. Insect. t. 1. p. 272.*

*Habitat in Capite bonae spei et Coromandeliam.*

*E. balteato paulo minor, totus ferrugineo-ruber, glaber, excepto capite, antennis ferratis, linea thoracis, apicibus elytrorum et ano nigris.*

*Thorax valde convexus, glaber: linea nigra basin non attingit.*

*Elytra striato-punctata.*

*E. DEUSTUS: testaceus linea thoracis elytrorumque postice ramosa, nigra.*

*Habitat in Ceilona.*

Inter minores seu *E. melanocephalo* duplo minor,  
tenuissime pubescens.

*Caput* nigrum antennis testaceis.

*Thorax* convexus, laevis, linea nigra apicem  
attingente.

*Elytra* testacea, striato-punctata: linea nigra  
suturae communis, et postice fascia intra  
apices.

*Abdomen* fuscum pedibus pallidis.

*E. LIMBATUS*: thorace atro nitido, elytris testa-  
ceis: limbo nigro.

*Elater limbatus*: Fabric. spec. Insect. T. 1. p. 272.

Habitat in promontorio bonae spei.

*E. FESTIVUS*: thorace ferrugineo, elytris atris:  
fasciis duabus flavis.

*E. Festivus?* Fabric. syst. Entom. p. 215. spec.  
Insect. T. 1. p. 273.

Habitat in Capite bonae spei.

Magnitudine *E. balteati*.

*Caput*, antennae; *abdomen* nigra.

*Thorax* convexus, glaberrimus, sanguineus, ato-  
mis albidis.

*Elytra* atra, striato-punctata, basi rubra; fascia  
flava in medio vix marginem interiorem tan-  
gens. glabra et alia prope apicem cinereo-  
flavescens. pubescens.

*Pectus* sanguineum, glaberrimum.

*Femora* rubra fusco-maculata, inermia.

*Tibiae* alidae.

Videtur esse festivus Fabricii, si magnitudo non  
differat.

*E. 6-GUTTATUS*: ater, laevis elytris punctis  
sex albis.

Habitat in Capite bonae spei.

Magni.

*Magnitudine pulicis*, totum aterrimum, nitens, laevissimum, nudum.

*Caput* minimum.

*Antennae* filiformes, subserratae, capitis thoracisque longitudine.

*Thorax* gibbofo-convexus, marginatus, postice in dentes exiens.

*Elytra* convexa, marginata, singulum guttis tribus minutis luteis: una in ipsa basi rotunda, secunda ante medium in margine externo longitudinali, tertia pone medium transversa.

*Differt ab E. pulchello elytris laevibus, situ et figura macularum.*

*E. CLAVICORNIS: viridis antennis clavatis.*

*Habitat* in India orientali.

*Magnitudine* superat *E. pectinicornem*, totus cyaneus, glaberrimus et nitens.

*Antennae* articulis II, moniliformibus, quorum ultimi quatuor perfoliati margine clavam ovatam formant.

*Thorax* convexus, vix conspicue punctatus, postice lobatus angulis dentatis.

*Elytra* minime striata, sed rugoso-punctata.

*Abdomen* margine et supra lutescens.

*Femora* inermia, tarsis tribus.

#### H I S P A.

*Antennae* fusiformes.

*Corpus* hispidum.

*H. CAPENSIS: picea, hispida thorace spina palmata.*

*Corpus* magnitudine pediculi majoris, totum nigrum vel piceum seu rufo-nigrum.

*Caput* parvum, inerme.

*Antennae* fusiformes seu sensim extrorsum crassiores, articulis brevissimis contiguis, corpore dimidio breviores.

*Thorax* planiusculus, laevis, glaber: margine utrinque spinis quinque vel sex, raro pluribus, quasi e lamina propria vel centro communi prodeuntibus, acutis.

*Elytra* per series impressio-punctata, singulo margine et serie triplici aculeato-ciliata, hispida.

*Variat* colore nigro et piceo.

*Differt ab H. atra:* spina thoracis palmata et tergi capitisque nulla.

*ab H. testacea:* colore fusco vel piceo, thoracis spina palmata, liturisque pedoris nullis.

#### MORDELLA.

*Antennae* filiformes ferratae.

*Caput* inflexum.

*Laminae* ab basin abdominis.

*M. NASUTA:* antennis pectinatis atra immaculata.

Habitat in Japonia.

*Magnitudine* quadrupla *M. aculeatae*, tota atra, immaculata, glabra.

*Caput* depressum, singulare ut in Gryllis, fronte elevata rotundata.

*Antennae* pectinatae, capite paulo longiores.

*Thorax* valde convexus, antice declivus, minime marginatus, postice trilobus absque scutello.

*Pectus* acuminatum.

*Elytra* attenuata, absque striis et punctis.

*Corpus* crassiusculum abdomine obtuso.

*Alae* nigrae venis albidis, elytris longiores.



## PANORPA.

*Os porrectum, inflexum.*

*Antennae filiformi-fetaceae.*

**P. CAPENSIS:** *alis aequalibus immaculatis, corpore ferrugineo.*

*Habitat in Capite bonae spei.*

*Corpus oblongum, totum ferrugineum, glabrum, magnitudine P. communis.*

*Antennae fetaceae, nigrae, corpore breviores.*

*Os porrectum, ferrugineum rostro brevi, inflexo, nigro.*

*Thorax lineis duabus nigris supra lineatus.*

*Alae hyalinae venis ferrugineis, corpore longiores.*

**P. JAPONICA:** *alis aequalibus hyalinis: fasciis duabus atris.*

*Habitat in Japonia.*

*Corpus magnitudine P. communis, oblongum, totum nigrum, glabrum.*

*Os porrectum rostro corneo, inflexo, longitudine thoracis.*

*Antennae filiformes, nigrae, longitudine fere corporis.*

*Alae 4, aequales, oblongae, obtusae, corpore longiores, hyalinae venis nigris, apicibus fasciaeque pone medium lata nigra.*

*Pedes pallidi.*

## ATTELABUS.

*Antennae moniliformes.*

*Caput postice attenuatum.*

**A. GEMMATUS:** *ferrugineus, supra tuberculis nigris elevatis.*

*Habitat in promontorio bonae spei.*

*Corpus*

*Corpus* magnitudine et figura *A. coryli*, totum, exceptis antennis et punctis, ferrugineum, glabrum.

*Antennae* extrorsum crassiores.

*Caput* triangulare, postice angustatum, oculis punctisque quatuor nigris.

*Thorax* convexus, inaequalis punctis 6 nigris, quatuor anterioribus, duobus posterioribus.

*Elytra* thorace latiora, antice angulo costali acuta, convexa, obtusa, profunde impresso-punctata. In margine externo et apice macula nigra; praeterea punctis 13 elevatis nigris notantur, quorum 6 in singulo elytro, et 1 commune.

*A. INDICUS*: ferrugineus capite, elytrorum basi fasciaque cyaneis.

Habitat in India orientali.

*Magnitudo et facies A. melanuri.*

*Caput* subquadrangulare, postice magis attenuatum, cyaneum.

*Antennae* filiformes, *maxillae*, *palpi* rufescentes.

*Thorax* elongatus, cylindricus, utrinque sed inprimis antice attenuatus, ferrugineus.

*Elytra* ferruginea, laevia, tenuissime striata, oblique truncata, basi et fascia lata intra apicem cyanea.

*Pedes* ferruginei, supra genu cyanei.

*Abdomen* rubrum medio macula nigra.

141.

---

DISSERTATIO  
SISTENS  
NOVAS INSECTORUM  
SPECIES.

PARS IV.

D. 26. MAJI 1784.

RESP.

CAROL. P. ENGSTROEM.

---

CARABUS.

*A*ntennae filiformes.

*Thorax* obcordatus, marginatus.

*Pedes* cursorii.

**C. MAXILLOSUS:** *apterus, ater thorace postice  
producto bilobo unicolore.*

*Carabus maxillosus. Fabr. Spec. inf. P.I. p.298.*

*Voet Coleopt. P.1. t.39. fig.47.48.*

Habitat in interioribus Capitis bonae spei regionibus.

*Totus ater, laevis, subtus vix pilosus, absque  
maculis thoracis et margine elytrorum picto.*

*Celerrime hic, uti et sequentes, currit.*

**C. THORACICUS:** *apterus, ater thorace postice  
producto bilobo, lateribus elytrorumque mar-  
ginibus tomentoso-albis.*

Habi-

Habitat in Capite bonae spei.

E maximis hujus generis, oblongus, ater, laevis.

*Maxillae* valde curvae, capite longiores, exsertae.

*Thorax* singularis, ut in priori, subcordatus, antice alatus alis rotundis concavis albo-tomentosis, medio lacunoso-depressus, postice productus supra elytra, bilobus.

*Elytra* connata, convexa, rotundata, margine externo undique tomentoso-alba.

*Femora* antica valde pilosa.

**C. FIMBRIATUS:** *apterus, ater thorace simplici lateribus elytrorumque marginibus albo-tomentosis.*

Habitat in Capite bonae spei.

*Magnitudine* praecedentium, ater, laevis.

*Maxillae* exsertae, capite dimidio breviores.

*Clypeus* oris productus, rotundatus, integer.

*Thorax* cordatus, postice attenuatus, rotundatus, antice alatus alis concavis albo-tomentosis, medio sulcatus.

*Elytra* convexa, laevia, rotundata, margine externo tomentoso-alba.

*Subtus* parum pilosus.

**C. SEXGUTTATUS:** *apterus, ater thorace maculis duabus, elytris quatuor tomentoso-albis.*

*Carabus 6-guttatus. Fabr. Sp. inf. T. 1. p. 236.*

Habitat in promontorio bonae spei.

*Magnitudo et facies* prioris: sed in utroque thoracis latere macula rotunda et in externo elytri singuli margine duae omnino rotundae maculae albo-tomentosae, altera prope basin, altera infra apicem.

*Oculi* glauci.

*Thorax* lateribus minus alatus et alis minus concavis.

C. AGI-



**C. AGILIS:** *apterus, ater, immaculatus thorace postice rotundato sulcato.*

Habitat in Capite bonae spei.

*Magnitudine, structura et facie adeo similis C. fimbriato, ut ovum ovo, sed thorax minus alatus et elytra unicolora.*

**C. TABIDUS:** *apterus, ater elytris octo-sulcatis punctato-rugosis postice spinosis.*

*Voet Coleopt. P. 1. t. 38. fig. 44. 45.*

Habitat in Capite bonae spei.

*Corpus magnitudine C. Leucophthalmi, totum atrum, glabrum.*

*Caput lineis tribus elevatis, punctisque impressis.*

*Palpi quatuor; interiores binis, exteriores tribus articulis.*

*Antennae capite thoraceque longiores, filiformes, articulis decem.*

*Thorax obcordatus, apice truncatus, marginatus, punctatus, postice angustatus, medio sulco lato.*

*Elytra marginata sulcis octo latis, in quorum fundo occurrit series duplex punctorum excavatorum cum stria elevata intermedia; terminantur spina acuta et alia versus marginem exteriorem. Alae nullae.*

*Pectus et abdomen nigra, glabra, punctis minutis impressis.*

*Femora mutica; tibiae anticae spina duplici, altera scilicet supra alteram; reliquae spinis duabus terminalibus.*

**C. TRILINEATUS:** *apterus, ater thorace postice angustato marginibus albis, elytris margine lineaque albis.*

*Carabus trilineatus. Fabr. sp. inf. T. 1. p. 305.*

Habitat in Capite bonae spei.

*Corpus*

*Corpus* magnitudine mediocri seu *C. multipunctato* paulo minus, depressum, totum nigrum, glabrum, laeve.

*Caput* lateribus utrinque linea cinerea, oculis glaucis.

*Thorax* cordatus, marginatus, postice coarctatus, elytris multo angustior, marginibus cinereis.

*Elytra* latiuscula, abdomine paulo breviora, truncata, lineis quatuor cinereis: unica in margine, et alia in singuli elytri medio, apicem elytri non attingens, saepe etiam interrupta.

*Pectus, Abdomen et Pedes* toti nigri, glabri.

*Adeo* similis *Silphae lineatae*, ut eandem diceret; sed differt

- 1) *thorace obcordato postice valde attenuato.*
- 2) *corpore depresso plano:*
- 3) *magnitudine paulo majori.*
- 4) *elytris laevibus absque striis elevatis.*
- 5) *elytris brevibus, truncatis.*

*C. LUNATUS*: apterus, ater thorace lunato, elytris striatis.

Habitat in Capite bonae spei.

Magnitudine *C. violacei*, sed latior et magis depressus, totus ater, glaber.

*Maxillae* exsertae, capite parum breviores.

*Caput* oblongum, inaequale clypeo producto integro.

*Thorax* lunatus, convexus, marginatus, postice rotundatus, laevissimus, spatio ab elytris remotus.

*Elytra* connata, convexa, rotundata, 9-striata absque punctis impressis.

*Femora* crassa tibiis anticis spinis validis ut in *Scarabaeis*.

Differt

*Differt 1) a C. laevigato: elytris striatis.*

2) a *C. interrupto: magnitudine et thorace elytris latiore.*

*Lucanis similis, sed antennae filiformes.*

*C. DIFFORMIS: apterus, ater thorace transverso, postice truncato, elytris striatis.*

*Habitat in interioribus regionibus promontorii bonae spei, prope Swartkops rivier.*

*Corpus statura et magnitudine C. hortensis, totum atrum.*

*Caput thorace angustius.*

*Antennae filiformes articulis globosis.*

*Thorax transversus, latitudine elytrorum, antice excisus, postice truncatus, lateribus marginatus, convexus, punctis minutissimis impressis subrugosus.*

*Elytra connata, convexa, rotundata, marginata, obsolete striata et punctis elevatis confertissimis subrugosa.*

*Subtus impresso-punctatus.*

*C. AFER: niger, antennis pedibusque rufescentibus, elytris laevibus.*

*Habitat sub lapidibus montium capensium.*

*Corpus magnitudine C. caerulea vel vulgaris, oblongum, supra nigrum, nitidum, subtus piceum seu rufescens.*

*Antennae capitis thoracisque longitudine, filiformes, articulis decem, totae rufescentes.*

*Palpi quatuor, exterioribus longioribus.*

*Thorax marginatus, cordatus, postice rotundato-truncatus, latitudine elytrorum: medio sulco exaratus, posticeque ad angulum utrumque puncto impressus.*

*Elytra marginata, subtilissime striata, striis circiter octo in singulo, absque punctis impressis,*

praeter marginem, ubi puncta aliquot impressa; Apice acuta parum rufescunt.

*Pectus, abdomen et pedes* in aliis rufescunt, in aliis picea sunt.

*Tibiae et tarsi* spinosi.

*Similis C. madido*; sed duplo minor et magis laevis.

**C. DORSALIS:** *ater antennis elytrisque rubris: margine nigro.*

Habitat in Capite bonae spei.

Magnitudine fere *C. leucophthalmi*, glaber.

*Caput, thorax, abdomen, femora, tibiae nigra.*

*Antennae et tarsi rufescentes.*

*Thorax* cordatus, postice attenuatus, marginatus, laevis, sulco punctisque baseos duobus impressis.

*Elytra* thorace latiora, obtusa, striata absque punctis, obscure sanguinea margine exteriori et imprimis postico nigris.

**C. OBTUSUS:** *thorace elytrisque fuscis, capite antennis pedibusque rubris.*

Habitat in promontorio bonae spei.

Magnitudine fere *C. cephalotis*.

*Caput* postice angustius, rubrum oculis glaucis.

*Antennae rufescentes uti pedes.*

*Thorax* uti et *caput* elytris multo angustior, cordatus, postice attenuatus, marginatus, sulcatus, fuscus.

*Elytra* obtusa seu truncata, abbreviata, striata, fusca, subvillosa.

*Pectus et abdomen fusca.*

*Similis C. crepitanti*, sed differt

1) magnitudine dupla.

2) elytris fuscis, nec cyaneis.

3) thorace fusco, nec rubro.

C. PRA-



**C. PRASINUS:** *thorace capiteque cyaneis, elytris rubris: postice macula communi fusca.*

Habitat in Capite bonae spei.

Magnitudo et structura *C. vaporariorum*.

Antennae capite thoraceque longiores, fuscae infimo articulo rubro.

Caput et thorax cordatus, cyanea.

Elytra rubra, striata, in ipsa futura a medio ad apicem macula magna ovata, fusco-cyanea, marginem exteriorem non tangens.

Pectus et abdomen nigra.

Pedes toti rufi.

Differt a *C. cruce minori*: thorace cyaneo et margine elytri rufo.

a *C. vaporariorum*: colore cyaneo et margine elytrorum rufo.

**C. BILINEATUS:** *ferrugineus thorace elytrorumque futura linea longitudinali nigra.*

Habitat in Capite bonae spei.

Statura *C. marginati*; sed paulo minor, ferrugineo-pallidus, glaber.

Thorax cordatus, marginatus, linea una vel duabus parallelis nigris, sulcoque impresso medio.

Elytra marginata, striata, truncata, abbreviata: juxta futuram linea oblonga fusca communis.

Variatio duplex α) lineis thoracis duabus parallelis, abdomine ferrugineo.

β) macula ovata fusca longitudinali in thorace; abdomine nigro.

**C. FASCIATUS:** *ferrugineus fascia elytrorum nigra.*

Habitat in Capite bonae spei.

*Facies et magnitudo C. 4-maculati a quo differt marginibus elytrorum minime nigris et thorace fusco.*

*Caput rubrum uti et antennae, pedes, abdomen. Thorax cordatus, sulcatus, fusco-rufescens.*

*Elytra striata, truncata, abbreviata, ferruginea: fascia in medio nigra, recta.*

*Obs. in C. quadrimaculato margo interior suturae et externus niger.*

*C. 2-GUTTATUS: thorace aeneo, elytris punctis quatuor impressis maculisque duabus pallidis.*

*Carabus 2-guttatus. Fabr. spec. Insect. T. I. p. 313.*

*Habitat in Capite bonae spei et in Suecia.*

*Corpus magnitudine dupla pediculi, glabrum, subtus totum nigrum, supra obscure aeneum, subnitens.*

*Thorax cordatus, elytris paulo angustior.*

*Elytra marginata, acuta, striata: singulum prope futuram punctis duobus impressis et intra apicem macula quadrata, pallide flava, pellucida.*

#### BLATTA.

*Os maxillosum.*

*Antennae setaceae.*

*Thorax orbiculatus.*

*Pedes cursorii.*

*B. IRRORATA: pallida thorace elytrisque fusca: irroratis, alis basi nigris.*

*Blatta irrorata? Fabr. spec. Insect. T. I. p. 343.*

*Habitat in Capite bonae spei.*

*E majoribus hujus generis, magnitudine fere aequat B. gigantam, ovato-oblonga, glabra, toto pallida exceptis antennis, thoraci medio, alarum basibus et punctis adspersis fuscis.*

*Thorax macula magna fusca et punctis minutis plurimis sparsis.*

*Hemc-*

*Hemelytra* corpore longiora, pallida, punctis minutis numerosissimis adpersa.

*Alae* longitudine hemelytrorum, fere ad basin nigra, quae nigredo versus apicem oblique terminatur.

*B. CAPENSIS*: fusca, immaculata capite pedibusque rubris.

Habitat in Capite bonae spei.

*Magnitudo et statura B. americanae*, tota, exceptis capite et pedibus rubris, fusco-brunnea, glabra.

*Antennae* nigrae.

*Thoracis clypeus* hemelytris angustior, laevis.

*Hemelytra* corpore sesquialongiora, sulcata.

*B. FUSCA*: fusca, immaculata, capite, antennis, pedibus, thoracis hemelytrorumque marginibus ferrugineis.

Habitat in promontorio bonae spei.

*Magnitudine B. americanae*, glabra.

*Caput* inflexum, ferrugineum oculis glaucis.

*Antennae* setaceae, rufae, corpore dimidio breviores.

*Thoracis clypeus* convexus, brunneo-fuscus, margine omni rufo, punctis minutis, confertis, impressis.

*Hemelytra* corpore paulo longiora, reticulata (non striata) brunneo-fusca, margine exteriori rufa.

*Alae* fuscae margine externo rubro.

*Abdomen* subtus atrum, glabrum; supra nigrum margine et incisuris flavescentibus.

*Pedes* toti ferruginei.

*Foemina* aptera, valde communis sub lapidibus in campis, ovata, latior, supra fusca marginibus thoracis, et incisurarum abdominis rubris.

*Antennae*, caput et pedes rufa.

*Differt a B. capensi* 1) *marginē thoracis, hemelytrorum, alarum abdominisque rubris.*

2) *hemelytris reticulatis, nec sulcatis.*

**B. DEUSTA:** *fusca, immaculata capitis hemelytrorumque basibus rufis.*

*Habitat in Capite bonae spei.*

*B. germanica paulo major.*

*Caput inflexum, supra rubrum, clypeo atrum, maxillis rubris.*

*Antennae corpore breviores, fuscae.*

*Thorax planiusculus, niger.*

*Hemelytra basi et margine externo baseos rufescentia, dein tota fusca, quasi deusta, reticulata, corpore longiora.*

*Abdomen atrum, glabrum, marginibus incisurarum tenuissime rufescentibus.*

*Pedes atrī villo et spinis rufescentibus.*

#### MYRMELEON.

*Cauda forcipata.*

*Os maxillosum, dentatum.*

*Alae deflexae.*

*Antennae capitatae.*

**M. LUTEUM:** *alis flavis nigro punctatis, corpore nigro, femoribus basi flavo-maculatis.*

*Habitat in Capite bonae spei.*

*Corpus M. Libellulae duplo minus.*

*Caput nigrum, maxillis punctoque sub oculis flavo.*

*Antennae capitis longitudine, clavatae, nigrae.*

*Collum nigrum, antice et postice flavo-fasciatum.*

*Thorax niger, inaequalis, ad basin alarum flavus.*

*Alae*



*Alae superiores abdomine longiores, oblongae, obtusissimae, venis elevatis lineatae striataeque; totae flavae, fasciis punctisque numerosissimis atris.*

*Alae inferiores lactescentes maculis majoribus et minoribus nigris.*

*Pectus nigrum flavo-maculatum.*

*Abdomen crassum, nigrum, flava-maculatum; tibiae et tarsi nigri.*

*Differt a M. Libelluloide:*

*Quod duplo minus abdomine nigro; alis obtusioribus.*

*Antennis capitis tantum longitudine.*

*Alis absque maculis majoribus nigris.*

*M. CAPENSE: alis hyalinis nigro-reticulatis, antennis longitudine corporis.*

*Habitat in Capite bonae spei.*

*Corpus Myrmeleone formicario brevius, sed crassius.*

*Caput pilosum. Antennae corporis longitudine, alis paulo breviores, filiformes, apice clavatae clava orbiculata albo-nigroque annulatae, basi pilosae.*

*Oculi flavescentes, medio transverse sulcati. Maxillae luteae.*

*Thorax cinereo-pilosus; pectus luteo-maculatum.*

*Alae omnes abdomine longiores, obtusae, deflexae, hyalinae, venis nigris reticulatae. Margo exterior lineolis transversis et macula saturationibus nigris.*

*Abdomen oblongum, cinereum, pilosum; dorso punctis nigris, parvis.*

*Pedes pallidi, punctis nigris sparsis.*

## LAMPYRIS.

*Antennae* filiformes.

*Thoracis clypeus* caput obumbrans.

*Elytra* flexilia.

**L. JAPONICA:** *flava cingulo abdominis antepenultimo nigro.*

Habitat in Japonia, mense Maji et Junii copiosissima, vesperi lumine suo phosphoreo, e vesiculis binis caudalibus, mille instar stellarum cadentium aëra replens, pulcherrimum spectaculum offert.

Magnitudine *L. chinensis*, tota flava, glabra, oculis, alis et antennis nigris.

*Thoracis clypeus* transversus, marginatus, oculos majusculos vix tegens.

*Elytra* margine crasso undique cincta, punctata. *Cingulum abdominis antepenultimum atrum uti et tarsi.*

*Variat:* 1) puncto in basi elytrorum.

2) macula thoracis, scutello et linea elytrorum obsoleta fuscis.

3) elytris apice nigris.

**L. COMPRESSA:** *testacea antennis pedibusque compressis.*

Habitat in India orientali.

*Linearis, oblonga, glabra.*

*Caput, pectus, pedes, antennae nigrae.*

*Abdomen caeruleescens.*

*Antennae* lineares decem articulis compressis, corpore paulo breviores.

*Thoracis clypeus* testaceus, concavus marginibus elevatis et sulco in medio longitudinali.

*Elytra* linearia, obtusa, testacea, striis tribus majoribus et quatuor obsoletioribus elevatis, sulcis punctatis interjectis.

*Femora et tibiae* compressae, sulcatae, inermes.

CAN-

## CANTHARIS.

*Antennae filiformis.**Caput exsertum.**Elytra flexilia.**Abdominis latera plicata papillosa.***C. LEPTUROIDES:** *thorace convexo lutea, apice elytrorum corporeque nigris.**Habitat in Capite bonae spei.**Magnitudine C. lividae.**Caput, antennae, thorax, elytra excepto apice, genua, anus, lutea, glabra.**Oculi, elytra apice, pectus, abdomen, pedes nigra.**Thorax subrotundo-quadratus, convexus, lateribus deflexus.**Differt a C. Melanura, cui valde similis:*1) *Antennis luteis.*2) *Thorace rotundato, deflexo.*3) *Elytris crassioribus, Lepturae facie.*4) *Pedibus fuscis.***C. BICOLOR:** *thorace plano lutea, elytris dimidiato-caeruleis.**Habitat in Capite bonae spei.**Magnitudine et statura C. melanurae, glaberrima.**Caput, thorax, elytra antice usque ad medium, pectus, femora, tibiae, flava.**Antennae, oculi, tarsi, abdomen fusca.**Elytra a medio ad apicem violacea.**Thorax quadratus, planus, marginatus.***C. BILINEATA:** *thorace flavo macula punctisque quatuor fuscis, elytris flavis linea fusca.**Habitat in promontorio bonae spei.**Magnitudine C. testaceae.**Antennae, oculi, caput, pectus, abdomen, tarsi, genua fusca.**Maxillae flavae.*

*Thorax* rotundatus, planus, marginatus, medio  
 fulcatus, flavus macula fusca magna in medio,  
 et utrinque versus marginem puncta duo fusca.  
*Elytra* lutea linea fusca, lata, intra apicem ter-  
 minata.

*Scutellum* fuscum.

*Femora* et *tibiae* flavae.

**C. TRILINEATA:** *thorace* flavo maculis duabus  
 nigris, *elytris* flavis linea suturaque nigris.

Habitat cum priori.

Magnitudine *C. testaceae*.

*Caput* flavum basi nigrum.

*Antennae* fuscae basi flavescences.

*Thorax* subquadratus, planus, marginatus, flavus  
 macula magna nigra in utroque margine.

*Elytra* lutea sutura nigra et linea in medio  
 nigra, apicem non attingente.

*Pedes* flavi.

*Abdomen* et *tarsi* nigra.

**C. ALTICA:** *thorace* marginato rufa, *elytris* vio-  
 laceis immaculatis.

Habitat in promontorio bonae spei.

Magnitudine et statura *C. pulicariae*, tota ex-  
 ceptis *thorace* pedibusque violacea, glaberrima,  
 immaculata.

*Thorax* rotundatus, convexus, marginatus, san-  
 guineus.

*Tibiae* et *tarsi* rufescentes.

*Elytra* violaceo nitent; *abdomen* magis nigricat.

**C. OCULATA:** *thorace* marginato flavo: punctis  
 duobus nigris, *elytris* corporeque cyaneis.

*Corpus* *C. bipustulatae* paulo minus.

*Caput* flavum *Oculis* nigris.

*Antennae* subsiliformes, capitis thoracisque lon-  
 gitudine, articulis decem aequalibus, dimidia  
 ad basin flavescences, et dimidia fuscae.

*Thorax*



*Thorax* marginatus, depressus, flavus: punctis in medio duobus, nigris.

*Elytra* flexilia, obtusa, marginata, cyanea, laevia, nitida. Variant colore viridi-cyaneo et violaceo.

*Abdomen* caeruleescens, marginibus incisurarum flavescentibus.

*Pedes* toti flavi.

*C. COLLARIS*: *thorace* marginato sanguineo: macula nigra, *elytris* cyaneis.

*Corpus* magnitudine *Dermest. mollis*.

*Caput* nigrum; *antennae* filiformes, fuscae, basi rubrae, longitudine capitis thoracisque.

*Thorax* marginatus depressus, sanguineus; antice macula majuscula, cyanea.

*Elytra* obtusa, caeruleo-cyanea, hirta, glabra.

*Pedes* toti nigri, pilosi.

*C. CUPRAEA*: *thorace* marginato; *subtus* cyanea, *supra* aenea.

*Corpus* magnitudine *pediculi majoris* vel vix *Derm. mollis*, totum *subtus* viridi-cyaneum, *supra* aeneum, nitidum, pilosum.

*Oculi* nigri.

*Antennae* submoniliformes, fuscae.

*Thorax* marginatus, depressus, uti *elytra* tenuissime punctatus.

*C. ARGENTEA*: *thorace* plano *elytris*que viridibus, *abdomine* sericeo.

Habitat in Capite bonae spei.

Magnitudine et facie *C. fuscae*, tota *supra* virescens, *subtus* imprimis pectore sericeo-argentea.

*Antennae*, *oculi*, *caput* nigra.

*Thorax* subquadratus, planus, inaequalis, marginatus, laterali margine utrinque maculis minimis luteis.

*Anus*

*Anus et pedes lutei tarsis fuscis.*

*C. VIOLACEA: thorace flavo macula punctisque quatuor fuscis, elytris viridibus.*

*Habitat in Capite bonae spei.*

*Magnitudo C. fuscae ejusque faciei.*

*Caput flavum basi oculisque nigris.*

*Antennarum quatuor articuli flavi, reliqui fusc.*

*Thorax rotundatus, planus, marginatus, flavus, in medio macula magna fusca et in utroque margine postice puncta quatuor minuta fusca.*

*Elytra tota viridia vel certo adspectu violacea, tenuissime villosa, immaculata.*

*Pectus atrum.*

*Abdomen et pedes flavi.*

*Varietas  $\beta$ . 1) Antennis flavis: ultimis tribus articulis fuscis.*

*2) Thoracis macula fusca, postice bifida, punctum nigrum includens.*

DISSERTATIO  
SISTENS  
NOVAS INSECTORUM  
SPECIES.

PARS V.

D. 13. JUN. 1789.

RESP.

JOH. OLAI NORAEUS.

CANTHARIS.

**C. 4-GUTTATA:** *thorace flavo macula nigra, elytris violaceis maculis quatuor albidis.*

Habitat in promontorio maxime australi Africes. Magnitudine et habitu *C. pediculariae*, tota violaceo-nigra, exceptis antennis, thoracis margine et maculis elytrorum albidis.

*Thorax* orbiculatus, marginatus.

*Elytra* singula in medio et apice notantur macula majuscula albida.

PYROCHROA.

*Thorax* rotundatus.

*Elytra* flexilia.

**C. SERRATICORNIS:** *thorace rubro, corpore violaceo, antennis serratis.*

Habitat in Capite bonae spei,

*Viola.*

*Violacea* tota. thorace rubro antennisque fuscis.

*Caput* angustissimum, glabrum.

*Thorax* plano-depressus, rotundatus, marginatus, elytris angustior.

*Antennae* moniliformes, compressae, II articulis, ferratae, longitudine capitis thoracisque.

*Elytra* flexilia, marginata, nitida, hirta.

#### CASSIDA.

*Caput* clypeo thoracis tectum.

*Corpus* subtus planum.

*C. BIMACULATA*: flava elytrorum margine macula utrinque nigra.

Habitat in China.

Tota flava, glabra, *C. viridi* paulo major.

*Oculi antennarumque apex nigri.*

*Thoracis clypeus* emarginatus, postice crenatus, medio convexus.

*Elytra* flava, dorso punctata et imprimis antice lacunosa, subplicata; margines diaphani; pone medium macula nigra.

*Abdomen et pedes* flavi.

*C. 4-MACULATA*: flava elytrorum margine maculis utrinque duabus nigris.

Habitat cum priori, ejusdem magnitudinis.

*Oculi et antennae apice nigrae.*

*Thorax* integer, immaculatus, diaphanus.

*Elytra* convexa, subrugosa, flava; dorso maculae duae vel tres obsoletae, nigrae; margo pelucidus; utrinque macula nigra.

*Corpus* flavum macula pectorali nigra.

*C. 20-MACULATA*: flava thorace sexmaculato, elytris maculis viginti nigris.

Habitat in Indiae orientalis insulis. D. *Hörnstedt.*

Magnitudine *C. viridis*, tota flava, glabra.

*Thorax*



*Thorax* flavus clypeo integro; maculae sex nigrae, 1 in ipso angulo postico, 2 juxta basin et 2 ante medium coalitae.

*Elytra* in dorso gibba, margine depresso dilatato. striata, flava. Maculae inaequales, nigrae, viginti, quarum tres in singulo margine, scilicet una prope basin seu in ipso angulo antico, secunda in medio oblonga, tertia in ipso apice minuta; in disco convexo tres prope basin saepe confluentes in maculam ocellarem, 1 pone medium, 2 versus apicem et 1 in medio dorso communis.

*Corpus* ferrugineum fasciis duabus nigris.

*Caput* nigrum.

*Antennae* flavae, apice nigrae.

*Pedes* toti nigri.

*C. FURCATA*: flava margine antico suturaque elytrorum ferrugineis.

Habitat in Indiis.

*Tota* excepto capite marginibusque elytrorum flava, glabra, diaphana, magnitudine *C. viridis*.

*Caput* totum et apex antennarum fusca.

*Thoracis clypeus* rotundatus, integer.

*Elytra* margine antico et sutura late ferruginea, qui tamen color apicem non attingit.

*C. RETICULATA*: flava thorace elytrisque nigro-reticulatis.

Habitat in Caijenna Americae.

*Tota* glabra, *C. nebulosa* paulo minor.

*Oculi* et *antennae* intra apicem cingulo nigro.

*Thoracis clypeus* diaphanus, integer, postice nigro-reticulatus.

*Elytra* convexa; dorsum punctatum, eleganter nigro-reticulatum; margines diaphani, immaculati.

*Corpus* et *pedes* flavi.

*C. PUR-*

*C. PURPUREA*: *flava macula dorsali purpurea.*  
Habitat in Indiis.

*Magnitudine prioris*: tota glabra, flava, exceptis macula dorsi et oculis nigris.

*Thoracis clypeus* integer, diaphanus, margine antico tenuissime nigro.

*Elytra* diaphana, convexa, punctata; in dorso versus marginem anticum macula magna, orbicularis, purpurea.

*C. VESICULARIS*: *flava dorso fusco vesiculoso.*  
Habitat in Japonia.

*Magnitudo et similitudo C. purpureae*; tota marginibus clypei et elytrorum pellucida, tenuissime reticulata et pallide flava.

*Dorsum* gibbum, fuscum, punctis minutissimis impressum et vesiculosum.

*Corpus* subtus subferrugineum.

*C. LUNATA*: *supra aenea, subtus virescens, macula elytrorum lunata diaphana.*

Habitat in Indiae Orientalis insulis. D. Hornstedt.  
*Inter majores numeranda*, tota glabra, supra ferrugineo-aenea, subtus olivaceo-viridis.

*Thoracis clypeus* emarginatus, angulatus.

*Elytra* deflexa, punctata, rugosa, valde dilatata; ante medium et propius marginem anteriorem macula magna, sublunaris, flava, diaphana utrinque.

*Subtus* omnia obscure viridia antennis solis nigris.

#### BUPRESTIS.

*Antennae* filiformes, serratae.

*Caput* intra thoracem retractum.

*B. BICARINATA*: *viridis elytris bidentatis, sulcatis; abdomine bicarinato.*

Habitat in China.

Duplo

*Duplo minor B. gigantea, eique valde similis, tota viridi-aenea.*

*Oculi ferruginei.*

*Thorax medio fuscus marginibus elevatis, viridinentibus.*

*Elytra bidentata, sulcata sulcis punctatis.*

*Abdomen subtus pone medium bicarinatum, aeneum, pectoris sterno porrecto.*

**B VITTATA:** *viridis elytris bidentatis punctatis: lineis duabus aeneis; thorace punctis duobus aeneis.*

*B vittata. Fabric. Mantiss. Insect. p. 176.*

*Habitat in India Orientali.*

*Corpus oblongum, viridi-aeneum, supra punctatum, subtus laeve, magnitudine fere B. ignitae.*

*Oculi ferruginei.*

*Antennae filiformes, subserratae, nigrae.*

*Thorax postice utrinque ad latera macula aenea, nitida.*

*Elytra lineis quatuor elevatis, postice bidentata; in medio singuli linea aenea.*

*Pedes virides.*

**B. ELEGANS:** *viridis elytris serratis punctatis; lineis thoracis elytrorumque duabus rufis.*

*B. elegans Fabric. Mantiss. Insect. p. 179.*

*Habitat in India orientali.*

*Tota viridi-aurea, supra tenuissime punctata, subtus laevis. B. ignita paulo minor.*

*Antennae nigrae.*

*Oculi rufescentes.*

*Thorax lineis duabus rubris.*

*Elytra serrata apice; linea in singulo rubro-aurea.*

**B. SULCATA:** *viridi-aenea elytris serratis, medio sulcatis: sulci marginibus aureis.*

*Vol. III.*

O

Habi-

Habitat in China.

*Magnitudine B. rusticae*, sed magis attenuata, tota viridi-aenea, glabra, nitens.

*Caput* antice impressum, punctatum.

*Thorax* dorso viridi stria longitudinali, lateribus linea aurea utrinque, punctatus.

*Elytra* lanceolata, ante medium coarctata, apice ferrata dentibus circiter sex, viridi-aenea, medio sulco longitudinali lato, cujus margines aureo nitent.

*Abdominis dorsum* cupreum.

*Subtus* omnia cyaneo-aurea, nitentia.

*B. PRASINA*: viridi-aenea elytris integris, thorace angulis aeneis, abdomine ferrato.

Habitat in China.

*Paulo* major *B. rustica*, supra obscure viridis, subtus cyaneo-aenea et nitens.

*Caput* punctatum.

*Thorax* viridi-aeneus, punctatus, postice utrinque lunula impressa et angulis aeneo-aureis.

*Elytra* viridia, parum nitida, integra, subtilissime punctata lineis elevatis.

*Abdomen* totum ferratum, medio canaliculatum ano bidentato.

*Differt a B. canaliculata*:

1) *Abdomine* toto viridi, ferrato.

2) *Ano* bidentato.

*B. CAERULEA*: violacea glabra, elytris integris laevibus.

Habitat in Capite bonae spei.

*Paulo* minor *B. 4-punctata*, tota ovata, violacea, nitens, impunctata, glabra.

*Elytra* integerrima.

*Differt a B. viridi*:

1) *Corpore* ovato, minus elongato.

2) *Elytris* laevibus.



*B. DIMIDIATA: viridis, elytris integris laevibus postice aeneo-aureis.*

*Habitat in India Orientali. D. Hornstedt.*

*Magnitudine B. 4-punctatae, tota glabra.*

*Caput caeruleescens margine omni viridi.*

*Thorax nigro-caeruleescens, obscurus, marginibus lineaque media viridibus, nitentibus.*

*Elytra integra, basi caeruleo-virescentia, postice majori parte aeneo-aurea, laevia, ante apicem fovea impressa.*

*Subtus viridis, nitens margine abdominis aeneo.*

*Differt a B. fulminante:*

1) *Elytris integris, impunctatis.*

2) *Magnitudine.*

*B. OCULATA: elytris bidentatis punctatis nigris; thorace utrinque macula rubra.*

*Habitat in Capite bonae spei.*

*Corpus magnitudine B. rusticae, depressiusculum, oblongum, totum glabrum, nigrum, punctisque minimis frequentissime adpersum.*

*Caput thorace angustius.*

*Antennae subserratae, sensim crassiores, thorace breviores.*

*Oculi nigri, pupilla glauca.*

*Thorax submarginatus, convexo-planus, medio sulcatus, lateribus macula majuscula excavata, rubra.*

*Elytra marginata, apice bidentata, attenuata, ex punctis impressis lineata, maculisque quadratis obsoletis sparsis excavata.*

*Omnia subtus nigra, punctis minutissimis albis frequentissime adpersa.*

*Pectus ad latera macula rubra, thoracis majore, medioque sulco duplici.*

*Abdominis latera maculis circiter quatuor rubris.*

**B. RUFICOLLIS:** *elytris integris fulcatis nigris, capite thoracisque lateribus aureo-fulvis.*

Habitat ad Caput bonae spei.

*Magnitudine B. rusticae, sed angustior.*

*Caput aureo-fulvum, punctatum, oculis aurantiacis.*

*Antennae subfiliformes, ferratae, nigrae, thorace breviores.*

*Thorax transversus, medio profunde sulcatus, punctatus, lateribus aureo-fulvus, antice cyaneus, postice niger.*

*Elytra integra, nigra, margine exteriori in primis versus apicem aureo-nitentia; singulum decemstriatum, stria intima basin non attingente, reliquis excavato-punctatis.*

*Omnia subtus nigra, nitida, tenuissime villosa, in primis abdomen versus anum pilosum.*

**B. MARGINATA:** *elytris integris violaceis, thoracis lateribus rubris.*

Habitat in Capite bonae spei.

*Corpus magnitudine B. viridis, totum violaceum, glabrum.*

*Oculi glauci.*

*Antennae filiformes, ferratae, longitudine dimidia thoracis.*

*Thorax subquadratus, medio sulcatus, marginibus rufus.*

*Elytra integra, acuta, marginata, tenuissime obsolete punctata, immaculata.*

*Subtus omnia concolora, magis polita.*

**B. CORNUTA:** *elytris integris albo nigroque lineatis; thorace tuberculato.*

Habitat in Capite bonae spei.

*Corpus magnitudine B. rusticae, paullo angustius, lineari-oblongum.*

*Caput*

*Caput* cinereo-fuscum: tubercula duo ex pilis fasciculatis cinereis inter oculos porrecta et alia minima in vertice.

*Antennae* filiformes, subserratae, capite paullo longiores, nigrae.

*Thorax* angulatus, quadratus, submarginatus, inaequalis, tuberculatus ex pilorum fasciculis, quos inter tres majores in medio thorace, erecti; niger, cineritie adpersus, postice trilobatus.

*Elytra* marginata, integra, sensim attenuata, elevato-lineata, pilis brevissimis tomentosa, ex albo et fusco lineata: sutura linea ferruginea, apicem non attingente.

*Pectus et Abdomen* tomento cinereo tecta, lineis quatuor nigris; latera pectoris parum flavescent.

*Pedes* aenei, cineritie sparsa tecti.

*B. SUTURALIS*: *elytris integris viridibus: sutura aurea; thorace punctis duobus impressis; corpore aeneo* \*).

Habitat in Capite bonae spei.

*Corpus* magnitudine fere *B. rusticae*, supra viride, subtus aeneum, glabrum, nitens.

*Caput et Thorax* tenuissime punctata.

*Antennae* filiformes, thorace breviores, nigrae.

*Oculi* glauci.

*Thorax* quadratus, convexo-planus linea glabra in medio, immarginatus, puncto lateribus utrinque oblongo; impressio.

*Elytra* integra, pone medium attenuata, striata, omnium tenuissime punctata, viridia; sutura aureo nitens.

O 3

*Subtus*

\* ) *B. Aurata*. Catal. Mus. P. 4. p. 52.

*Subtus omnia aeneo - aurea, glabra, punctis excavatis.*

**B. CAFFRA:** *elytris crenatis, violaceo luteoque variegatis, corpore aeneo.*

Habitat in Capite bonae spei sylva prope von Stades rivier mense Decembri.

*Corpus magnitudine B. rusticae, paullo longius, sed angustius.*

*Caput uti Abdomen et pedes aeneum, intra thoracem retractum, tenuissime villosum.*

*Oculi glauci. Maxillae nigrae.*

*Antennae filiformes, ferratae, articulis decem triangularibus, nigrae, thorace breviores.*

*Thorax subquadratus, convexus, punctis copiosissimis impressus, aeneus, lateribus medioque maculis duabus flavis, altera antice longitudinali, altera postice transversa; postice ante regionem scutelli sulcus brevis. Scutellum nullum.*

*Elytra sublinearia, apice crenata, marginata, profunde striata cum punctis impressis, caerulea; maculis fasciis punctisque luteis irrorata.*

*Pectus aeneum, punctatum punctis impressis, pubescens.*

*Abdomen aeneum, nitens, nudum.*

*Pedes aenei, pilosi.*

**B. TRIFASCIATA:** *elytris integris nigris, basi rubra fasciisque tribus albis, thoracis marginibus flavis.*

Habitat in Capite bonae spei.

*Corpus B. 4-punctata duplo majus, oblongum, supra hirtum, subtus villosum.*

*Caput antice luteum, postice nigrum, oculis glaucis.*

*Antennae filiformes, extrorsum paullo crassiores, ferratae, nigrae.*

*Thorax*



*Thorax* subquadratus, postice angustior, convexus, punctatus, marginibus anticis et lateralibus flavus, medio sulcatus, postice puncto flavo.

*Elytra* oblonga, sulcata: sulcis punctis elevatis; a basi fere ad medium rubra, inde violaceo-nigra, fasciis tribus transversis flavis, una in medio, una pone medium et una intra apicem, nulla suturam attingente.

*Subtus omnia nigra macula transversa utrinque in pectore et magna in abdomine flava.*

*Variatio occurrit fascia elytrorum prima atque ultima obsoletis et abdomine toto nigro.*

**B. BIFASCIATA:** *elytris integris nigris: fasciis tribus albis, thorace nigro.*

Habitat in Capite bonae spei.

*Corpus* magnitudine *B. quadri-punctatae*, glabrum, hirtum, subtus atrum, supra nigro-aeneum.

*Antennae* filiformes, longitudine thoracis, nigrae. *Oculi* lutescentes.

*Thorax* quadratus, caput excipiens, convexus, deflexus, marginatus medio sulco obscuro, lateribus postice puncto impresso, nigricans, punctis copiosissimis impressis, postice truncatus. integer.

*Elytra* linearia, acutiuscula, longitudine abdominis, costa elevata, marginata, integra, striata striis punctatis, nigra: singulum punctis duobus pone basin parallelis et fasciis duabus flavis notatum, quarum altera pone medium, curvis, margines non attingentibus.

**B. IO-GUTTATA:** *elytris integris nigris, maculis decem luteis.*

Habitat in Capite bonae spei.

*Corpus* magnitudine *B. viridis*, totum tenuissime  
hirtum, atrum, punctatum.

*Oculi* glaucescentes.

*Antennae* submoniliformes, ferratae, thorace  
breviores.

*Thorax* planus, subquadratus, parum postice  
angustatus.

*Elytra* oblonga, integra, lineata, punctis utrin-  
que quinque flavis; primum in ipsa costa, se-  
cundum juxta futuram infra basin, tertium et  
quartum in medio, interdum coalita in unum,  
quintum pone medium prope futuram.

*B. 6 - GUTTATA: nigra villosa elytris ferratis:*  
*maculis sex ferrugineis.*

Habitat in India orientali, D. *Hornstedt*.

*Longitudine B. Chrysostigm.* sed duplo angustior,  
sublinearis.

*Caput* nigrum ferrugineo - maculatum, oculis  
glaucis

*Antennae* et *pedes* nigrae.

*Thorax* niger, supra planus, intra margines la-  
terales linea ferruginea; versus marginem an-  
ticum puncta duo ferruginea approximata;  
prope marginem posticum puncta duo remota  
ferruginea; in medio linea elevata obsoleta.

*Elytra* linearia, ante medium coarctata, apice  
tenuissime ferrata, laevia, nigra, obscura.  
Prope basin lineola obliqua ferruginea villosa  
postice acuta puncto nigro; ante medium ma-  
cula subquadrangularis, villosa, ferruginea,  
obliqua, antice et postice puncto nigro ter-  
minata; intra apicem simile punctum ferru-  
gineum oculo nigro fere cinctum.

*Pectus* et antica *abdominis* latera villosa, fer-  
ruginea.

*Abdo-*

*Abdomen* aeneum: margo superior punctis duobus ferrugineis et ultima tria segmenta subtus ad latera maculis albis.

**B. ATOMARIA:** *tota aenea elytris tridentatis apice violaceis.*

Habitat in Capite bonae spei.

*Corpus* magnitudine *B. quadripunctata* paullo majus lineari-oblongum, totum aeneum, tectum pulvere aeneo vel ferrugineo.

*Caput* antice transverse sulcatum.

*Oculi* glauci.

*Antennae* filiformes, ferratae, thorace breviores, nigrae.

*Thorax* quadratus, planiusculus, marginatus, aeneus, cineritie sparsa, praesertim lateribus.

*Elytra* marginata, postice attenuata, vix manifeste striata striis antice punctatis, basi aenea atomis ex pulvere cinereo sparsis; apice violacea, tridentata.

*Pectus* et *abdominis* latera dense tecta pulvere ferrugineo.

*Abdomen* medio glabrum.

*Pedes* aeneo-cinerei.

*Pulvis* minimo attactu secedit, et tunc animalculum aeneum, elytris striatis.

**B. NOTATA:** *elytris integris violaceis, thoracis lateribus albis, abdomine albo-maculato.*

Habitat in Capite bonae spei frequens.

*Corpus* magnitudine *B. 4-punctatae*, totum violaceum, glabrum, supra punctatum, subtus nigrum, nudum.

*Antennae* filiformes, atrae, longitudine thoracis.

*Oculi* lutescentes.

*Thorax* quadratus, gibbus, caput dimidium excipiens, inaequalis, postice subquadrilobatus,

latere utroque puncto depressio, marginatus lateribus albis.

*Elytra* linearia, obtusa, integra, abdomine paullo breviora, marginata absque striis copiosissimis punctis impressa, immaculata.

*Pedes* violaceo-nigricantes.

*Pectus* utrinque maculis duabus albis.

*Abdomen* margine utroque punctis circiter tribus albis maculatum.

**B. ACUTA:** *elytris bidentatis acuminatis caeruleis, corpore nitente.*

Habitat in Capite bonae spei.

Magnitudine et statura *B. viridis*, linearis, tota caerulea, nitens, supra punctata, subtus laevior.

*Antennae* nigrae.

*Thorax* convexus, postice puncto rotundo et margine utrinque sulco oblique impressus.

*Elytra* statim pone costam et medium coarctato-augustata, apice oblique truncata, ipso apice externe in acumen terminato.

*Alae* hyalinae margine externo nigro.

**B. RUGOSA:** *elytris ferratis rugosis fuscis, apice luteo-irroratis.*

Habitat in Capite bonae spei; singulare animalculum.

*Corpus* magnitudine *B. 4-punctata* minus, supra totum rugosum seu lacunosum, subtus laeve, atrum.

*Caput* fuscum punctis duobus ferrugineis inter oculos.

*Thorax* subquadratus, noduloso-rugosus, fuscus, punctis circiter quatuor ferrugineis in margine antico.

*Elytra* a medio ad apicem tenuissime ferrata, valde lacunosa, fusca, maculis minutis ferrugineis adpersa a medio ad apicem.

**B. IR-**



**B. IRRORATA:** *nigra elytris integris antice punctis ferrugineis, postice ferrugineis nigropunctatis.*

Habitat in India orientali. D. *Hornstedt.*

*Paulo major B. 4-punctata, tota obscura.*

*Thorax niger, punctato-scaberrimus.*

*Elytra integra, tenuissime striata, antice fusca punctis sparsis ferrugineis, apice ferruginea punctis nigris.*

*Subtus omnia nigra, obscura.*

*Differt a B. ornata: elytris integris, ceteris.*

#### NOTOXUS.

*Thorax gibbus utrinque attenuatus.*

**N. CORNUTUS:** *alatus thorace in cornu supra caput protenso; elytris punctis duobus pallidis.*

*Corpus magnitudine pulicis minoris, totum glabrum, villosum.*

*Caput inclinatum, in collum parum attenuatum, nitens, atrum.*

*Palpi duo, brevissimi, lutescentes.*

*Antennae filiformes, sensim crassiores, articulis undecim, lutescentes, longitudine dimidia corporis.*

*Thorax subglobosus, antice in cornu supra caput protensus, fusco-ferrugineus, laevissimus.*

*Elytra convexa, absque striis et punctis laevia, fusco-ferruginea, macula utrinque prope basin rotunda, lutea, pellucida.*

*Abdomen ferrugineum.*

*Pedes pallidi.*

*Alae albae.*

*Differt a N. monocerote: α) quod minor.*

*β) punctis elytrorum.*

N. DEU-

*N. DEUSTUS: niger elytris ferrugineis apice fuscis.*

Habitat in muscis Taffelberg et alibi in Capite bonae spei.

*Corpus* magnitudine *N. monocerotis*, oblongum, glabrum.

*Caput* parum inflexum, totum nigrum.

*Maxillae, palpi, antennae, pedes toti*, nigra.

*Palpi* duo, clavati clava solida.

*Antennae* filiformes articulis moniliformibus undecim: infimo oblongo, capitis thoracisque longitudine.

*Thorax* tereti-convexus, oblongus; postice truncatus, submarginatus; medio parum contractus; saepius niger, rarius ferrugineus.

*Elytra* abdomen tegentia, oblonga, convexa, pellucida, laevissima absque punctis et striis, ferruginea, apice fusca, rarius tota ferruginea.

*Alae* nullae.

*Abdomen* fusco-ferrugineum, subdiaphanum.

*Femora* inermia.

*Varietas duplex: α) thorace apiceque elytrorum fuscis.*

*β) thorace elytrisque ferrugineis.*

*N. FLAVUS: totus flavus capite pedibusque nigris.*

Habitat in Capite bonae spei.

*Statura et magnitudo N. deustii.*

*Caput* nigrum, postice attenuatum.

*Antennae* nigrae, infimo articulo filiformi longo villoso, reliquis moniliformibus.

*Thorax* convexus, immarginatus, medio latior, luteus, glaber.

*Elytra* convexa, laevia, glabra, flava.

*Alae* nullae.

*Abdomen* flavum, glabrum.

*Pedes* omnes nigri basi femorum flavescente.

N. CAE-

N. CAERULEUS: *niger, elytris caeruleis.*

Habitat in Tanaceto crithmifolio, infra Taf-felberg.

*Magnitudine Meloë floralis.*

*Caput* gibbum, nigrum, glabrum.

*Antennae* nigrae, capitis thoracisque longitudine articulis decem, minus glabrae, moniliformes.

*Thorax* subrotundus, gibbus, ater, glaber.

*Elytra* caeruleo-cyanea, glaberrima; longitudine abdominis, absque punctis et striis, flexilia.

*Femora* crassa, atra, glabra; *tibiae* nigrae, obscurae.

N. GRANDIS: *totus ater femoribus rubris.*

Habitat in China.

Totus ater, glaber, solis oculis glaucis et femoribus rufescentibus, *magnitudine Formicae herculeanae.*

*Caput* subquadrangulare, oculis prominulis.

*Antennae* filiformes, longitudine thoracis.

*Thorax* cylindricus, elongatus, parum utrinque attenuatus et annulo coarctatus, glaber.

*Elytra* antice angusta, postice gibba, convoluta, rugosa.

*Femora* rubra, tibiis nigris.

#### LOCUSTA.

*Antennae* setaceae.

*Elytra* deflexa.

L. VITTATA: *thorace subquadrato, laevi; alis niveis fusco-fasciatis.*

Habitat in Carro inter Olyfants rivier et Slang rivier.

Perfecta Decembri.

*Corpus* magnitudine G. *viridissimi.*

*Caput* deflexum, fronte viridi lineis albis, vertice viridi lineis obsoletis.

*Oculi*

*Oculi* exstantes, olivacei.

*Maxillae* et *palpi* pallidi.

*Antennae* filiformi-setaceae, fuscescentes.

*Thorax* subquadratus, laevis. viridis: margines externi albi; medio linea incarnata.

*Elytra* tenuia, abdomine paulo longiora, fusco-incarnata, seu fusca maculis incarnatis.

*Alae* aequales, niveae, fasciis plurimis nigris subreticulatae.

*Abdomen* incarnatum; latere utroque linea duplici, longitudinali, albo-argentea, undulata: inter has vittas puncta interjacent albida: subtus linea duplex alba, saepius interrupta: Carina viridis.

*Ensis* longitudine abdominis.

*Femora* antica, angulata, ciliato-spinosa; postica elongata, crassiora, compressiuscula, ciliata.

*Tibiae* antice angulatae, spinis filiformibus ciliatae; postice minutissime spinosae, tetragonae.

*Pedes* omnes virescentes.

L. AETHIOPICA: *Thorace* plano laevi, *elytris* hyalinis, *linearibus ala* brevioribus, *capite* conico *tibiis spinosis*.

*Gryllus conocephalus* Lin. T. r. p. 696.

*Corpus* magnitudine *G. domest.* minus, angustum.

*Caput* prominens, conicum, virescens linea ferruginea, sensim latior, ab apice ad scutellum.

*Oculi* nigri. *Antennae* setaceo-capillares, corpore duplo longiores, fuscescentes.

*Thorax* rotundatus, laevis.

*Elytra* angusta, cinereo-hyalina, abdomine longiora, lineari-lanceolata, obtusa, deflexa.

*Alae* concolores, *elytris* paulo longiores.

*Abdomen* virescens, dorso rufescente.

*Ensis* longitudine abdominis, viridis.

*Femora* postica inermia, pilosa.

*Pedes*



*Pedes virides.*

*Cauda bifeta, enfata.*

*Tibiae angulatae, spinosae, virides.*

*Similis valde G. conocephalo; differt tamen  
Elytris hyalinis, abdomine longioribus.*

*Ensi viridi.*

*Tibiis spinosis.*

#### GRYLLUS.

*Antennae filiformes.*

*Elytra deflexa.*

*G. SPUMANS: thorace subcarinato, rugoso, antice  
callo elevato; elytris abbreviatis rubris fusco  
irroratis.*

*Roessel. T. 2. t. 6. Fig. 1?*

*Corpus magnitudine G. verrucivori, glabrum.*

*Caput convexum, laeve, antice productum la-  
mina ovata concava emarginata, inflexum.*

*Oculi olivacei.*

*Antennae filiformes, capite thoraceque breviores,  
nigrae, articulis undecim, quorum ultimi duo  
longiores.*

*Palpi basi rubri, apice nigri.*

*Maxilla superior nigra, inferior rubra.*

*Thorax convexus, deflexus, subcarinatus, trans-  
verse sulcatus, lacunis et tuberculis rugosus;  
postice rotundatus; antice acutus callo magno  
elevato, convexo, punctis quatuor magnis  
et sulco longitudinali lacunoso.*

*Elytra abdomine breviora, saepe duplo, deflexa,  
fusco-rufescentia, venis elevatis reticulata,  
rugosa.*

*Pectus laeve, lividum vel nigrum, punctis 4  
impressis.*

*Abdo-*

*Abdomen* laeve, nigrum totum vel lividum fasciis rufescentibus.

*Femora* postica angulata, compressa, crassa, laevia, nigra vel fusco-rufescentia; antica breviora.

*Tibiae* angulatae seu antice convexae, postice concavae, angulis ferratis rubrae, basi apiceque nigrae.

*Plantae* rubrae.

*Digit*i unguiculati, nigri.

*Varietates*: 1) *Capite thoraceque totis rubris, immaculatis.*

2) *Corpore toto rufescenti-nigro.*

3) *Capite nigro; thorace atro marginibus antico et postico sanguineis.*

*G. CANESCENS*: cinereus thorace vertice depresso, carinato, elytrisque lineis canescentibus.

*Corpus* magnitudine *Gr. variolosi*, compressum, ex cinereo et nigro varium.

*Caput* inflexum, cinereum, antice compressum, sulcatum cum puncto incluso; *Vertex* depressus, acuminatus.

*Oculi* glaucescentes.

*Antennae* cinerae, filiformes, articulis 16, subrotundis, thorace breviores.

*Thorax* angulatus, carinatus, profunde rugosus rugis tribus transversis, totus uti caput rugoso-muricatus, cinereus, lineis latis utrinque duabus fuscis. Carina elevata, convexa, denticulata, antice prominens, acuta, postice protracta in scutellum subserratum, longitudine  $\frac{1}{3}$  abdominis.

*Elytra*

*Elytra* abdomine sesquilongiora, lanceolata, deflexa, cinereo-fusca. A basi in medio singuli ad medium linea cinerea, angusta; supra hanc linea cinerascens latior, similis et subtus alia latissima rufescenti-cinerea.

*Alae* fuscae, margine cinereo, longitudine Elytrorum.

*Abdomen* cinereo-fuscum, glabrum.

*Pedes* anteriores cinerae, subinermes.

*Femora* postica cinerea, crassa, longa, compressa, 7-angulata angulis tribus spinosis, subreticulata, sensim angustata, articulo utrinque dilatato, et lunula nigra notato.

*Tibiae* angulatae, dentatae duplici serie, intus purpurascences.

*Plantae* cinerae, subinermes.

DISSERTATIO  
SISTENS  
NOVAS INSECTORUM  
SPECIES.

PARS VI.

D. 28. MAJI 1791.

RESP.

ANDREAS JOHANNES LAGUS.

M E L O E.

*Antennae* moniliformes.

*Caput* inflexum.

*Thorax* quadrato - globosus.

*Elytra* flexilia.

*Corpus* oblongum.

M. HIRSUTUS: *totus ater, immaculatus, hirtus, elytris acutis.*

Habitat in Capite bonae spei.

*Corpus* M. visicatorio minus, totum atrum, immaculatum et villosum, inprimis caput et thorax.

*Elytra* acuta, tenuissime et obsolete villosa.

M. URSUS: *totus ater, immaculatus, hirtus, elytris obtusis.*

Habitat in Capite bonae spei.

Cor.



*Corpus* magnitudine *M. vesicatorii*, totum atrum, hirsutum etiam elytris, imprimis lateribus, pilis densis exstantibus.

*Elytra* rotundato-obtusa.

*M. NITIDULUS*: *cyaneus elytris testaceis*.

*Lytta nitidula* Fabr. Mant. Inf. p. 215. Syst. Entom. p. 826.

Habitat in Capite bonae spei.

*Corpus* Meloë Cichoreo paulo minus, cyaneum, nitens, pilis tenuissimis villosum.

*Antennae* moniliformes, nigrae.

*Elytra* testacea seu flavescentia, immaculata, laevissima.

*Pedes* violacei.

*Var. α. elytris flavescentibus, minor.*

*β. elytris ferrugineis, major.*

*M. RUGOSUS*: *ater, villosus, elytris rubris punctato-rugosis*.

*Corpus* totum, exceptis elytris, atrum, villosum imprimis caput et thorax.

*Elytra* rubra, frequentissime impresso-punctata.

Differt a *M. algirico*, cui elytra laevissima et flava, eo quod duplo minor atque elytra punctata et rubra.

*M. FLAVUS*: *totus flavus, glaber, antennis tibisque nigris*.

Habitat in China.

*Corpus* *M. vesicatorio* duplo minus, totum glabrum, flavum.

*Antennae*, palpi, oculi et tibiae nigrae.

*M. CANTHAROIDES*: *flavus, glaber elytris cyaneis*.

*Cantharis melooides*. Mus. Catal. P. 4. p. 55.

Habitat in Capite bonae spei.

*Corpus* *M. vesicatorio* minus, totum glabrum, nitens, flavo-rubrum.

*Oculi nigri et tarsi fusi.*

*Elytra cyanea, tenuissime villosa et punctato-rugosa, immaculata.*

*Facies M. syriaci, sed minor et elytra cyaneo-viridia, non caerulea.*

*M. FIMBRIATUS: niger, elytrorum margine suturaque cinereis.*

*Habitat in Capite bonae spei.*

*Corpus totum nigrum, pilis cinereis tenuissime villosum.*

*Caput postice cinerascens.*

*Thorax lateribus et linea media cinereis.*

*Elytra atra margine omni cinereo.*

*Abdomen et femora cinerascens, pedibus magis nigris.*

*M. LINEATUS: elytris nigris: linea marginibusque cinereis, vertice capitis macula nigra.*

*Corpus totum tenuissime villosum.*

*Caput rubrum, ore, oculis maculaque frontis nigra.*

*Antennae nigrae articulis tribus infimis rubris.*

*Palpi rufescentes.*

*Thorax niger lineis tribus cinereis.*

*Elytra nigra margine omni cinereo, in medio linea cinerea apicem non attingente.*

*Abdomen et pedes toti nigri.*

*Similis M. vittato, sed duplo minor et valde distinctus.*

*M. VITTATUS: elytris, linea marginibusque flavis, vertice capitis 2-punctato.*

*Habitat in America.*

*Corpus totum pilis tenuissimis villosum, magnitudine M. Cichorei.*

*Caput rubrum: palpis, antennis, oculis et verticis punctis duobus nigris.*

Thos

*Thorax* niger lineis tribus rubris.

*Elytra* atra margine omni et linea media flavo-ferruginea.

*Abdomen* nigrum, cinereo-villosum.

*Pedes* nigri femoribus basi rubris.

*M. 14-PUNCTATUS*: ater, hirtus elytris flavis: punctis 14 nigris.

Habitat in Capite bonae spei.

*Corpus* paulo minus *M. vesicatorio*, totum atrum, hirtum pilis subcinereis.

*Elytra* lutea: margo posticus rotundatus, ater; intra marginem in ipsa costa linea et prope futuram punctum nigrum: in medio duo et intra apicem tria puncta inaequalia nigra.

*M. IMPAR*: ater, hirsutus, elytris flavis: fascia interrupta punctisque octo nigris.

Habitat in Capite bonae spei.

*Corpus* magnitudine *M. Cichorei*, totum atrum, hirsutum pilis nigris.

*Elytra* flava: pone basin in singulo puncta duo oblique posita, nigra; intra apicem puncta duo nigra, quorum exterius minus; in medio fascia undata, nec marginem nec futuram attingens.

*Similis* quidem *M. 10-punctato*; sed differt apice elytrorum flavo et fascia undata; a

*M. 10-punctato* et *M. 14-punctato* differt fascia, situ et numero punctorum.

*M. 10-PUNCTATUS*: ater, hirtus elytris flavis: maculis 10 nigris.

*Mylabris 10-punctata* Fabric. Mant. Inf. p. 216. et Spec. Inf. p. 331. non vero Meloë 4-punctata Linnaei Syst. Anim. p. 680.

Habitat in Capite bonae spei.

*Corpus* magnitudine *M. Cichorei*, totum atrum, hirtum.

*Elytra* laevia, tenuissime punctata. lutea: basi intra marginem lineola atra et punctum nigrum prope futuram; in medio macula major versus anteriorem marginem et in ipsa futura punctum minutissimum; in apice macula magna dentata nigra.

*Var. α. major*, macula media dentata.

*β. minor*, macula media minori angulata, antennis apice flavis.

*M. LUNATUS*: ater, hirtus, elytris lunula punctis fasciisque duabus flavis.

Habitat in Promontorio bonae spei.

*Corpus* *M. Cichoreo* paulo majus, nigrum, villosum.

*Antennae* glabrae, basi nigrae, apice articulis 5 luteis.

*Elytra* atra, costis tribus obsoletis notata, tenuissime punctata: in ipsa costa marginis macula lutea et alia lunata in basi versus futuram flexa, illam tamen non attingens; in medio et intra apicem fascia lata, lutea, denticulo invicem communicantes.

*M. BICOLOR*: ater, villosus, elytris antice flavis, postice ferrugineis; fasciis tribus punctisque duobus nigris.

Habitat in Capite bonae spei.

*Corpus* magnitudine *M. Cichorei*, totum atrum, tenuissime villosum pilis nigris brevibus.

*Elytra* antice lutea, postice ferruginea, frequentissime impresso-punctata, obtusa, antice et margine postico tenuissime villosa: fascia baseos communis tridentata, apicis terminalis lunata, media latissima, inprimis postice den-



dentata; omnes transversales, nigrae; inter fasciam baseos et mediam punctum parvum, nigrum, mediam inter suturam et marginem anteriorem.

**M. 3-PUNCTATUS:** ater hirtus, elytris flavis: fasciis duabus punctisque sex nigris.

Habitat in Capite bonae spei.

**Corpus** *M. Cichoreo* majus, totum atrum, valde villosum, etiam elytris pilis nigris, erectis.

**Elytra** flava: puncta pone basin in singulo tria, nigra, oblique posita, quorum interius majus; in medio fascia nigra; apicis macula magna, lunata, atra.

**Var. α.** Major, fascia media transversa, biarticulata, seu in medio coarctata.

**β.** Minor, fascia media transversa, subdentata.

**γ.** Major fascia media interrupta in medio singuli elytri, sic ut potius formet puncta duo marginalia, quorum exterius magis oblongum.

**M. COECUS:** ater hirtus, elytris rubris: fasciis quatuor nigris obliquis.

Habitat in Capite bonae spei.

**Corpus** magnitudine *M. Cichorei*, totum atrum, nigro-villosum.

**Elytra** rubra: fascia lata in ipsa basi, transversa, undata; fascia media obliqua e maculis duabus coalita; pone hanc alia, similis fascia; ipse apex oblique niger.

**Var. α.** Maculis duabus sanguineis singuli elytri intra fasciam baseos; fascia tertia interrupta; fascia secunda et tertia suturam non tangentibus.

*Var. β. Macula unica sanguinea singuli elytri baseos; fascia tertia non interrupta, suturam tamen non tangente.*

*γ. Macula baseos sanguinea obsoleta vel nulla; fascia tertia coalita, suturam non attingente.*

**M. 3-FASCIATUS:** ater glaber, elytris rubris: fasciis tribus nigris.

*Corpus maximum, totum atrum, glabrum.*

*Elytra rubra; fasciis tribus nigris; prima pone basin, angustissima, recta, suturam non attingente; secunda paulo pone medium, latiori, undulata, omnino transversa; tertia apicis, latissima, subdentata.*

**M. PUSTULATUS:** ater hirtus, elytris atris: fasciis duabus punctisque duobus sanguineis.

*Habitat in Capite bonae spei.*

*Corpus maximum, totum atrum. valde hirsutum, etiam elytris antice pilis nigris.*

*Elytra atra, tenuissime impresso-punctata et lineis aliquot elevatis obsoletis costata, obtusissima; prope basin in singulo prope suturam macula rotundata, sanguinea; paulo ante medium fascia omnino transversa, rubra; intra apicem fascia rubra.*

*Var. α. Macula baseos duplici: altera in singulo elytro, marginali, sanguinea; altera juxta suturam posita fasciisque undato-dentatis.*

*β. Macula baseos solitaria in singulo elytro fasciisque latissimis, vix undatis.*

**M. OCULATUS:** ater hirtus, antennis apice elytrisque maculis duabus fasciisque totidem luteis.

*Habitat in Capite bonae spei.*

Cor-

*Corpus maximum, M. Cichoreo quadruplo majus, totum, exceptis elytris et antennarum apicibus, atrum, cinereo-villosum.*

*Antennae moniliformes, ultimis septem articulis flavis.*

*Elytra tenuissime punctato-rugosa, atra: juxta basin in singulo macula orbiculata, major, lutea; in medio fascia lata lutea et alia intra apicem lata, subdentata.*

*Var. α. Fascia media aequali, transversa.*

*β. Fascia media versus suturam subinterrupta.*

*M. UNDATUS: ater hirtus, elytris fasciis tribus luteis, undatis.*

*Habitat in Capite bonae spei.*

*Corpus minus, M. Cichoreo quadruplo minus, totum atrum, hirtum pilis nigris, erectis.*

*Elytra atra, tenuissime punctato-rugosa: fascia baseos subabrupta in sutura; marginem anteriorem non attingens; media undulata; in margine exteriori hamum versus basin exferens; postica intra apicem undulata, omnino transversa; omnes luteae tennes.*

*M. 4-FASCIATUS: ater villosus, elytris fasciis quatuor luteis.*

*Habitat in Capite bonae spei.*

*Corpus magnitudine M. Cichorei, totum atrum, villosum.*

*Elytra atra, tenuissime punctato-rugosa: prima fascia baseos; secunda ante medium; tertia pone medium, undata; quarta intra apicem, retrorsum lunata.*

*Var. α. fascia baseos undulata, secunda abrupta, puncto marginali libero.*

*β. baseos punctis duobus, fascia secunda undata, transversa.*

**M. 10-GUTTATUS:** *ater villosus, elytris maculis duodecim flavis.*

Habitat in Capite bonae spei.

Corpus totum atrum, villosum, *M. Capensi* duplo minus.

*Elytra* atra maculis duodecim, rotundis, flavis, per paria dispositis: duabus ante apicem, duabus in medio, una in basi juxta futuram et una magis oblonga in ipso margine antico.

Differt a *M. capensi*: magnitudine minori, dispositione macularum et inprimis anticis distinctis nec lunatis.

**M. 16-GUTTATUS:** *ater villosus, elytris maculis quatuordecim flavis.*

Habitat in Capite bonae spei.

Corpus maximum, totum atrum, tenuissime villosum.

*Elytra* atra, tenuissime punctato-rugosa: in ipsa basi maculae duae, altera prope futuram orbiculari, altera in margine interiori oblonga; in singulo elytro ante medium maculae tres, rotundae, transversae; intra apicem exterius macula subrotunda et superius macula cordata, e duabus coalita; omnes luteae.

#### EURYCHORA.

*Antennae* filiformes.

*Thorax* depressus, concavus.

**E. CILIATA:** *nigra glabra, thoracis elytrorumque marginibus elevatis ciliatis.*

*Pimelia ciliata.* Fabric. Mant. Insect. p. 209. Ejusd. Spec. Insect. p. 319.

Habitat sub lapidibus in Cap. bonae spei, gregaria, saepissime tecta tela tenuissima, torta, albida.

Cor-



*Corpus* magnitudine fere *Silphae atratae*, totum nigrum, ovatum, trigonum, laevissimum et glaberrimum.

*Antennae* filiformes, articulis decem: tertio articulo longiore, ultimo paulo crassiore trigono; totae pilis brevissimis cinereis decumbentibus tectae.

*Thorax* depressio-concavus lateribus alato-elevatis, antice emarginatus pro capite, postice truncatus: margo omnis pilis cinereis ciliatus.

*Pectus* gibbum, sulco transverso impressum.

*Elytra* connata, nigra, laevia absque ulla stria, glabra, nitida, medio dorso gibba, marginibus paulo elevata, pilis cinereis ciliata.

*Abdomen* trigonum.

*Pedes* pilis cinereis brevissimis decumbentibus hirti: *femora* inermia; *tibiae* terminatae spina duplici; *tarsi* quinque; *digiti* unguiculati.

#### PIMELIA.

*Antennae* moniliformes.

*Thorax* rotundatus, gibbus, emarginatus, postice truncatus.

*Elytra* connata, undique deflexa, alis nullis.

*Corpus* ovatum, valde gibbosum.

P. STRIATA: nigra elytris lineis septem rubris.

*Pimelia striata*. Fabric. Mant. Insect. p. 207.

EjUSD. System. Entom. p. 251.

Habitat in Cap. bonae spei satis frequens inter lapides collium.

*Corpus* magnitudine *Melolonthae vulgaris*, sed crassius et magis inflatum, ovatum, undique gibbosum, totum nigrum, glabrum.

*Caput* thorace angustius eique exceptum, punctatum, antice lacuna impressa et ore depresso.

*Oculi*

*Oculi* semicirculares, rufescentes.

*Antennae* moniliformes, articulis subconicis sensim versus apicem brevioribus, tenuissime villosae, unguiculares seu longitudine capitis cum thorace.

*Thorax* convexus, marginatus, laevis, antice excisus pro capite, postice truncatus, medio latior, margine laterali obsolete ferrulato.

*Elytra* connata, dorso gibba, postice et lateribus deflexa, marginata, laevia absque striis et punctis: saepe notata lineis septem rufis, scilicet una communi suturae ad apicem usque elytrorum ducta et tribus in singulo elythro apicem non attingentibus. Nulla linea basin elytrorum attingit. Subtus elytra lato margine costa acuta distincto inflectuntur.

*Pectus* et *abdomen* etiam laevia, vel tenuissime striata.

*Abdomen* segmentis quinque: secundo in medio macula notatur magna, rotunda, cinerea.

*Pedes* punctato-rugosi; *femora* inermia; *tibiae* spina duplici terminantur; *tarsi* quinque-articulati unguibus binis.

*Var. α.* *Lineis rubris elytrorum exstantibus.*

*β.* *Lineis elytrorum obsoletis.*

*P. PILOSA:* *nigra elytris postice pilosis.*

*Pimelia pilosa* *Mus. Catal. P. 4. p. 49. Fig. 20.*

Habitat in Cap. bonae spei rarior.

*Corpus* magnitudine et figura *Pimeliae striatae*, totum atrum.

*Caput* convexus, glabrum et laeve, clypeo et margine postico ciliato.

*Antennae* et *palpi* ferrugineo-villosi.

*Oculi* lunares, punctati, cuprei.

Tho-

*Thorax* convexus, laevissimus, antice excisus, postice rotundatus, marginatus margine obsolete scabro.

*Elytra* connata, valde gibba, lateribus et postice inflexa, margine laterali duplici: sulco glaberrimo interjecto; basi laevia et impunctata, a medio ad apicem punctis elevatis minutissimis scabrida et pilis cinereis longioribus villosa.

*Pectus* glabrum, subrugosum.

*Abdomen* glabrum, elytris angustius.

*Pedes* cinerascens, villosi, punctato-rugosi; femora inermia; tibiae bispinosae; tarsi quinque ungue duplici.

*P. SCABRA*: atra, glabra, elytris postice muricatis.

*Pimelia scabra*. Fabric. Mant. Insect. p. 208.

EjUSD. Syst. Entomolog. p. 251.

*Pimelia scabra*. Mus. Catal. P. 4. p. 44. Fig. 24.

Habitat in Capite bonae spei.

*Corpus* magnitudine fere *Pimeliae striatae*, totum atrum, glabrum, nitens.

*Antennae* villo cinereo testae.

*Caput* deflexum labio ferrugineo-ciliato.

*Oculi* lunati, fusco-cuprei, punctato-rugosi.

*Thorax* valde gibbus, laevissimus, antice pro capite exciso-subspinosus, postice truncatus, undique marginatus.

*Elytra* connata absque striis et punctis impressis, medio dorso valde gibba, lateribus deflexa margine lato duplici, postice incurvata; a basi fere ad medium laevia, inde ad apicem punctis elevatis frequentissimis muricata, inter quae quasi lineae tres ex hisce spinulis formantur.

*Pectus*

*Pectus et Abdomen gibbosa.*

*Pedes omnes cinereo-villosi, ut in praecedentibus.*

*Var. α. Major abdomine immaculato.*

*β. Minor macula in segmento secundo ferrugineo-tomentosa.*

**P. GIBBOSA:** *atra, glabra elytris sulcatis lineisque tribus elevatis.*

*Pimelia gibbosa. Mus. Catal. P. 4. p. 49. Fig. 23.*  
Habitat in promontorio bonae spei.

*Corpus habitu praecedentium, sed paulo minus, totum atrum glabrum.*

*Antennae et pedes cinereo-villosi.*

*Oculi lunares obscure cuprei.*

*Thorax, pectus et abdomen ut in Pimelia scabra, etiam macula tomentosa ut in varietate β.*

*Elytra connata, deflexa, incurva, acutiuscula margine duplici sulcoque intejecto; supra sulci tres, subrugosi et prope hos in singulo costae tres elevatae, integrae vel subcrenatae postice coeuntes, nec tamen basin nec apicem attingentes.*

**P. PLANATA:** *atra, glabra elytris costa unica crenata.*

*Pimelia gibba. Fabric. Mant. Insect. p. 207.*

*Pimelia planata. Mus. Catal. 4. p. 49. Fig. 22.*  
Habitat in Capite bonae spei.

*Corpus statura et magnitudine Pimeliae scabrae, totum atrum, glabrum.*

*Thorax lateribus obsolete rugosus.*

*Elytra connata margine duplici, quorum superior subcrenatus; supra fere omnino plana, laevia vel obsolete rugosa, postice valde deflexa uti et lateribus; latera imprimis postice tenuif-*



tenuissime impresso-punctata; costa inter latera et dorsum elevata, crenata, nec basin omnino, nec apicem attingens.

## ERODIUS.

*Antennae moniliformes.*

*Thorax transversus, convexus.*

*Elytra connata, gibba, saepius muricato-hispida.*

*Corpus ovatum, gibbum.*

*E. TESTUDINEUS: ater thorace exciso glabro, elytris muricatis.*

*Erodus testudinarius. Fabr. Mant. Inj. p. 215. Ejusd. Spec. Insect. p. 326.*

*Habitat in Capite bonae spei, vulgaris.*

*Corpus magnitudine Silphae grossae, gibbum, atrum, glabrum.*

*Caput minimum, laeve.*

*Thorax antice lacuna quadrata pro capite excisus, postice trilobus, convexus, laevissimus, margine acutissimo, immarginatus, sulco obsoleto intra latera.*

*Elytra medio dorso valde gibba, postice deflexa; margine acutissimo, subtus late inflexo: tota punctis minutis eminentibus scabra.*

*Femora et pedes impresso-punctata.*

*Interdum ex-argilla totus cinereus.*

*E. MINUTUS: ater, laevis thorace exciso.*

*Erodus minutus. Fabric. Mant. Inj. p. 215. Ejusd. Syst. Entom. p. 259.*

*Habitat in Capite bonae spei.*

*Corpus quadruplo minus E. testudineo et omnino simile, licet hic omnibus partibus laevis.*

*Antennae subperfoliatae, ultimis quatuor articulis sensim crassioribus.*

E.

**E. AFER:** *ater, glaber elytris octo-costatis muricatis.*

Habitat in Africae promontorio australi.

*Corpus* magnitudine *Silphae atratae*, totum atrum, glabrum et exceptis elytris laeve, nitidum.

*Caput* thorace duplo angustius, margine postico cinereo-villosum.

*Antennae* filiformi-moniliformes, articulis undecim, quorum tertius longior, tres ultimi paulo crassiores.

*Thorax* convexus, undique marginatus, antice lunato-excifus, postice rotundatus.

*Elytra* margine lato inflexa, supra octosulcata sulcis obsolete muricatis, costis octo elevatis integris, praeter futuram, inaequalibus, alternis postice coeuntibus, nec basin nec apicem attingentibus.

*Femora* inermia, tenuissime impresso-punctata.

*Tibiae* spina duplici, picea terminatae.

*Tarsi* quinque, digitis unguiculatis, spina duplici picea.

**E. LINEATUS:** *ater, scabra elytris lineis decem albis.*

*Sepidium lineatum.* *Mus. Catalog. P. 4. p. 48.*  
*Fig. 16.*

*Pimelia lineata.* *Fabric. Mant. Insect. p. 209.*  
*Ejusd. Spec. Insect. p. 319.*

Habitat in Capite bonae spei.

*Corpus* magnitudine *Silphae atratae*, totum atrum, undique muricatum.

*Caput* thorace angustius, ore exciso-spinoso.

*Thorax* convexus, immarginatus, antice parum lunatus, lateribus et postice rotundatus, medio et postice lacuna duplici depressus, muricatus.

*Ely.*

*Elytra* supra planiuscula, postice incurva, lateribus late inflexa, supra costa marginali et lineis quinque muricatis. Supra costae sex, et in utroque margine deflexo subtus duae, tomentoso-albae, postice coeunt, apicem non vero basin attingentes.

*Abdomen* sericeo-albidum.

*Pedes* ut in *E. afro*.

*E. PUNCTATUS*: cinereo-niger, muricatus elytris costis octo laevibus.

*Pimelia minuta*. Fabric. Mant. Insect. p. 209. Spec. Insect. p. 318.

Habitat in Capite bonae spei.

*Corpus* magnitudine variat, interdum *Silphae atratae* magnitudine, interdum duplo minus, totum atrum, sed pulvere cinereo undique tectum, tenuissime muricatum.

*Caput* deflexum, angustum.

*Antennae* moniliformes, *palpi* et *tarsi* picei.

*Thorax* transversus, subquadratus, antice excisus pro capite angulis subspinosis. medio coarctatus, postice rotundato-truncatus, margine laterali acuto elevato, supra parum convexus et quasi e pilis decumbentibus muricatus.

*Elytra* convexa, lateribus deflexa sub costa acuta, postice inflexa, singulum costis quatuor laevibus vixque crenatis, basin non apicem attingentibus. Ipse margo lateralis ex duabus costis constans.

*Femora* subtus plana. *Cetera* ut in prioribus.

*Variat* magnitudine, colore magis vel minus cinereo, punctis elytrorum sparsis ferrugineis.

*E. TUBERCULATUS*: ater thorace aequali, elytris sex-costatis pilosis inermi-muricatis.

Habitat in Capite bonae spei.

*Corpus* magnitudine *Silphae grossae*, atrum.  
*Caput* laeve, thorace parum angustius, ore piceo.  
*Antennae* filiformi-moniliformes. tertio articulo longiori, tribus ultimis villosis.

*Thorax* transversus, aequalis, convexus, marginatus, laevis.

*Elytra* margine laterali lato inflexa, postice deflexa, undique papillosa punctis obtusis elevatis, cineritie villosa interspersa, costis tribus laevibus notata, quae nec basin nec apicem attingunt.

*Pectus* et *abdomen* laevia, glabra.

*Pedes* muricati, ceterum ut in prioribus.

E. GLOBOSUS: ater, glaber thorace laevi, elytris ovatis: aculeis frequentissimis muricatis.

Habitat in Capite bonae spei.

*Corpus* globosum, atrum, glabrum, excepto thorace totum muricatum, magnitudine dupla *Byrrhi pilulae*.

*Caput* tenuissime impresso-punctatum, thorace angustius.

*Thorax* convexus, antice lunatus, marginatus, laevissimus.

*Elytra* margine inflexa, postice deflexa, undique muricata imprimis postice papillis elevatis; margines laterales cinerei.

*Pedes* ut in prioribus.

*Variat* magnitudine.

*Differt* a *Pimelia hispida Fabricii*: thorace laevi articulisque antennarum aequalibus.

a *Pimelia longipede*: thorace non canaliculato.

E. ECHINATUS: ater, glaber thorace laevi, elytris oblongis per series muricatis.

Habitat in Capite bonae spei.

Cor-



*Corpus* oblongum, atrum, glabrum, capite thoraceque exceptis totum muricatum, magnitudine *Silphae oblongae*.

*Caput* thorace paulo angustius, laeve, opacum, lamina ante oculos elevata.

*Palpi et antennae* piceae.

*Thorax* convexus, subaequalis vel antice parum undatus, marginatus, glaber, nitidus.

*Elytra* oblonga marginibus lateralibus inflexis punctatis, postice deflexa, supra per series muricata aculeis inaequalibus.

*Pedes* ut in prioribus, sed magis elongati.

*Variat* parum magnitudine.

**E. GLOMERATUS:** *ater, muricatus elytris costis sex serratis.*

*Pimelia serrata.* Fabric. Mant. Insect. p. 209.  
*Spec. Insect.* p. 217.

Habitat in Capite bonae spei.

*Corpus* magnitudine *Silphae oblongae*, vel paulo minus, totum atrum, obscurum, glabrum, muricatum.

*Caput* thorace paulo angustius, obsolete scabrum.

*Thorax* convexus, aequalis, vix marginatus, muricato-scaber.

*Elytra* cum abdomine subglobosa, margine laterali inflexa, postice deflexa, undique rugosa, costis in singulo tribus cristatis, serratis, praeter marginem lateralem serrulatum, per paria postice coeuntibus.

*Pectus, abdomen, femora* atra, opaca, punctata.

*Pedes* postici elongati.

*Tibiae* piceae.

*Variat* paulo magnitudine.

**E. RIFIDUS:** *ater, glaber thorace laevi, capite impresso, elytris costis sex serratis.*

*Pimelia dentata.* Fabr. Mant. Inf. p. 208.

Habitat in Capite bonae spei.

Corpus oblongum, atrum, glabrum, magnitudine *Silphae atratae*.

Caput atrum, opacum, obsolete punctatum, antice depressum figura dentata.

Antennae filiformi-moniliformes, capite thoraceque longiores.

Oculi cuprei.

Thorax convexus, subaequalis, laevissimus, marginatus, armato oculo tenuissime impresso-punctatus.

Elytra atra, postice cinerascens, opaca, undique aculeis minimis hispida, lateribus inflexa, deflexa apice, costis sex ferratis notata, exterioribus sensim longioribus, non coeuntibus, basin non vero apicem attingentibus. Costa marginalis postice bifida.

Pedes ut in prioribus, elongati.

E. CRENATUS: ater elytris cinereis: costis octo crenatis.

Habitat in Capite bonae spei.

Corpus oblongum, exceptis elytris totum atrum, opacum, scabridum.

Caput thorace parum angustius, tenuissime muricatum, lamina ante oculos pro antennis elevata.

Thorax convexus, marginatus, tenuissime punctatus.

Elytra tenuissime muricata, cinereo-tomentosa, marginibus lateralibus deflexis punctatis; costae octo crenatae, basin nec apicem attingentes, quarum extimae duae approximatae et extrema cum tertia coit.

Pedes elongati ut in prioribus.

E. HORRIDUS: thorace spinoso, elytris costis sex spinosis.

*Pime-*

*Pimelia Echinata.* Fabr. Mant. Insect. p. 208.  
Spec. Inf. p. 317.

Habitat in Capite bonae spei.

Corpus magnitudine fere *Silphae atratae*, sub-  
tetragonum, nigro-cinereum, scabrum, pu-  
bescens.

Caput deflexum, scabrum.

Antennae moniliformes, subpilosae.

Thorax subquadratus, cinereo-tomentosus mar-  
gine antico elevato, bifido: postico transverso,  
integro: laterali spina lata, erecta.

Elytra lateribus muricatis inflexa, postice de-  
flexa, tota muricata et praeterea notata costis  
senis, armatis spinis conicis, erectis, cinereo-  
tomentosis, quarum prima in humeris bifida.

Pedes cinerascens, piloso-scabridi.

#### SEPIDIUM.

Antennae filiformi-moniliformes.

Thorax medio latior.

Elytra convexa, incurva.

Corpus oblongum, convexum, apterum.

S. OBLONGUM: atrum, oblongum, abdomine ma-  
cula ferruginea, thorace lateribus rugoso.

Habitat in Capite bonae spei.

Corpus magnitudine fere *Sepidii Caraboidis*, ob-  
longum, laeve.

Caput thorace angustius, margine postico oreque  
ciliato, tenuissime impresso-punctatum.

Oculi cuprei.

Antennae apice crassiores, pilosi, palpique picei.

Thorax convexus, medio latior, obsolete mar-  
ginatus, supra laevis, tenuissime punctatus,  
lateribus rugosus.

Elytra bimarginata margine inflexo, laevia, ob-  
solete striata.

*Abdomen punctatum*, medio macula magna ferrugineo-tomentosa.

*Pedes punctati*, hirti.

S. NOTATUM: *atrum*, *ovatum* abdomine macula ferruginea, *thorace obsolete muricato*.

Habitat in Capite bonae spei.

*Corpus* magnitudine *Carab. mediocris*, *ovatum*, *atrum*, *opacum*.

*Caput* tenuissime muricato-papillosum, ore et margine postico ciliatum.

*Antennae* capitis thoracisque longitudine, articulis 10, apice piceae.

*Palpi* articulis tribus, picei.

*Thorax* convexus; antice posticeque truncatus, lateribus rotundato-dilatatus, marginatus, papillofus.

*Elytra* connata, incurva, ovata, glabra, striis obsoletis, marginata margine inflexo duplici.

*Abdomen* impresso-punctatum, macula oblonga ferruginea, pilosa, priora tria segmenta tegente.

*Pedes* villosi. *Tibiae* spinosae. *Digit*i unguiculati.

S. MARGINATUM: *atrum*, *glabrum* elytris 8-sulcatis: *fulcis rugosis*.

Habitat in Capite bonae spei.

*Corpus* magnitudine *Silphae grossae*, *atrum*, *glabrum*.

*Caput* thorace angustius, antice attenuatum et depressum, tenuissime papillosum, opacum.

*Thorax* antice et postice truncatus, lateribus dilatatus, marginatus, tenuissime papillofus, opacus.

*Elytra* connata, dorso valde gibba, nitida, margine inflexo duplici, costis octo integris notata interque has fulcis totidem punctato-rugosis. Costae nec omnino basin, nec apicem attingunt.



*S. STRIATUM*: atrum, glabrum elytris 8-fulcatis: *fulcis laevibus*.

Habitat in Capite bonae spei.

Corpus magnitudine *Sepidii Caraboidis*, totum atrum, opacum, glabrum.

Caput angustum antennis subfiliformibus, villosis.

Thorax convexus, medio dilatatus marginatus.

Elytra oblonga, connata, latere inflexo-bimarginata, tota laevia, costis octo abbreviatis et fulcis totidem obsoletis.

*S. RETICULATUM*: cinereum elytris reticulatis: costis quatuor undulatis.

*Sepidium reticulatum*. Mus. Cat. P. 4. p. 48. absque figura.

Habitat in Promontorio bonae spei prope urbem sub lapidibus satis frequens.

Corpus magnitudine *Silphae grossae*, supra cinereo-tomentosum, subtus fuscum, oblongum.

Caput thorace angustius, deflexum.

Antennae moniliformes articulis undecim: primo globoso, secundo minimo, tertio oblongo; totae hirtae.

Thorax convexus, subcordatus, antice lateribus dilatatus, cinereo-tomentosus, caracteribus tribus, litteris V oppositis referentibus, nigris.

Scutelli loco punctum nigrum.

Elytra subconnata lateribus inflexo-bimarginatis, supra planiuscula, tota cinereo-tomentosa, reticulata venis transversis et costis undulatis, nigris. Costa media elevatior ante apicem cum opposita coit; intermediae obsoletiores.

Subtus nigro-cineraescens.

Variat valde magnitudine.

*S. LACUNOSUM*: cinereo-nigrum thorace elytris-que costato-rugosis.

*Sepidium lacunofum. Mus. Cat. P. 4. p. 48. Fig. 14.*

Habitat in Capite bonae spei, sub lapidibus.

Corpus magnitudine *Silphae oblongae*, subtrigonum, nigro-cinereascens.

Caput subquadrato-angulatum.

Antennae subfiliformes, apice crassiores.

Thorax ovatus, varie angulatus, lateribus dilatatus; supra costae duae, flexuosae, serratae, nigrae et extra has fasciculos papillarum nigrarum.

Elytra connata, margine deflexa, postice valde inflexa, supra rugoso-lacunosa et reticulata ex papillis concatenatis et sparsis nigris. In lateribus lineola ex papillis. Apex laevis.

Subtus omnia laevia, cinerea.

**S. VITTATUM:** cinereo-nigrum thorace marginibus elytrisque lineis quatuor.

*Sepidium vittatum. Mus. Cat. P. 4. p. 48. Fig. 15.*

Corpus magnitudine *S. sabulosae*, totum nigrum, cinereo-villosum, oblongum.

Caput antice depressum.

Oculi nigri.

Antennae capitis thoracisque longitudine, moniliformes, sensim vix manifeste crassiores, pilosae.

Thorax convexus, lateribus dilatatis cinereis.

Elytra bimarginata, incurvata, sensim attenuata, lineis quatuor cinereis notata, unica in utroque latere et unica in medio singuli elytri, apicem non attingente. Inter has lineas in medio singuli elytri est costa elevata, laevis.

Pectus nigrum cineritiae tectum tenuissima.

Abdomen et pedes nigri.

Variat parum magnitudine.

DISSERTATIO  
SISTENS  
CHARACTERES  
GENERUM INSECTORUM.

D. IO. JUN. 1789.

RESP.

SAMUEL TOERNER.

PROOEMIUM.

**E**am utique deprehendimus Systematum in gratiam Entomologiae concinnatorum copiam, ut plura ejusdem generis molimina supervacanea videantur. Sic strenuam et felici cum successu in illa excolenda atque ad fastigium perducenda operam collocarunt bene multi Systematici eo directam, ut ad naturae foetus scrutandos facilius panderetur aditus. Sed in hoc praestando in diversa abierunt Auctores, dispari modo sciendi cupidus satisfaciens. Quos inclitos scientiae Conditores maximopere supereminet Historiae Naturalis stator immortalis A LINNÉ; qui Summus Vir, ut ob sparsa lumina per reliquas Historiae ejusdem partes incomparabilis, sic etiam ex Insectis Systematica serie tradendis nihil non gloriae reportasse dicendus est. Grato ac perspicuo proponendi more se ubique commendat hujus ingeniosissimi Viri

methodus, naturae curiosos in sui amorem ac admirationem vi quadam ipsi propria rapiens.

Hic etiam silentio neutiquam praetermittere possumus de re Entomologica longe meritissimi Prof. FABRICII indefessam et eximiam plane operam, qui novum condendo Systema, Entomologorum in se convertit oculos, et cujus Scripta celeberrima omnium eorum jam versantur manibus. Maxime sane consentaneum omnium foret votis, ut hunc incredibili praeditum perspicacia Virum in subtilissimis insectorum partibus quisque assequi, et ipsius Characteres genericos eruere valeret. Cum vero ea sit oporteat hujus amoenae Scientiae indoles, ut ejus principia, quoad fieri possit, pervestigatu facili methodo proposita, in omnium sese insinuent oculos cultorum, vereor ne potius nimiae curiositati satisfaciendae inserviat labor, in instrumentis cibariis insectorum, secundum methodum Fabricianam, adeo ad unguem resecandis, collocatus, quam intento respondeat usui; atque Scientiae cultores Nomenclaturae supra laudati Viri magis adhaereant, habitum insectorum in ejus operibus traditorum ex Synonymis Linnaeanis pernoscentes, quam notas Genericas ipsius Systematis irritò perquirere nitantur. Nos igitur Systema scrutatorum captui accommodatum exigendo, castra Fabriciana deferere cogimur, characteres generibus insectorum ab ipso impositos, in minoribus praecipue, haud difficiles modo, sed esse inextricabiles plane persuasi: proinde aliis, quibus volupe erit, aequè lynceis naturae scrutatoribus mandibulas ac maxillas insectorum earumque situm et dentes eruenda relinquimus, contenti, si in externis, aut magis conspicuis haud destruendi animalis partibus notas quasdam detegere valemus horum animan-



animantium familiis discernendis applicatas. Quo in negotio, si LINNAEI vestigia legentes ab istis nos interdum desletere offendimur, id mirum non erit perpendenti, tot esse insectorum species post tempora ipsius detectas, ut ad singulas inveniendas et rite cognoscendas opus sit illas in plura genera disjungere; cujus rei necessitatem adeo quemvis perspicere convincimur, ut omnem demonstrationem superfluum ducamus.

Ad ordines insectorum quod attinet, illos, quos statuit A LINNÉ, integros servamus, divortia sententiarum cum FABRICIO facientes, qui Apem, Ephemeram et Oniscum sub eadem classe confociat, qui Libellulam et Araneam simili modo conjungit, et Acarum ac Oestrum sub eodem ordine proponit.

Difficultate ergo in hisce mire variantibus animalculis dignoscendis pensitata, Celeber. D. Praeses, pro suo in Historiae Nat. incrementa ardore de eo fuit sollicitus, ut Entomologorum labor hac in re quodammodo sublevaretur; quem in finem praefens opusculum eorum proponitur discrimini, quo pacto sciendi cupidis methodus, qua in Museo Acad. Upsal. adornando usus sit, cum illis emendationibus, quas, post illius jam editum Catalogum, iteratae observationes instituendas suaserunt, simul innotescat.

Editurus Specimen quoddam Academicum rogavi, ut vires in illo negotio conficiendo mihi periclitari permetteret idem Vir Celeberrimus. Quamobrem hos Characteres insectorum qualescunque Tibi B. L. sistit tennis mei ingenii suppellex, indulgentem juveniliū conatum excusationem enixe mihi expetens.

\* \* \*

## I. COLEOPTERA.

*α. Antennis clava solida.*

PAUSUS: Clava uncinata. Elytra abbreviata.

HISTER: Caput retractum. Elytra abbreviata.

COCCINELLA: Corpus hemisphaericum, subtus planum.

ANTHRENUS: a) Caput retractum. Thorax antice coarctatus. Corpus ovatum.

ELOPHORUS: Thorax quadratus. Elytra aequantia.

*β. Antennis clava bulbiformi.*

BULBOCERUS.

*γ. Antennis clava lamellata.*

LUCANUS: Maxillae porrectae.

SCARABAEUS: b) Caput extuberans. Tergum scutellatum.

COPRIS: Caput extuberans. Tergum exscutellatum.

MELOLONTHA: Caput muticum.

Trox: Caput retractum. Abdomen subtus planum.

*δ. Antennis clava perfoliata.*

CURCULIO: c) Caput rostratum, postice incrassatum.

ATTELABUS: Caput rostratum, postice attenuatum.

HYDROPHILUS: d) Corpus ovale, fornicatum. Pedes natatorii.

SPHAERIDIUM: e) Corpus ovatum, fornicatum. Pedes gressorii.

BYR-

a) Sub Byrrhi nomine comprehensus in Cat. Mus. Ups.

b) Hoc, ut sequens genus, thoracem induit elytris adaequatum, ampliato productum, sed Melolonthae thorax est elytris inadaequatus, angustatus, brevis.

c) Antennae insidentes rostro, ab oculis remotae.

d) Hydrous Cat. Mus. Ups.

e) Corpus ad hemisphaeticam figuram accedit in plurimis. Thorax ampliatus.

BYRRHUS: *f*) Corpus ovatum, convexum. Thorax antice coarctatus.

DERMESTES: Corpus oblongum, depressiusculum. Thorax antice attenuato-coarctatus.

BOSTRICHUS: *g*) Caput retractum. Thorax teres. Corpus cylindricum.

ANOBIUM: *h*) Corpus lineari-oblongum. Caput deflexum. Elytra flexilia.

TRITOMA: *i*) Corpus lineare, depressum. Thorax quadratus.

IPS: *k*) Corpus ovato-oblongum, uudique convexum.

SILPHA: *l*) Thorax Elytraque lateribus explanatis.

NITIDULA: *m*) Thorax transversus. Elytra truncata.

NECROPHORUS: *n*) Thorax rotundatus, lateribus explanatis. Elytra plana, truncata.

*ε. Antennis moniliformibus.*

OPATRUM: *o*) Thorax convexus, antice lunatus, lateribus explanatis. Elytra convexa.

BRU-

*f*) Ingreditur Sphaeridii genus in Cat. Mus. Upf.

*g*) Ips Cat. Mus.

*b*) Obs. Caput thoraci subaequale. Thorax rotundatus. Antennae in quibusdam Speciebus moniliformes.

*i*) Cum hoc caractere conveniunt Dermestes ferrugineus, Tritoma colon. Obs. Caput exsertum.

*k*) Genus Fabr. ad quod pertinet Ips aenea: huc quoque referimus Silpham ruficam in Cat. Mus.

*l*) Corpus depressiusculum, ovatum. Caput retracto-inflexum. Antennae moniliformes in multis.

*m*) Corpus quadratum.

*n*) Hoc genus constituunt Nitidula littoralis et N. vespillo Cat. Mus. Upf. Nicroph. in scriptis Fabr. sphaema forte est.

*o*) Huic associantur Silpha cornuta, Hispa mutica et Opatrum Fabr.

- BRUCHUS: Caput retracto-inflexum. Thorax antice angustatus. Elytra obtusa.
- HISPA: p) Thorax antice angustior, immarginatus. Elytra obtusa.
- CASSIDA: Corpus convexum, subtus planum. Thoracis clypeus caput obtegens.
- CHRYSOMELA: Corpus ovatum. Thorax transversus, marginatus. Elytra immarginata.
- ALTICA: Pedes saltatorii.
- MORDELLA: Corpus incurvatum. Elytra attenuata. Lamina ante femora.
- ERODIUS: Thorax transversus, convexus. Abdomen subglobosum.
- MELOE: q) Caput inflexum. Thorax lateribus adpressus, subrotundus. Elytra linearia, flexilia.
- CLERUS: Caput thorace latius, resimium. Thorax postice attenuatus. Elytra flexilia.
- SPONDYLIS: r) Thorax elytris angustior. Corpus subcylindricum.
- PIMELIA: s) Thorax rotundatus, convexus, marginatus. Elytra convexa, bimarginata.
- TENEBRIO: t) Thorax antice lunatus, elytris subaequalis, marginatus. Corpus oblongum.
- STAPHYLINUS: u) Elytra abbreviata. Cauda bifida.
- §. An-

p) Antennae porrectae, approximatae. Corpus saepius aculeatum.

q) Caput grande, retusum.

r) Ad hoc genus referimus Tenebrionem asperum, Spond. buprestoiden, quamvis antennae non nihil abluant.

s) Difficillime ab hoc genere dissociari queunt Sepidii plurimae Species in Cat. Mus., hinc combinavimus. Sepid. vittatum Erodii intrat genus.

t) Thorax fere quadratus.

u) Corpus lineare. Abdominis margo elevatus. Vesiculae 2 supra caudam exferendae. Alae elytris obiectae.



3. *Antennis filiformibus.*

GYRINUS: Antennae cylindricae, capite breviores. Oculi quatuor.

NOTONUS: Thorax gibbus, utrinque attenuatus.

PTINUS: Caput retracto inflexum. Thorax antice coarctatus.

MELYRIS: Caput inflexum. Thorax bimarginatus.

CRIOCERIS: Antennae approximatae. Thorax subquadratus. Elytra oblonga.

CRYPTOCEPHALUS: Caput retuso-retractum. Elytra obtusa. Corpus cylindricum.

AVCHENIA: α) Thorax teres, elytris depressiusculis angustior.

EVRYCHORA: γ) Thorax subquadratus, depressius, margine sursum dilatato. Elytra depressa.

SEPIDIUM.

CUCUJUS: Corpus depressum. Thorax postice rotundatus.

BUPRESTIS: ζ) Caput thoraci semi-intrusum.

ELATER: Pectoris mucro e poro abdominis reliens.

η. *Antennis setaceis.*

SCARITES: α) Thorax lunatus, postice rotundatus.

CARABUS: Thorax obcordatus, postice truncatus, marginatus.

CICINDELA: Oculi prominuli. Thorax inaequalis.

DONA-

α) Sub hac adpellatione complectimur Crioceridis generi quasdam species antea iunctas e.g. *Cr. merdigeram*, *cyaneellam*.

γ) Ad hoc genus amandamus *Pimeliam ciliatam* (Cat. Mus.)

ζ) Obs. Oculi in *Buprestide* fere oblongi, in *Elatere* rotundi.

α) *Carabus maxillofus*, *Tenebrio fossor* &c. hoc continent genus.

DONACIA: *b*) Thorax quadratus, immarginatus.

CISTELA: *c*) Corpus oblongum, fornicatum.

Thorax marginatus, antice angustior.

DYTISCUS: Thorax transversus. Pedes natatorii.

LEPTURA: Thorax subglobosus, muticus, antice angustior.

CALLIDIUM: *d*) Thorax rotundatus, muticus.

SAPERDA: *e*) Thorax cylindricus, muticus.

PRIONUS: *f*) Thorax planus, margine acuto, crenulato-spinoso.

CERAMBYX: \*) Thorax lateribus extuberantispinosus.

CALO-

*b*) Habitus nobis persuasit esse Calopum aquaticum, Spondyl. femoratum (Cat. Mus.) heic conjungendas.

*c*) Heic in considerationem veniunt Crioceris sulphurea, C. ceramboides, similesque in Cat. Mus.

*d*) Comprehendit Cerambycem rusticum, et hujusmodi in LINNAEI System.

*e*) e. g. Carcharias (Ceram. INN.)

*f*) e. g. Cerambyx coriarius Cat. Mus.

\*) Viderentur quidem diversi in Cerambycis genere habitus diversa prodere genera, inodo character in his semper constans et perspicuus observaretur. Curiosorum ergo velificantes desiderii varias hujus generis facies ita proponimus: IAMIA: Thorax teres, spinosus. Elytra elunata. (i. e. postice convexa.) CERAMBYX: Thorax teres, spinosus. Elytra fastigiata, linearia. Obs. fastigiatum sumitur eo sensu, quo a LINNAEO adhibetur in Luprest. rustica. RHAGIUM: Caput elongatum. Thorax teres, spinosus. Elytra subfastigiata, cuneata. SIENOCORUS: Caput elongatum. Thorax teres, extuberans. Elytra cuneata. Adduntur tum etiam ceteris adfinibus sequentes notae disjunctivae: CALOPUS: Thorax cylindricus, elytris angustior, muticus. Elytra elunata. SAPERDA: Thorax cylindricus, muticus. Elytra fastigiata. CALLIDIUM: Thorax rotundatus. Elytra fastigiata.

CALOPUS: g) Thorax teres. elytris angustior.  
Corpus cylindricum.

CANTHARIS: Caput exsertum. Clypeus thoracis planus, elytris aequalis. Elytra linearia, flexilia.

PYROCHROA: h) Caput exsertum. Thorax rotundatus. Elytra flexilia. Corpus postice incrassatum.

CALOLYMUS: i) Caput globosum. Thorax antice coarctatus. Elytra linearia, flexilia.

MALACHIUS: Elytra attenuato-angustata.

LAMPYRIS: Caput tectum clypeo thoracis. Elytra flexilia.

NECYDALIS: k) Elytra abbreviata. Cauda simplex.

FORFICULA: Elytra abbreviata. Cauda forcipata.

## 2. H E M I P T E R A.

\* *Os maxillosum.*

\* *Antennae ensiformes.*

TRUXALIS: Caput conicum, elongatum.

\*\* *Antennae filiformes. Os maxillis.*

ACRYDIUM: Thorax ultra alas productus.

GRYLLUS: l) Thorax hemelytris brevior. Alae deflexae.

PNEUMORA: Alae planae. Corpus inane, inflatum.

\*\*\* *An-*

g) Ab hoc genere non abluunt Cantharis viridiss. et Calopus ferraticornis.

h) Nos, ut Fabricius, sub hac Canthar. pectinicornem LINN. consideramus.

l) Lymexylon Fabr. it. Floris.

k) Obs. Alae exsertae, nudaе; Forficulae tectae.

l) Alae lateribus corporis adpressae, item in Locusta.

\*\*\* *Antennae setaceae. Os maxillis.*

LOCUSTA: Alae deflexae. Pedes saltatorii.

ACHETA: Alae incumbentes, inferiores caudatae.

BLATTA: *m*) Pedes cursorii: Antici breviores.

MANTIS: Pedes antici raptorii, longiores.

✠✠ *Os rostratum.*

FULGORA: Antennae capitatae. Frons producta, inanis.

CICADA: *n*) Antennae subulatae. Alae deflexae.

MEMBRACIS: *o*) Antennae subulatae. Thorax gibbus, postice attenuato-productus, abdomen adaequans.

TETTIGONIA: *p*) Antennae subulatae. Alae deflexae. Laminae ad femora postica.

CIMEX: Antennae articulatae. Alae planae, cruciatae. Pedes cursorii.

NOTONECTA: Pedes posteriores natatorii.

NEPA: Pedes anteriores cheliformes, reliqui ambulatorii.

APHIS: *q*) Antennae setaceae, thorace longiores. Alae, ubi adsunt, erectae. Pedes ambulatorii.

CHERMES: Rostrum pectorale. Antennae setigerae. Alae deflexae. Pedes saltatorii.

COCCUS: Rostrum pectorale. Antennae filiformes, breves.

THRIPS: *r*) Rostrum obsoletum, rima. Alae incumbentes, subcruciatae. Abdomen sursum reflexile.

3. LE-

*m*) Thorax orbiculatus.

*n*) Pedes saltatorii.

*o*) Cicada cornuta LINN. hujus est generis.

*p*) Cicadae manuiferae, non saltantes (LINN.) haec nobis insigniuntur.

*q*) Abdomen saepe postice bicornae.

*r*) Alae duae.



## 3. LEPIDOPTERA.

PAPILIO: s) Antennae apicem versus crassiores. Alae patulae.

SPHINX: t) Antennae medio incrassatae. Alae deflexae.

BOMBYX: u) Antennae pectinatae. Lingua recondita. Alae deflexae, ampliatae.

NOCTUA: Antennae setaceae. Lingua spiralis. Alae deflexae, angustatae.

PHALAENA: v) Antennae filiformes pectinataeque. Alae patentes.

PYRALIS: x) Antennae filiformes. Alae deflexae, angustatae.

TORTRIX: Antennae filiformes. Alae ampliatae, obtusae: margine exteriori curvo.

TINEA: y) Antennae setaceae. Alae acutae, convolutae.

ALUCITA: Antennae filiformes. Alae fissae.

## 4. NEUROPTERA.

LIBELLULA: Antennae subulatae. Alae extensae, omnes aequales. Cauda hamoso-forcipata.

AGRION: z) Antennae subulatae. Oculi extuberantes. Alae erectae, aequales.

MYRMELEON: Antennae capitatae. Alae deflexae, aequales.

EPHEMERA: Antennae subulatae. Alae erectae, posticae minimae. Cauda setosa.

R 2

PHRY-

s) Obs. corpus angustum.

t) Corpus obesum.

u) Antennae maris saepius pectinatae, feminae interdum setaceae.

v) Obs. Alae horizontales. Corpus gracile. Antennae pectinatae et setaceae in distincto sexu.

x) Alae conniventes in figuram deltoideam.

y) Alae convolutae in formam cylindricam.

z) Genus Fabr. Oculi prominuli e. g. Libellula puella LINN.

**PHRYGANEAE:** Antennae setaceae. Thorax brevissimus. Alae deflexae.

**HEMEROBIUS:** Antennae setaceae. Thorax rotundatus. Alae deflexae.

**PANORPA:** Antennae setaceae. Os rostro corneo, cylindrico. Alae incumbentes.

**RAPHIDIA:** Antennae setaceae. Caput triangulare. Thorax elongatus.

**TERMES:** Antennae moniliformes.

### 5. HYMENOPTERA.

**FORMICA:** a) Antennae medio geniculatae. Petiolus abdominis extuberans.

**MUTILLA:** b) Antennae extrorsum attenuatae. Os elingue. Petiolus abdominis aequalis. Corpus totum pubescens.

**APIS:** c) Lingua inflexa. Alae planae.

**VESPA:** d) Antennae extrorsum crassiores. Alae superiores plicatae.

**SPHEX:** e) Antennae extrorsum attenuatae. Alae planae, subincumbentes.

**CHRYSIS:** f) Abdomen subtus fornicatum, utrinque squama laterali. Aculeus subexsertus.

**SIREX:** g) Abdomen sessile, mucronatum. Aculeus exsertus sub abdominis spina terminali.

**CORYNIS:** h) Antennae capitatae. Abdomen fornicatum.

LEU-

a) Antennae filiformes, fractae. Oculi minuti. Alae planae incumbentes, neutris nullae. Aculeus obsoletus.

b) Alae planae, feminis nullae. Abdominis primum segmentum maximum. Aculeus punctorius.

c) Antennae filiformes. Oculi oblongi. Aculeus feminis et neutris punctorius.

d) Antennae pendulae. Os elingue. Oculi reniformes.

e) Antennae incurvae. Oculi ovati. Aculeus punctorius.

f) Os elingue. Alae planae. Corpus fulgidum.

g) Antennae setaceae. Thorax antice lunatus.

b) Sub hac denominatione innuimus Tenthredinein luteam, obscuram, et hisce similes, quae alias iisdem notis insigniuntur, ac Genus insequens, Tenthredo.

LEUCOPSIS.

EVANIA.

TENTREDO: *i*) Antennae subfiliformes. Abdomen sessile, oblongum. Aculeus ferratus, bivalvis, reconditus.

ICHNEUMON: Antennae setaceae. Abdomen petiolatum, elongatum. Aculeus exsertus, bivaginat.

CYNIPS; *k*) Antennae filiformes. Abdomen subovale, compressum. Aculeus spiralis.

## 6. D I P T E R A.

OESTRUS: Os clausum, poro pertusum. Antennae globosae, setariae.

STRATIOMYS: *l*) Proboscis proclinata. Antennae lanceolatae, basi conniventes. Alae incumbentes. Scutellum dentatum. Abdomen rotundum.

BIRIO: *m*) Proboscis proclinata. Antennae filatae, acuminatae. Caput globosum. Alae extensae.

MUSCA: *n*) Proboscis proclinata. Antennae incrassatae, breves. Scutellum muticum.

RHAGIO: *o*) Proboscis exserta, palpis incumben-  
tib. Antennae subulatae. Abdomen subconicum.

R 3

TABA-

*i*) Thorax huic antice aequali-obtus.

*k*) Larvae caussae sunt Gallarum.

*l*) Huic generi interinus Muscam mutabilem LINN. et *M. chamael.* cum reliquis illius structurae.

*m*) Hoc loco denotamus Muscam maurain L. et huic similes, cum caractere convenientes

*n*) Sub hoc genere combinavimus Muscam et Syrphum Fabr. Alias saepissime dignoscitur SYRPHUS Corpore tomentoso, aut glabro, depili. (i. e. nullis majoribus pilis s. setis horrido.) MUSCA vero, Corpore piloso.

*o*) Antennae apice interdum setigerae, ut in Syrpho Scolopaceo, Catal. Mus. A. Ups. Thorax huic generi gibbus. Corpus elongatum. Genus est Fabr. cujus Gener. habitum sequimur.

**TABANUS:** p) Proboscis exserta, palpis incumben-  
tibus. Antennae filatae. Abdomen ovale.

**TIPULA:** Proboscis brevissima. Palpi duo, por-  
recti, incurvi. Antennae filiformes.

**CONOPS:** Proboscis geniculata, fetiformis, longa.  
Antennae clavato-acuminatae. Abdomen  
clavatum, inflexum.

**CULEX:** Haustellum elongatum: vagina aculeos  
fetaceos gerente. Antennae filiformes.

**EMPIS:** Haustellum inflexum. Antennae subu-  
latae. Caput globosum.

**STOMOXYS:** q) Haustellum porrectum, fetifor-  
me. Antennae fetariae.

**BOMBYLIUS:** r) Haustellum porrectum, longis-  
simum. Antennae subulatae.

**ASILUS:** s) Haustellum porrectum, rectum, cor-  
neum. Antennae subulatae.

**HIPPOBOSCA:** t) Haustellum breve, cylindricum,  
nutans.

## 7. A P T E R A.

**LEPISMA:** u) Pedes VI. Antennae fetaceae.  
Cauda trifeta.

**PODURA:** v) Pedes VI. Antennae fetaceae. Cauda  
bifurca.

**PEDICULUS:** w) Pedes VI. ambulatorii. Anten-  
nae moniliformes.

**PULEX:**

p) Oculi transversales in plurimis, sed in *MUSCIS*,  
*STRATIOM. RHAGION.* longitudinales, vel rotundi.  
Proboscis *TABANI* aculeis compressis, acuminatis  
praedita est.

q) Proponimus hic *Asilum Morion. LINN.* Obs. Pro-  
boscis in canalem retractilis in *Conope, Stratiomy,*  
*Bibione, Musca.*

v) Caput depressum. Corpus ovale. Alae extensae.

s) Caput compressum. Frons barbata. Thorax gibbus.

t) Pedes unguiculis pluribus.

u) Pedes cursorii. Cauda setis extensis. Corpus squamatum.

v) Pedes cursorii. Cauda inflexa, saltatrix.

w) Os aculeo retractili. Abdomen depressum, sublobatum.



**PULEX:** Pedes VI. postici saltatorii. Proboscis brevis, incurva. Abdomen compressum.

**ACARUS:** Pedes VIII. Oculi II. Tentacula II., pediformia.

**ARANEA:** Pedes VIII. Oculi III. Antennae nullae. Os forcipatum. Palpi articulati, incurvi.

**PHALANGIUM:** Pedes VIII. Oculi IV. Antennae nullae. Caput antice cheliferum.

**SCORPIO:** α) Pedes VIII. Antennae nullae. Manus chelatae.

**CANCER:** Pedes X. Antennae breves. Corpus rotundatum. Cauda recurvato-recondita.

**PAGURUS:** Pedes X, γ) Antennae IV, inaequales. Corpus elongatum. Cauda tenui membrana obducta.

**ASTACUS:** Pedes X. Antennae IV, elongatae. Manus chelatae. Corpus elongatum. Cauda extensa, foliacea.

**GAMMARUS:** α) Pedes X. Antennae anticae breviores. Cauda compressa.

**MONOCULUS:** Pedes XII, plurimi chelati. Antennae filiformes. Corpus crustae innatum.

**ONISCUS:** Pedes XIV. Corpus convexiusculum.

**SCOLOPENDRA:** Pedes totidem utrinque, quot corporis segmenta. Corpus lineare, depressum. Antennae setaceae.

**JULUS:** Pedes duplo utrinque plures, quam corporis segmenta. Antennae moniliformes. Corpus semi-cylindricum.

α) In plurimis hujus Generis Speciebus observatur cauda articulata, macrone incurvo instructa. Pedes II. pedes posticos adjacent.

γ) Species in hujus generis Parasiticae sunt, cauda aphylla distinctae.

ε) Huic generi adscribitur **CANCER pulex LINN.**

DISSERTATIO  
DE  
FALCONE CANORO.

D. 23. DEC. 1799.

RESP.

GABRIEL. RISLACHI.

**I**n eximio atque locupletissimo Museo, quod instruxit de Ornithologia longe meritissimus, Illustrissimus et Nobilissimus à CARLSON, occurrit Falco, quem describere institui. Duobus abhinc annis examini illum subjeci, eumque neque *Briffoni*, *Buffoni*, *Latham*, neque alii cuidam recentiorum Ornithologorum cognitum esse animadvertens, cogitavi, qui posset in lucem prodire.

Cui occasio fuerit magnificum illud nuper editum opus, in quo Falcones Africanos sistit Dominus *Vaillant* \*) curatius inspiciendi, operam meam supervacaneam is forsàn judicaret, cum apud eum existant et figurae et descriptiones, quæ primo intuitu in nostrum Falconem cadere videntur; si vero omnia et singula comparare voluerit Lector, magnum facile comperiet discrimen. Ceterum cum quisque intelligat, ad species avium in genere et imprimis Falconum dili-

\*) Histoire naturelle des Oiseaux d'Afrique par François le Vaillant. Fol. avec planch. enlum. à Paris.

diligentius, quam moris fuit, determinandas, necessariam esse non tantum sollicitam Oeconomie illorum considerationem, sed etiam accuratorem descriptionem unius cujusque individui, quod facie quodam modo ab aliis differt; sperare ausi sumus fore, ut Scientiae hujus studiosi, animum ad hanc delineationem attendentes, omnes fructus temporis operaeque suae haud sint perdituri. Cujusque denique arbitrio relictum sit, credatne, hunc Falconem a Domino *Vaillant* antea descriptum esse, vel speciem omnino aliam. Nobis interea eundem sub nomine *Canori* describere liceat.

### FALCO CANORUS.

F. Cera pedibusque luteis; gula et corpore supra ex plumbeo et nigro nebulosis; subtus albidus, fusco undulatus; remigibus primoribus nigris, secundariis canis; cauda supra nigra apice albo, subtus fusca fasciis tribus albis; Uropygio albo.

De patria et moribus ejus nihil certi affirmare possumus, quippe cum Illustriss. ipse a CARLSON sibi in memoriam revocare non potuit, unde hunc Falconem acceperit. Illum tamen, si non in Suecia, saltem a Sueco quodam, captum putaverim; color enim pedum, cerae et oculorum in chartula, pedi affixa, et lingua et litteris Suecanis indicabatur.

Magnitudine Milvo non multo cedit, cui etiam habitu corporis, caudae et alarum longitudine similis.

### DESCRIPTIO.

*Mandibula Superior* ex corneo-caerulescens, versus apicem pallidior, dente vix conspicuo.  
*Inferior et anguli oris* sordide flavescentes.

R 5

Cera

*Cera* aurantia, ventricosa, dimidiam rostri partem occupans. *Nares* rotundatae, patulae.

*Lora* nuda, flava, setulis tantum rarioribus fuscis adspersa.

*Oculi* palpebris luteis, iridibus aurantiis.

*Pileus*, *Cervix*, *Interscapulum*, *Latera colli et capitis*, *Gula*, concolores, pennae basi plumbeis apice nigris, maculis transversis tertiam partem pennae occupantibus, qui color in *Menta* et *Scapulis* sensim in cinereo-fuscum abit.

*Uropygium* et *Tectrices caudae superiores* albicant.

*Cauda* integra apice albo; *Rectricis intermediae* supra; praeter apices, omnino nigrae, reliquae margine tantum exteriori, interiori autem fuscae, qui et in *extimis* albo paullulum tingitur. 1, 2, 3 *subtus*, a basi ad medium fere, fuscae, deinde fasciis tribus albis et duabus fuscis alterne insignatae. In 1 et 2 fasciae, latitudine pollicis. Harum ultima alba totam transcurrit pennam, reliquae marginem tantum interiorem. A 3 ad 6, fasciae albae sensim sensimque ita obscurantur et coarctantur, ut in 6 omnino evanescant.

*Remiges primores* utrinque nigrae, 1, quarta parte brevior, 2, margine exteriori leviter in cinereum diluto; quod et in pennis pollicis obtinet, quae ceterum nigrae. *Secundariae* rachibus lactei coloris et radiis ex caerulecente-cano et lacteolo levissime intermixto eminent. In margine interiori color lacteus praevalet, in exteriori canus; qui et versus apicem in lineam transversam saturationem caeruleam coit, et a macula lactea semipollicari remigem terminante excipitur. Hinc, ala clausa fascia insignis. *Remiges* duae intimae omnino canescentes.

*Tectri-*



*Testrices alarum Superiores cinereo-fuscae, Inferiores sordide albae, fusco undulatae.*

*Pectus, Abdomen, Hypochondria, Crissum, Femora*, ex rufescente-albida, strigis transversis circiter  $1\frac{1}{2}$  lin. latitudine et huic fere aequali distantia inter se, cinereo fuscis, arcuatis ornata, convexitate arcuum basin pennarum spectante.

*Pedes aurantii. Tibiae* ad quartam partem infra genu pennis abdomini concoloribus vestitae. *Digitus exterior, Medio*, ad tertiam partem, membrana concolore adnexus. *Intermedius* longior (ut in Niso). *Posticus* validior. *Ungues cerei* s. colore mandib. inferioris, rectiusculi.

## M E N S U R A.

*Ab* apice rostri ad apicem caudae 19 poll. Dec.

*Rictus* ab angulo oris ad apicem mand. sub. 1 poll. 5 lin.

*Ala clausa* s. a flexura ad apicem 13 poll. 6 lin.

*Cauda* 10 poll. 5 lin. Circiter 2 poll. extra alas extensa.

*Tibia*, femore paullo brevior 3 poll. 8 lin.

*Digitus intermedius* 1 poll. 4 l. *Unguis ejus* 4 l.

Opus Vaillantii, quum haud exiguo vendatur, ideoque apud nos raro compareat, descriptionem, quam ipse tradit, falconum. huic proxime accedentium, adferendo memet Lectori consulturum existimaverim. Primum autem suo jure vindicat locum.

## FAUCON CHANTEUR. N. 27. T. I.

*Au premier coup-d'oeil, le Faucon Chanteur pouvoit être pris pour une grande espece d'Epervier,*

vier, cependant on ne peut le ranger parmi ces oiseaux, car il a les ailes proportionnellement plus longues, la queue plus courte et le corps plus épais; mais comme eux, il a le tarse 1) fort long, ce qui l'éloigne un peu des Faucons 2). Sa queue est étagée, les plumes extérieures étant d'un tiers plus courtes que celles de milieu. La tête, le cou, la poitrine et tout le dessus du corps, sont d'un gris de perle, plus foncé sur le sommet de la tête, les joues et sur une partie des plumes scapulaires. ou elles prennent un ton brunâtre; les couvertures du dessus de la queue sont blanches; sur les côtés elles sont rayées de gris-brun et ponctuées de la même couleur 3). Le ventre 4), sur un fond blanchâtre, est rayé très-finement de gris-bleu clair; les rayures du reste du plumage sont plus séparées les uns des autres, et elles sont d'un joli gris-bleu sur les jambes 5). Les grandes plumes de l'aile sont noires; chacun des plumes de la queue est terminée de blanc, celles du milieu sont noirâtres, les autres ajoutent à cette couleur de larges bandes blanches 6). L'iris est d'un rouge-brun foncé. La base du bec (Cera) ainsi que les pieds sont jaunes. Le bec et les ongles sont noirs. Cet oiseau est de la grosseur de notre Faucon. La femelle diffère du mâle par sa taille, qui est d'un tiers plus forte, la base de son bec et ses pieds sont d'un jaune plus faible encore, et c'est principalement dans le temps des amours que ces mêmes parties, dans le mâle, prennent une couleur plus vive ou plus orangée; c'est alors aussi qu'il chante, ainsi que la plus part des autres espèces d'oiseaux chanteurs.

La Femelle construit son nid dans l'ensurchure des arbres ou dans les gros buisson touffus; sa ponte est de quatre œufs entièrement blancs et  
pres-

*presque ronds. — Dans son jeune âge, le plumage du faucon chanteur est mélangé de beaucoup de rouffatre. Cette belle espèce d'oiseau se trouve dans la Caffrie et dans tout le pays qui l'avoisine; je l'ai rencontré aussi dans le Karrow et le Camdeboo.*

Obs. 1. Anatomicum vocabulum hic obnoxiæ servans, Tarsum appellat, quod et in usu familiari et ad Ornithologiae leges Tibiæ nomine designamus. Cur autem istud consilii mox deferit, pectusque (poitrine) vocat quod et Anatomi et Ornithologi gulam?

2. Figura, quam edit parum vera et exacta videtur, si mutuas singularum partium rationes rite aestimamus; nam in ea proportio alarum et caudae eadem est ac in Falcone Niso, h. e., extra tectrices caudae non eminent. Neque ea longitudo est pedum, si ad reliquas partes referantur, qualem descriptio indicat.

3. In figura; dorsum fuscum, jugulum canum, flexura alae, ut et pennae colli laterales in ejus confiniis, albo marginatae. Tectrices alarum collo concolores. Remiges minores striâ transversali ex rufescente-fusca albedinem apicem excipiente.

4. h. e. Pectus et abdomen. Crissum subalis delitescit.

5. Color albus purus est. Convexitas fasciarum ad apicem pennarum vergit.

6. Rectrices acutiores griseo-fuscae et fasciis et apicibus albis carent.

Tanta est descriptionis et ipsius figurae discrepantia. Utri igitur fides habenda? Quod quidem

dem eo difficilius discernas, quum ambae ad idem prototypon naturae effectae, aequalem videantur mereri. Neque censebimur inique agere cum Auctore, qui librum, non nisi magna pecunia parabilem, tamque ambizioso apparatu insignem ostentat, si sollertio rem in opere perficiendo requiramus curam. Jam vero qualem demum cunque hujus falconis ideam si nobis formare velimus, necesse est, ut ad descriptionem, sit licet valde manca, ipsam figuram exigamus et corrigamus, rursumque, quo illa deficiat, id quidem ab hac repetamus.

Quod si fiat, videbitur simul Vaillantii Falco illi, quem supra descripsimus, haud dissimilis. Rostri et unguium differentia prima se offert; haec autem novimus apud plurimas hujus generis aves in varia aetate simul esse diversa; nec raro videmus, in pullo ea prorsus nigra esse, inque adulto demum albicare. Structura caudae valde differt. In Falcone Vaillantii fere cuneiformis est, in nostro aequalis. Quam quidem discrepantiam feriat licet oculos, nullius momenti tamen judicabit quicumque noverit in decidio seu mutatione pennarum rectrices non eadem ratione erumpere et accrescere, exterioresque saepissime serius quam interiores. Itaque fieri potuit, ut Falconi Vaillantii, in eo vitae stadio occiso, esset cauda cuneiformis. Nec licet eam Sexui differentiam tribuere, quum in alia specie Falconum eandem non statuimus. Subtiliora colorum in plumis discrimina parum curaverim, quum singularum partium idem sit color principalis. Ex magnitudine demum, proportionibus, quales edit descriptio, remigum minorum pictura singulari, quae in his, monstrante figura, valde congruit, rel. forsan non temere judico, hanc avem ejusdem esse speciei, eam-



eamque quam descripsi, ut adultiorem, ita perfectiorem.

### L'ACCOLI N. 31. T. I.

L'Accoli comme l'oiseau Saint-Martin a le corps alongé et suelt, les jambes et les tarses longs, ainsi que la queue: Caractères qui conviennent également aux Eperviers. Ceux-ci n'ont point les ailes longues, comme les oiseaux de genre de l'Accoli, &c.

La couleur principale de l'accoli est un beau-grisbleu pale, repandu sur la tête, le cou et le manteau. Cet oiseau est tres culotté, c'est-à-dire, que les plumes qui recouvrent les jambes descendent fort bas, quoique le tarse ne soit emplumé par lui même. Toute la partie inférieure du corps est blanchatre et finiment rayée, comme celle du Faucon Chanteur, avec le quel il ne faut point non plus le confondre, le dernier est beaucoup plus gros: d'ailleurs, sa queue etagée le distingue de l'autre. Il est encore à remarquer, que dans les cantons ou ces deux especes se trouvent en même tems, jamais ils ne se melent ensemble, et que l'accoli n'a qu'un cri aigre et ne chante point. — Il a le bec bleuatre, et le tour du nez (cerc) d'un beau rouge, qui est aussi la couleur des pieds. Les ongles sont noirs, ainsi que le bout du bec. La femelle est d'un rouge plus terne que celui du male.

Obf. Si proportionem partium spectaveris, ad descriptionem quadrat figura. Ad colorem quod attinet, nucha, dorsum et praecipue raches pennarum aliquanto obscuriora sunt. Gula canescens, striis aliquot fuscis longitudinalibus. Remiges primores nigrae, secundariae et Uropygium alba. Cauda sordide alba rachibus rectricum

cum aurantiis. Convexitas undularum pectoris retrorsum vergit. Orbitae et frons nigra sunt. Habitus corporis facile tibi persuaderet, Falconem Canorum esse foeminam hujus Acolidis.

## LE GABAR N. 33. T. I.

*La taille de Gabar égale celle de notre Epervier il est seulement moins elongé, parceque sa queue est un peu plus courte. Toute la partie supérieure du corps la tête et les joues sont d'un gris-brun, plus foncé sur le manteau et à l'occiput. Les couvertures du dessus et du dessous de la queue sont blanches; les grandes plumes des ailes sont brunes dans toutes les parties qui se voient quand elles sont pliées; en dessous, elles ont toutes des bandes transversales. Les moyennes sont terminées en blanc. La queue carrément coupée, est en dessus barrée de brun foncé, sur un fond plus clair, en dessous elle l'est de blanc et de noir lavé. La gorge ainsi que la poitrine (regio claviculae) sont d'un gris bleuâtre. Tout le reste du corps et les jambes très culottées, portent une fine rayure de brun-clair, sur un fond blanchâtre. Les yeux sont d'un jaune vif. La base du bec et les pieds ont une belle couleur rouge. Les griffes et le bec sont noirs.*

Obs. Hujus Descriptio figurae prorsus convenit. Colore proxime accedit ad Canorum, sed dimidio minor est, et ipsa forma valde discrepat.


---




*MURÆNA annulata.*



*MURÆNA nebulosa.*







*MURÆNA fasciata.*

*MURÆNA picta.*





1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.



13.



14.



15.



16.



17.



18.



19.



20.



21.



22.







23.



24.



25.



1.



2.



3.



4.



5.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.

Thunb. Vol. III.



12.



13.



14.





1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.






12.





13.

















4.



3.



2.



1.



8.



7.



6.



5.



12.



11.



14.



13.



10.



9.



18.



17.



16.



15.











5.



4.



3.



2.



1.



6.



7.



6.



8.



9.



8.



10.



11.



12.



11.



14.



13.



14.



